# 圖書集成醫部全錄

第二十九册

嘔吐門　泄瀉門　霍亂門

通俗圖書刊行社刊行
會文堂新記書局發行

# 欽定古今圖書集成醫部全錄第二十九册目錄

## 卷二百四十八彙考二百四十八

嘔吐門一……一
黃帝素問……一
㊀診要經終論—一 ㊁舉痛論—一 ㊂痹論—一 ㊃厥論—二 ㊄脈解篇—二 ㊅刺禁論—三 ㊆五常政大論—三 ㊇六元正紀大論—三 ㊈至眞要大論—四 ㊉示從容論—六
靈樞經……六
㊀經脈篇—六 ㊁熱病篇—七 ㊂玉版篇—七 ㊃五味篇—七
扁鵲難經……七
㊀吐脈—七
張機金匱要略……八
㊀嘔吐—八 ㊁吐蚘—一〇
華佗中藏經……一〇
㊀論臟腑虛實寒熱—一〇

中国科学院 图书室藏 植物研究所
6513132

㊀嘔吐一八
局方發揮……一八
㊀吐酸一八
王履溯洄集……一九
㊀嘔吐乾嘔噦欬逆辨一九
張潔古活法機要……二〇
㊀吐證二〇
羅天益衞生寶鑑……二一
㊀嘔吐二一
戴思恭證治要訣……二一
㊀論嘔吐二一
王綸明醫雜著……二二
㊀吐酸吞酸二二

## 卷二百四十九彙考二百四十九

嘔吐門二……二五

王叔和脈經……一一
㈠嘔吐之脈一一一　㈡吐蚘之脈一一一
脈訣……一一
㈠嘔吐之脈一一一
孫思邈千金方……一三
㈠嘔吐諸證一一三
朱肱活人書……一三
㈠嘔吐證一一三
嚴用和濟生方……一五
㈠嘔吐論治一一五
劉完素六書……一五
㈠嘔吐一一五
成無已明理論……一六
㈠嘔吐論一一六
李杲十書……一七
㈠用藥宜禁一一七　㈡論證分經一一七
朱震亨心法……一七

㊀嘔吐治法—一四一 ㊁呑酸吐酸治法—一四三

# 卷二百五十彙考二百五十

## 嘔吐門三


嘔吐門三………………………………………………四五

方一…………………………………………………四五

㊀碧霞丹—四五 ㊁陰陽丸—四五 ㊂赤石脂散—四五 ㊃又方—四五 ㊄人參半夏湯—四六
㊅小半夏湯—四六 ㊆吳茱萸湯—四六 ㊇清膈散—四六 ㊈半夏加茯苓湯—四六 ㊉葱白湯
—四六 （一一）椒薑湯—四六 （一二）石膏湯—四六 （一三）又方—四七 （一四）半夏湯—四七 （一五）前胡湯—四七
（一六）又方—四七 （一七）小麥湯—四七 （一八）猪苓散—四七 （一九）犀角人參飲子—四七 （二〇）又方—四八 （二一）
又方—四八 （二二）又方—四八 （二三）又方—四八 （二四）橘皮湯—四八 （二五）又方—四八 （二六）又方—四八 （二七）
露宿圓—四八 （二八）半夏湯—四九 （二九）建中湯—四九 （三〇）厚朴湯—四九 （三一）止嘔人參湯—四九 （三二）
茱萸湯—四九 （三三）四逆湯—四九 （三四）附子粳米湯—五〇 （三五）五苓散—五〇 （三六）桂苓五味甘草去
桂加乾薑細辛半夏湯—五〇 （三七）半夏瀉心湯—五〇 （三八）黄芩加半夏生薑湯—五〇 （三九）小柴胡
湯—五〇 （四〇）大半夏湯—五一 （四一）大黄甘草湯—五一 （四二）茯苓澤瀉湯—五一 （四三）半夏乾薑散—
五一 （四四）橘皮竹茹湯—五一 （四五）甘草粉蜜湯—五一 （四六）烏梅圓—五一 （四七）養胃丹—五二 （四八）丁香
茱萸湯—五二 （四九）白朮湯—五二 （五〇）補肝湯—五二 （五一）皂角化痰丸—五二 （五二）上二黄丸—五三
（五三）丁香半夏丸—五三 （五四）大藿香散—五三 （五五）旋覆花湯—五三 （五六）竹茹湯—五三 （五七）玉浮丸—
五三 （五八）胃丹—五四 （五九）大半夏湯—五四 （六〇）沉香降氣湯—五四 （六一）鹽煎散—五四 （六二）分氣紫蘇

李梴醫學入門……二五
(一)嘔分乾濕—二五　(二)吐別腥酸—二六　(三)有冷熱氣食之殊—二六　(四)下焦寒—二六　(五)不可下—二七　(六)濕痰火水—二七　(七)膿血風暑—二七　(八)蚘蟲—二七
李中梓醫宗必讀……二八
(一)嘔吐論—二八
陶華六書……二九
(一)論乾嘔—二九　(二)論嘔吐—二九
薛己醫案……三〇
(一)嘔吐—三〇
徐春甫古今醫統……三〇
(一)嘔吐之因不同—三〇　(二)久病火鬱吐酸宜辛溫發散—三一　(三)新病吐酸當從寒味—三一
王肯堂證治準繩……三一
(一)總論—三一　(二)治法—三一
張介賓景岳全書……三二
(一)嘔吐論證—三二　(二)虛證—三三　(三)實證—三四　(四)吐蚘—三五　(五)治嘔氣味論—三六　(六)惡心證治—三六　(七)吐酸吞酸辨證—三七　(八)論治—四〇
陳士鐸石室祕籙……四一

㉗柴陳煎—六六 ㉘抽薪飲—六六 ㉙太淸飲—六六 ㉚四味回陽飲—六七 ㉛六味回陽飲—六七 ㉜理陰煎—六七 ㉝溫胃飲—六七 ㉞參薑飲—六七 ㉟黃芽丸—六七 ㊱一炁丹—六七 ㊲溫臟丸—六八 ㊳聖朮煎—六八
單方……六八
鍼灸……七一
導引……七六
醫案……七七

## 卷二百五十二彙考二百五十二

泄瀉門一……八三
黃帝素問……八三
①四氣調神大論—八三 ②生氣通天論—八三 ③金匱眞言論—八三 ④陰陽應象大論—八四 ⑤脈要精微論—八四 ⑥平人氣象論—八五 ⑦玉機眞臟論—八五 ⑧太陰陽明篇—八五 ⑨欬論—八五 ⑩舉痛論—八六 ⑪痹論—八六 ⑫標本病傳論—八六 ⑬臟氣法時論—八六 ⑭宣明五氣論—八六 ⑮調經論—八六 ⑯陰陽別論—八七 ⑰風論—八七 ⑱厥論—八七 ⑲刺熱論—八七 ⑳五常政大論—八八 ㉑氣交變大論—八八 ㉒至眞要大論—八八 ㉓六元正紀大論—九〇

飲—五五　(六三)匀氣散—五五　(六四)快氣散—五五　(六五)化氣湯—五五　(六六)參苓白朮散—五五　(六七)丁香蔲散—五五　(六八)藿香半夏散—五五　(六九)丁附治中湯—五六　(七〇)沉香煎丸—五六　(七一)丁香丸—五六　(七二)大養胃湯—五六　(七三)十珍餅子—五六　(七四)助胃膏—五七　(七五)炮附子丸—五七　(七六)加味二陳湯—五七　(七七)麥門冬湯—五七　(七八)加味七氣湯—五七　(七九)小丁沉丸—五七　(八〇)草豆蔲湯—五八　(八一)生薑丸—五八　(八二)溫中白朮丸—五八　(八三)思食丸—五八　(八四)參香枳朮丸—五八　(八五)開胃丸—五八　(八六)參粟湯—五九　(八七)三聖散—五九　(八八)丁香附子散—五九　(八九)紫沉丸—五九　(九〇)五積丹—五九　(九一)桔梗湯—五九　(九二)木香散—六〇　(九三)荊黃湯—六〇　(九四)檳榔散—六〇　(九五)青鎮丸—六〇　(九六)白朮湯—六〇　(九七)金花丸—六〇　(九八)附子丸—六一　(九九)白朮散—六一　(一〇〇)乾薑芩連人參湯—六一　(一〇一)羌活附子湯—六一　(一〇二)大橘皮湯—六一　(一〇三)小橘皮湯—六一

卷二百五十一　彙考二百五十一

嘔吐門四……………………………………………六三

方二……………………………………………………六三

(一〇四)藿香安胃散—六三　(一〇五)藿香散—六三　(一〇六)大七香丸—六三　(一〇七)小七香丸—六三　(一〇八)木香餅子—六四　(一〇九)參朮調中湯—六四　(一一〇)鐵刷湯—六四　(一一一)四味藿葉湯—六四　(一一二)古參萸湯—六四　(一一三)古丁夏湯—六四　(一一四)單人參湯—六四　(一一五)單白蔻散—六五　(一一六)金水六君煎—六五　(一一七)和胃二陳湯—六五　(一一八)苓朮二陳煎—六五　(一一九)和胃飲—六五　(一二〇)排氣湯—六五　(一二一)大和中飲—六五　(一二二)小和中飲—六六　(一二三)大分清飲—六六　(一二四)小分清飲—六六　(一二五)神香散—六六　(一二六)正柴胡飲—六六

成無己明理論……一〇三
㈠自利一一〇三
張潔古活法機要……一〇四
㈠治法一一〇四
張從政儒門事親……一〇五
㈠論五泄所宜氣味一一〇五　㈡金匱十全之法一一〇五　㈢金匱十全五泄法後論一一〇五　㈣
治法一一〇七

## 卷二百五十三彙考二百五十三

泄瀉門二……一〇九
李杲十書……一〇九
㈠春傷於風夏爲飧泄論一一〇九　㈡春傷於風夏生飧泄(與前論異)一一一一
朱震亨心法……一一三
㈠泄瀉一一一三
平治會粹……一一三
㈠泄瀉從濕治有多少一一一三

靈樞經……九一
㈠邪氣臟腑病形篇—九一 ㈡經脈篇—九一 ㈢師傳篇—九一 ㈣論疾診尺篇—九一 ㈤脹論—九二 ㈥玉版篇—九二
扁鵲難經……九二
㈠五瀉—九三 ㈡死候—九三
張機金匱要略……九三
㈠下利病脈證治—九三 ㈡因食致瀉—九五 ㈢鶩溏—九五
華佗中藏經……九五
㈠利屬臟腑虛實寒熱—九五 ㈡死候—九六
王叔和脈經……九六
㈠泄利之脈—九六
脈訣……九七
㈠瀉利之脈—九七
朱肱活人書……九八
㈠傷寒下利—九八
劉完素六書……九九
㈠泄瀉—九九 ㈡寒熱水泄例—一〇〇 ㈢目利并悞下—一〇一

張三錫醫學準繩六要……一三一
㊀論泄瀉—一三一
趙獻可醫貫……一三二
㊀論泄瀉—一三二
喻昌醫門法律……一三三
㊀論飧瀉—一三三
張介賓景岳全書……一三四
㊀論證—一三四　㊁分利治法—一三五　㊂諸瀉論治—一三五
陳士鐸石室祕錄……一三八
㊀泄瀉治法—一三八
方一……一四一
㊀香茸丸—一四一　㊁大承氣湯—一四一　㊂小承氣湯—一四一　㊃梔子豉湯—一四一　㊄通脈四逆湯—一四二　㊅黃芩湯—一四二　㊆養胃丹—一四二　㊇炙肝散—一四二　㊈黃連丸—一四二　㊉黃連煎—一四二　⑪紫參湯—一四三　⑫訶黎勒散—一四三　⑬黃蘗止洩湯—一四三　⑭調中益氣湯—一四三　⑮升陽除濕防風湯—一四三　⑯又方—一四三　⑰扶脾丸—一四三　⑱黃芪補胃湯—一四四　⑲升陽除濕湯—一四四　⑳沉香溫胃丸—一四四　㉑薑附赤石脂硃砂丹—一四四　㉒胃風湯—一四四　㉓加味五苓湯—一四五　㉔火輪丸—一四五　㉕白朮附子湯—一四五　㉖禹餘糧丸—一四五　㉗加味治中湯—一四五　㉘薑麴丸—一四五　㉙又方—一四五　㉚清六丸—一四六　㉛大已

局方發揮……一二四
㈠泄利滯下治法不同—一二四
羅天益衛生寶鑑……一二六
㈠濡泄—一二六　㈡飧泄—一二六
戴思恭證治要訣……一二七
㈠泄瀉—一二七
樓英醫學綱目……一二九
㈠泄瀉—一二九　㈡飧瀉一三〇
王綸明醫雜著……一三一
㈠證治—一三一
李梴醫學入門……一三四
㈠寒熱表裏證治—一三四　㈡泄瀉證治—一三五　㈢總論治法—一三七
李中梓醫宗必讀……一三七
㈠治法有九—一三八　㈡難經五泄—一三九　㈢泄證有七—一三九　㈣脈候—一三九

卷二百五十四彙考二百五十四

泄瀉門三……一四一

(九三)紅豆丸—一五七 (九四)高良薑湯—一五七 (九五)乾薑丸—一五七 (九六)加減木香散—一五七 (九七)肉豆蔻散—一五八 (九八)炙肝散—一五八 (九九)龍骨黃連湯—一五八 (一〇〇)木香訶黎勒丸—一五八 (一〇一)茱萸斷下丸—一五八 (一〇二)豆蔻附子散—一五八 (一〇三)固腸散—一五九 (一〇四)加味三建湯—一五九 (一〇五)張氏建中湯—一五九 (一〇六)猪臟丸—一五九 (一〇七)大腹木香湯—一五九 (一〇八)大橘皮湯—一五九 (一〇九)桂苓白朮丸—一六〇 (一一〇)防風芍藥湯—一六〇 (一一一)白朮芍藥湯—一六〇 (一一二)蒼朮芍藥湯—一六〇 (一一三)訶子散—一六〇 (一一四)漿水散—一六〇 (一一五)白朮湯—一六一 (一一六)茯苓湯—一六一 (一一七)蒼朮湯—一六一 (一一八)蒼朮防風湯—一六一 (一一九)椒朮丸—一六一 (一二〇)木香丸—一六一 (一二一)豆蔻散—一六二 (一二二)妙應丸—一六二 (一二三)白頭翁湯—一六二 (一二四)陶氏黃龍湯—一六二 (一二五)桃花散—一六二 (一二六)赤石脂丸—一六二 (一二七)右歸飲—一六二 (一二八)左歸丸—一六三 (一二九)排氣飲—一六三 (一三〇)大和中飲—一六三 (一三一)小和中飲—一六三 (一三二)小分清飲—一六三 (一三三)解肝煎—一六三 (一三四)二朮煎—一六三 (一三五)蒼朮丸—一六四 (一三六)赤金豆—一六四 (一三七)百順丸—一六四 (一三八)大分清飲—一六四 (一三九)茵陳飲—一六四 (一四〇)四味回陽飲—一六四 (一四一)六味回陽飲—一六五 (一四二)養中煎—一六五 (一四三)溫胃飲—一六五 (一四四)五君子煎—一六五 (一四五)胃關煎—一六五 (一四六)左關煎—一六五 (一四七)抑扶煎—一六六 (一四八)五德丸—一六六 (一四九)復陽丹—一六六 (一五〇)黃芽丸—一六六 (一五一)一炁丹—一六六 (一五二)九炁丹—一六六 (一五三)聖朮煎—一六七 (一五四)黏米固腸糕—一六七 (一五五)敦阜糕—一六七

## 卷二百五十六彙考二百五十六

泄瀉門五……一六九

寒丸—一四六　(三二)八味湯—一四六　(三三)朮附湯—一四六　(三四)感應丸—一四六　(三五)椒附丸—一四六　(三六)二神丸—一四七　(三七)參苓白朮散—一四七　(三八)對金飲子—一四七　(三九)加減木香散—一四七　(四〇)南白膠香散—一四七　(四一)玉粉散—一四七　(四二)附子温中湯—一四七　(四三)堅中丸—一四八　(四四)啓脾丸—一四八　(四五)平胃蒜肚丸—一四八　(四六)調中健脾丸—一四八　(四七)大斷下丸—一四八　(四八)訶子散—一四八　(四九)古蔻附丸—一四九　(五〇)衛生湯—一四九　(五一)理中湯—一四九　(五二)調中湯—一四九　(五三)肉豆蔻散—一四九　(五四)平胃散—一四九　(五五)厚朴丸—一四九　(五六)補脾丸—一五〇　(五七)大藿香散—一五〇　(五八)四聖丸—一五〇　(五九)豆附丸—一五〇

# 卷二百五十五彙考二百五十五

## 泄瀉門四

泄瀉門四……一五一

方二一……一五一

(六〇)肉豆蔻散—一五一　(六一)金鎖正元丹—一五一　(六二)豆附丸—一五一　(六三)燒胃丸—一五二　(六四)訶黎勒丸—一五二　(六五)九寶飲子—一五二　(六六)實腸散—一五二　(六七)益胃湯—一五二　(六八)升陽湯—一五二　(六九)止瀉祕方—一五三　(七〇)斂腸丸—一五三　(七一)訶子四柱散—一五三　(七二)蓽茇丸—一五三　(七三)縮砂丸—一五三　(七四)羊肉扶羸丸—一五三　(七五)百粒丸—一五四　(七六)麴藭丸—一五四　(七七)棗肉丸—一五四　(七八)香茸丸—一五四　(七九)胃苓散—一五四　(八〇)棗附丸—一五四　(八一)實腸丸—一五五　(八二)養臟丸—一五五　(八三)黃連烏梅丸—一五五　(八四)煨肝散—一五五　(八五)換腸丸—一五五　(八六)又方—一五六　(八七)豬臟丸—一五六　(八八)訶子皮散—一五六　(八九)龍骨散—一五六　(九〇)代赭丸—一五六　(九一)如聖丸—一五六　(九二)梅棗湯—一五七

㈠脈法—一九三

孫思邈千金方……一九三

㈠總論—一九三

劉完素六書……一九四

㈠總論—一九四

成無己明理論……一九五

㈠總論—一九五

張從政儒門事親……一九六

㈠吐瀉死生如反掌說—一九六

朱震亨心法……一九七

㈠霍亂證治—一九七　㈡絞腸沙證治—一九八

戴思恭證治要訣……一九八

㈠霍亂—一九九

樓英醫學綱目……二〇〇

㈠霍亂—二〇〇

王綸明醫雜著……二〇一

㈠霍亂—二〇一

單方……一六九
鍼灸……一七五
導引……一七八
醫案……一七八

## 卷二百五十七彙考二百五十七

霍亂門一……一九一
黃帝素問……一九一
㊀氣交變大論—一九一
張機金匱要略……一九一
㊀轉筋—一九一　㊁因食成霍亂—一九一
傷寒論……一九二
㊀辨霍亂病脈證治—一九二
王叔和脈經……一九三
㊀脈法—一九三
脈訣……一九三

㊀四逆湯—二三三 ㊁四順湯—二三三 ㊂當歸四逆加吳萸生薑湯—二三三 ㊃通脈四逆湯—二三三 ㊄竹葉湯—二三四 ㊅附子粳米湯—二三四 ㊆杜若圓—二三四 ㊇又方—二三四 ㊈大柴胡湯—二三四 ㊉縮砂丸—二三五 ⑪沉香溫胃丸—二三五 ⑫沉香溫脾湯—二三五 ⑬理中湯—二三五 ⑭二香散—二三六 ⑮香薷散—二三六 ⑯吳茱萸湯—二三六 ⑰建中加木瓜柴胡湯—二三六 ⑱建中加附子當歸湯—二三七 ⑲止渴湯—二三七 ⑳厚朴湯—二三七 ㉑冬葵子湯—二三七 ㉒人參散—二三七 ㉓人參白朮散—二三七 ㉔木瓜煎—二三七 ㉕回生散—二三七 ㉖丁香散—二三八 ㉗椒豆散—二三八 ㉘加減薷苓湯—二三八 ㉙參胡三白湯—二三八 ㉚旣濟湯—二三八 ㉛木瓜湯—二三八 ㉜半夏湯—二三八 ㉝十華散—二三八 ㉞藿香正氣散—二三九 ㉟丁香散—二三九 ㊱乾薑湯—二三九 ㊲香薷丸—二三九 ㊳四君子湯—二三九 ㊴四君子加芍藥高良薑湯—二四〇 ㊵四君子加薑附厚朴湯—二四〇 ㊶丁香散—二四〇 ㊷正胃湯—二四〇 ㊸良薑飲—二四〇 ㊹訶黎勒散—二四〇 ㊺正氣丹—二四〇 ㊻人參散—二四一 ㊼吳茱萸湯—二四一 ㊽附子散—二四一 ㊾回陽散—二四一 ㊿胡椒湯—二四一 (51)活命散—二四一 (52)抵聖散—二四一 (53)木香散—二四二 (54)白豆蔻丸—二四二 (55)吳茱萸餅—二四二 (56)十香丸—二四三 (57)桃枝湯—二四三 (58)丹砂丸—二四三 (59)白豆蔻丸—二四三 (60)人參散—二四三 (61)竹瀝飲—二四三 (62)木香湯—二四三 (63)藿香散—二四三 (64)薤白湯—二四四 (65)橘皮湯—二四四 (66)附子湯—二四四 (67)六和半夏湯—二四四 (68)藿苓湯—二四四 (69)玉露散—二四四 (70)通脈四逆湯—二四四 (71)漿水散—二四五 (72)薑附湯—二四五 (73)苓朮二陳煎—二四五 (74)和胃飲—二四五 (75)排氣飲—二四五 (76)養中煎—二四五 (77)大和中飲—二四五 (78)小和中飲—二四六 (79)五君子煎—二四六 (80)神香散—二四六 (81)理陰煎—二四六 (82)溫胃飲—二四六

李梴醫學入門……二〇三
㊀霍亂證治—二〇三
李中梓醫宗必讀……二〇五
㊀總論治法—二〇五
王肯堂證治準繩……二〇六
㊀總論證治—二〇六
喻昌醫門法律……二〇七
㊀病分冒暑避暑—二〇七
張介賓景岳全書……二〇七
㊀論證—二〇七　㊁治法—二〇八　㊂調攝宜素—二〇九　㊃分別三因—二一〇
陳士鐸石室祕籙……二一〇
㊀霍亂治法—二一〇　㊁乾霍亂治法—二一〇

## 卷二百五十八彙考二百五十八

霍亂門二……二一三
方……二一三

# 欽定古今圖書集成醫部全錄

## 醫部彙考二百四十八

### 嘔吐門一

#### 黃帝素問

㈠診要經終論

太陰終者，腹脹閉不得息，善噫善嘔，嘔則逆，逆則面赤，不逆則上下不通，不通則面黑皮毛焦而終矣。

註 足太陰脈入腹屬脾，故爲腹脹。手太陰脈上膈屬肺而主呼吸，故爲不得息。脹滿則升降難，不得息則氣道滯，故爲噫嘔。嘔則氣逆於上，故面赤。不逆則否塞於中，故上下不通。脾氣敗則無以制水，故黑色見於面。肺氣敗則治節不行，故皮毛焦。

㈡舉痛論

寒氣客於腸胃，厥逆上出，故痛而嘔也。

註 寒氣客於腸胃之間，從胃上出，故痛而嘔。

㈢痹論

肺痹者，煩滿喘而嘔。

單方……………………………………二三六
鍼灸……………………………………二三五
醫案……………………………………二三七

註少陰寒水在下，君火之氣在上，上下水火不交，則諸陽之氣上浮而無所依從矣，是以陽熱上逆而爲嘔欬氣喘之病。

刺中膽一日半死，其動爲嘔。㈥刺禁論

註膽汁洩者，嘔苦，嘔則膽氣絕矣。夫十一臟腑，皆取決於膽，是膽爲臟腑，陰陽生氣之始，故中膽者，一日半死。

少陰司天，熱氣下臨，肺氣上從，喘嘔。㈦五常政大論

註火熱爍肺也。

太陽司天之政，氣化運行先天，初之氣，地氣遷，氣乃大溫，身熱頭痛嘔吐。㈧六元正紀大論

註地氣遷者，謂上年在泉之終氣，而交於今歲司天之初氣也。歲前之終氣，乃少陰君火，今歲之初氣，乃少陽相火，二火相交，故氣大溫，而病身熱頭痛嘔吐。

陽明司天之政，氣化運行後天，初之氣，其病噫欠嘔。

註噫欠嘔者風木之氣也。

少陽司天之政，氣化運行先天，二之氣，其病熱鬱於上，欬逆嘔吐。

註二之客氣，乃太陰濕土，病熱鬱，嘔吐，火熱鬱之於內也。

三之氣，天政布，炎暑至，少陽臨上，民病欬嘔。

註司天之氣，上臨於三氣，故天政布，王時之氣，亦屬少陽，故炎暑至，民病欬嘔，感風火之氣也。

土鬱之發，甚則心痛脅䐜，嘔吐霍亂。

註肺主氣而司呼吸，其脈起於中焦，還循胃口，上膈屬肺，故痹則煩滿喘而嘔。

脾痹者，四肢解墮，發欬嘔汁，上爲大塞。

註胃氣不能行於四支，故四支解墮，脾脈上鬲挾咽，氣痹不行，故發欬。入胃之飲，上輸於脾肺，脾氣不能轉輸，故嘔汁。肺氣不能通調，故上爲大塞。

㊃厥論

太陰之厥，則腹滿䐜脹，後不利，不欲食，食則嘔，不得臥。

註足太陰之脈，入腹屬脾絡胃，故厥則腹滿䐜脹。食飲入胃，脾爲轉輸，逆氣在脾，故後便不利，脾不轉運，則胃亦不和，是以食則嘔而不得臥也。

少陰厥逆，虛滿嘔變，下泄清，治主病者。

註少陰之氣，上與陽明相合而主化水穀，少陰氣，故中焦虛滿而變爲嘔逆，上下水火之氣不交，故下泄清冷也。嘔變當作變嘔。

手太陰厥逆，虛滿而欬，善嘔沫，治主病者。

註手太陰厥逆，肺氣逆也。肺主氣，故虛滿而欬。不能通布水津，故善嘔沫。此是主肺所生之病，故當治主病之肺氣焉。

㊄脈解篇

太陰所謂食則嘔者，物盛滿而上溢，故嘔也。

註十一月萬物氣皆藏於中，則盛滿而上溢，故嘔。經云『足太陰獨受其濁，太陰之清氣上出則爲噫，濁氣上溢則爲嘔也。』

少陰之勝炎暑至嘔逆。

註 嘔逆陰氣上逆也。

少陽之勝熱客於胃，欲嘔，嘔酸善饑。

註 少陽之氣合於三焦，故熱客於胃而爲嘔饑。蓋三焦之原，皆出於胃間也。

厥陰之復嘔吐，飲食不入，入而復出，甚則入脾食痹而吐。

註 復者謂三陰三陽之氣，受所勝之氣，勝制鬱極而復發也。嘔吐飲食不入，木淫而土敗也。痹者，閉而痛也。

太陰之復，濕變乃舉，飲食不化，嘔而密默，唾吐清液，甚則入腎竅瀉無度。

註 氣極則變，陰濕之氣盛，是以飲食不化。嘔者濕乘陽明也。密默者欲閉戶牖而獨居，陰陽相薄也。太陰者，三陰也。陰變而乘於陽，則陽欲盡而陰盛，是以唾吐清液，甚則入腎，下乘冬令之寒水，腎開竅於二陰，故曰竅瀉。

少陽之復，火氣內發，上爲口糜，嘔逆，血溢血泄。

註 火氣內發者，陰火發於內也。發於上焦則口糜，發於中焦則嘔逆，發於下焦則血溢血泄。

陽明之復，清氣大舉，甚則心痛否滿，腹脹而泄，嘔苦欬噦煩心，病在鬲中。

註 陽明之復，發於本位主令之時，是以清氣大舉，心痛否滿，腹脹而泄，乘火土也。膽病者，善太息，嘔苦，木受金刑，腑亦病也。欬噦煩心者，病在鬲中，陽明之氣上逆也。

少陽司天，客勝則嘔逆。

註 嘔逆，太陰濕土之氣合於內也。

少陽在泉，主勝則熱反上行而客於心，心痛發熱，格中而嘔，少陰同候。

註 主勝則熱反上行而客於心，心痛發熱者，君相二火之客氣反上行而自病也。格而嘔者，太陰之客氣自病也。因主勝而客反自病，故曰反，曰客，曰少陰同候，謂火性炎上，故二火皆有反逆之自病也。

註民病心痛諸證，皆感土氣而發，蓋五運之氣居其中，上受司天之勝，下受在泉之制，無分太過不及，咸受其鬱而復發也。故其所發者，即所鬱之本氣，非子爲母復也。

火鬱之發，民病嘔逆。

註民病嘔逆，火熱盛也。

少陽所至爲嚏嘔。

註此春病之常也。

少陽所至爲嘔涌。

註此秋病之常也。

㊈至眞要大論

歲厥陰在泉，風淫所勝，民病飲食不下，鬲咽不通，食則嘔，腹脹，善噫則快然如衰，身體皆重。

註厥陰在泉，寅申歲也。脾氣病則飲食不下，食則嘔諸證，木淫而土病也。

歲陽明在泉，燥淫所勝，民病喜嘔，嘔有苦。

註陽明在泉，子午歲也。喜嘔嘔苦，足少陽病。

厥陰司天，風淫所勝，民病食則嘔。

註厥陰司天，巳亥歲也，食則嘔，脾經病也。

少陰司天，熱淫所勝，民病嚏嘔。

註少陰司天，子午歲也。嚏嘔，火熱上炎也。

厥陰之勝，憒憒欲吐，甚則嘔吐鬲咽不通。

㈡熱病篇

熱病汗不出，嘔下血者死。

註 汗不出嘔下血者，外熱不解而入於陰之經也。熱甚而正氣已絕，刺之無益也。

㈢玉版篇

欬嘔腹脹且飧泄，其脈絕，是逆也。如是者，不過一時而死矣。

註 欬嘔腹脹且飧泄，其脈絕，逆於肝脾之絡也。夫胃者，水穀血氣之海也。五臟之大絡，海之所以行雲氣於天下之道路也。水天之氣上下相通，一晝一夜遶地環轉一周，如逆而不行，則開闔已息，是以不過一周而死也。

㈣五味篇

黃帝曰：『苦走骨，多食之令人變嘔，何也？』少俞曰：『苦入於胃，五穀之氣皆不能勝苦，苦入下脘，三焦之道，皆閉而不通，故變嘔。齒者骨之所終也，故苦入而走骨，故入而復出，知其走骨也。』

註 任谷庵曰：炎上作苦，君主之味也，故五穀之氣皆不能勝之。苦性下泄，故入於下脘。三焦者，少陽相火也。苦性寒，故三焦之道，皆閉塞不通。三焦不通，則入胃之水穀不得通調布散，故變而爲嘔。夫腎主骨，腎爲寒水之臟，苦性寒，故走骨，同氣相感也。然苦乃火味，故入於下而復出於上，以其性下泄而上涌也。

## 扁鵲難經

㈠吐脈

上部有脈，下部無脈，其人當吐，不吐者死。上部無脈，下部有脈，雖困無能爲害。所以然者，譬如人之有尺，樹之有根，枝葉雖枯槁，根本將自生。脈有根本，人有元氣，故知不死。

假令得心脈，其外證面赤口乾喜笑，其內證臍上有動氣，按之牢若痛，其病煩心心痛，掌中熱而啘。有是者心也，無

諸痿喘嘔，皆屬於上。

註 諸痿喘嘔皆屬於上者，從下而上也。在下之水液上行，則爲喘嘔，亦猶天地陰陽之氣，上下相乘，而水隨氣之上下也。

諸嘔吐酸暴注下迫，皆屬於熱。

註 熱者，君火之氣也。

⑽示從容論

夫傷肺者，脾氣不守，胃氣不淸，經氣不爲使，眞臟壞決，經脈旁絕，五臟漏泄，不衄則嘔，此二者不相類也。

註 脾氣不守土壞，而不能制其水矣。胃氣不淸，水邪之入於胃矣。胃氣傷，故經氣不爲使。眞臟者，脾腎之臟眞也。壞決者，土壞而水決也。胃主經脈，水入於胃，是以經脈旁絕。五臟，主藏精者也，土分王於四臟，土氣不守，是以五臟之津液，皆爲之漏泄。水在胃則嘔，在肺則衄，此水邪直傷於胃肺。

## 靈樞經

㈠經脈篇

脾足太陰之脈，是動則病舌本強，食則嘔，胃脘痛，腹脹善噫，得後與氣，則快然如衰，身體皆重。

註 是動則病氣而及於經，從經而及於臟腑，故爲舌本強，食則嘔，胃脘痛，腹脹諸證。善噫者，脾氣上走心爲噫。得後與氣則快然如衰者，厥逆從上下散也。身體皆重，太陰之氣逆也。

肝足厥陰之脈，是主肝所生病者，胷滿嘔逆。

註 是主肝所生之病者，胷滿嘔逆，蓋食氣入胃，散精於肝，行氣於經，肝所生病，則肝氣厥逆，不能行散穀精，故胷

寸口脈微而數，微則無氣，無氣則榮虛，榮虛則血不足，血不足則胷中冷。

趺陽脈浮而濇，浮則爲虛，虛則傷脾，脾傷則不磨，朝食暮吐，暮食朝吐，宿穀不化，名曰胃反，脈緊而濇，其病難治。

病人欲吐者，不可下之。

嘔而胷滿者，茱萸湯主之。

乾嘔吐涎沫，頭痛，茱萸湯主之。

嘔而腸鳴，心下痞者，半夏瀉心湯主之。

乾嘔而利者，黄芩加半夏生薑湯主之。

諸嘔吐，穀不得下者，小半夏湯主之。

嘔吐而病在膈上，後思水者，解，急與之，思水者，猪苓散主之。

嘔而脈弱，小便復利，身有微熱，見厥者難治，四逆湯主之。

嘔而發熱者，小柴胡湯主之。

胃反嘔吐者，大半夏湯主之。

食已卽吐者，大黄甘草湯主之。

胃反，吐而渴欲飲水者，茯苓澤瀉湯主之。

吐後渴欲得水而貪飲者，文蛤湯主之。

乾嘔吐逆，吐涎沫，半夏乾薑散主之。

病人胷中似喘不喘，似嘔不嘔，似噦不噦，徹心中憒憒然無奈者，生薑半夏湯主之。

乾嘔噦，若手足厥者，橘皮湯主之。

是者非也。

## 漢張機金匱要略

### ㈠嘔吐

腹中寒氣，雷鳴切痛，胷脅逆滿嘔吐，附子粳米湯主之。

心胷中大寒痛，嘔不能飲食，腹中寒，上衝皮起，出見有頭足，上下痛而不可觸近，大建中湯主之。

肝中寒者，兩臂不舉，舌本燥，喜太息，胷中痛，不得轉側，食則吐而汗出也。

膈上病痰，滿喘欬吐，發則寒熱，背痛腰疼，目泣自出，其人振振身瞤劇，必有伏飲。

嘔家本渴，渴者爲欲解，今反不渴，心下有支飲故也。小半夏湯主之。

卒嘔吐，心下痞，膈間有水，眩悸者，半夏加茯苓湯主之。

假令瘦人臍下有悸，吐涎沫而癲眩，此水也，五苓散主之。

支飲者法當冒，冒者必嘔，嘔者復內半夏以去其水。先渴後嘔，爲水停心下，此屬飲家，小半夏茯苓湯主之。

心中懊憹而熱，不能食，時欲吐，其名曰酒疸。

酒黃疸者，或無熱，靖言了了，腹滿欲吐，鼻燥。其脈浮者，先吐之，沉弦者先下之。

酒疸心中熱欲吐者，吐之愈。

諸勞腹痛而嘔者，宜柴胡湯。必小柴胡湯

夫嘔家有癰膿，不可治嘔，膿盡自愈。

先嘔却渴者，此爲欲解。先渴却嘔者，爲水停心下，此屬飲家。嘔家本渴，今反不渴者，以心下有支飲故也，此屬支飲。

問曰：病人脈數，數爲熱，當消穀引食，而反吐者何也？師曰：以發其汗，令陽微，膈氣虛，脈乃數，數爲客熱，不能

# 晉王叔和脈經

㈠嘔吐之脈

右手寸口氣口以前脈陰實者，手太陰經也。病苦肺脹，汗出若露，上氣喘逆，咽中塞，如欲嘔狀。

左手關上脈陰陽俱實者，足厥陰與少陽經俱實也。病苦胃脹嘔逆，食不消。

右手關上脈陰虛者，足太陽經也。病苦泄注，腹滿氣逆，霍亂嘔吐，黃疸，心煩不得臥，腸鳴。

寸口脈細，發熱嘔吐，宜服黃芩龍膽湯；吐不止，宜服橘皮桔梗湯，灸中府。關脈滑，胃中有熱，滑為熱實，以氣滿故不欲食，食即吐逆，宜服紫菀湯下之，大平胃圓，針胃管瀉之。

關上脈浮而大，風在胃中，張口息肩，心中澹澹，食欲嘔，緊而滑者吐逆。

溫病四五日，頭痛腰痛而吐，脈來細彊，十二日死。

寸口數，即吐。

㈡吐蚘之脈

關上脈微浮，積熱在胃中，嘔吐蚘蟲，心健忘。

## 脈訣

㈠嘔吐之脈

數脈歌曰：陽數即吐兼頭疼。

脾脈歌曰：三部俱緩脾家熱，口臭胃翻長嘔逆。

有緊，脾家痛；仍兼筋急拘。欲吐即不吐，衝衝未得疎。欲知疾患多為冷，指下尋之慢極遲。吐逆不定經句日，胃氣衝

噦逆者，橘皮竹茹湯主之。

㈡吐蚘

蚘厥者，當吐蚘，今病者靜而復時煩，此爲臟寒，蚘上入膈，故煩，須臾復止，得食而嘔。又煩者，蚘聞食臭出，當自吐蚘。

蚘蟲之爲病，令人吐涎心痛，發作有時，毒藥不止，甘草粉蜜湯主之。

## 華佗中藏經

㈠論臟腑虛實寒熱

腸鳴氣走，足冷手寒，食不入胃，吐逆無時，皮毛憔悴，肌肉皺皺，耳目昏塞，語聲破散，行步喘促，精神不收，此五臟之虛也。診其脈，舉指而活，按之而微。看在何部，以斷其臟也。

肝脈緩甚，嘔逆。

肝厥不已，傳邪入膽，嘔清汁。又膽病則口苦，太息，嘔宿汁，心中澹澹，恐人將捕之，咽中介介然，數唾，其脈診在左關上浮而得之者，是其部也。

心氣實則小便不利，腹滿身熱而重溫，溫欲吐，吐而不出，喘息急，不安臥，其脈左寸口與人迎皆實大者是也。

脾者土也，其病則面色痿黃，實則舌強直，不嗜食，嘔逆，四肢緩。夫脾病也，色黃體重，失便，目直視，唇反張，爪甲青，四逆吐食，百節疼痛，不能舉，其脈當浮大而緩，今反弦急，其色反青，此十死不可治也。

胃者腑也，實則中脹便難，肢節疼痛，不下食，嘔吐不已，寒則腹中痛，不能食冷物，痛甚則腹脅脹滿，嘔吐，不入食，當心上下不通，惡聞食臭，嫌人語，振寒，喜伸欠。

上焦寒則不入食，吐酸水，胷背引痛，嗌乾，津不納也。病內外俱虛，臥不得安，身冷脈細微，嘔而不入食者，死。

虛寒氣在上，實氣在下，二氣並爭，但出不入，其人即噦而不得食，恐怖如死，寬緩即瘥。噦而脈弱，小便復利，身有微熱，見厥難治。

凡服湯嘔逆不入腹者，先以甘草三兩，水三升，煮取二升，服之得吐。但服之不吐，益佳。消息定，然後服餘湯，即流利，便不吐也。凡嘔者多食生薑，此是嘔家聖藥。

## 宋朱肱活人書

### (一)嘔吐證

傷寒三四日，胷脅痛而耳聾，或口苦舌乾，或往來寒熱而嘔，其尺寸脈俱弦，此足少陽膽經受病也。太陽病不解，轉入少陽，脅下鞕滿，乾嘔不能食，往來寒熱，尚未可吐下。診其脈弦緊者，小柴胡湯主之。蓋脈弦細頭疼發熱屬少陽，少陽受病口苦咽乾目眩，宜小柴胡湯以解表，不可發汗，發汗則讝語，讝語屬胃，胃和則愈，不和則煩而躁，宜調胃承氣湯。此屬少陽陽明也。

嘔吐者不可下。仲景云：『嘔多雖有陽明證，不可下。陽明病脅下硬滿，不大便而嘔，舌上白胎者，宜與小柴胡湯。上焦得通，津液得下，胃氣因和，身濈然汗出，得屎而解。』

無陽則厥，無陰則嘔。嘔者，足陽明胃之經，足陽明之氣下行，今厥而上行，故爲氣逆，氣逆則嘔。仲景云：『嘔多雖不大便，不可下，可與小柴胡湯。上焦得通，津液得下，胃氣因和，浹然汗出而解。』大抵嘔證不一，各有治法，要之小柴胡湯尤相主當耳。與小柴胡湯，胷脅滿而嘔，日晡發潮熱者，可小柴胡湯加芒硝也。若嘔不止，心下急，鬱鬱微煩者，與大柴胡湯也。大便祕，老方加大黃。大柴胡治嘔最妙，爲內有枳實故也。枳實去穢，壓虛氣。須是去大黃。仲景云：『嘔多雖有陽明，愼不可下。』官局桔梗湯最良，亦用枳實耳。』古人治嘔多用半夏生薑。孫眞人云：『生薑是嘔家聖藥。』仲景治嘔皆用之。太陽與陽明合病，必下利；若不利，但嘔者，葛根加半夏生薑湯主之。胷中有熱，胃中有邪氣，

心得幾時」

滑脈歌曰：滑脈居寸多嘔逆。

雜病生死歌曰：內實腹脹痛滿盈，心下牢強乾嘔頻，手足煩熱脈沉細，大小便澀死非眞。

外實內熱吐相連，下清注穀轉難安。忽然診得脈洪大，莫費神功定不痊。

凡脈尺寸緊數形，又似釵直吐轉增。此患蠱毒急須救，速求神藥命難停。

## 唐孫思邈千金方

### (一)嘔吐諸證

脾病，其色黃，體青失溲，直視，脣反張，爪甲青，飲食吐逆，體重節痛，四肢不舉，其脈當浮大而緩，今反弦急，其色當黃而反青者，此是木剋土，爲大逆，十死不治。少陰病，飲食入口即吐，心中慍慍然欲吐，復不能吐者，宜吐之。宿食在上脘，宜吐之。

心病煩悶，少氣大熱，熱上盪心，嘔欬吐逆，狂語，汗出如珠，身體厥冷，其脈當浮，今反沉濡而滑，其色當赤而反黑者，此是水剋火，爲大逆，十死不治。

下焦如瀆，若實則大小便不通利，氣逆不續，嘔吐不禁，故曰走哺。

黃疸之病，發於陰部，其人必嘔，發於陽部，其人振寒而微熱。

夫人病酒疸者，或無熱，靖言了了，腹滿欲吐嘔者，宜吐之。方用苦參散七味者，是酒疸必小便不利，其候當心中熱，足下熱，是其證也。

夫吐家，脈來形狀如新臥起，陽緊陰數，其人食已即吐，陽浮而數，亦爲吐，寸口脈緊而芤，緊即爲寒，芤即爲虛，虛寒

## 嚴用和濟生方

### ㈠嘔吐論治

夫人受天地之中以生，莫不以胃爲主，蓋胃受水穀，脾主運化生血生氣，以縈四體者也。若脾胃無所傷，則無嘔吐之患。其或飲食失節，温涼不調，或喜餐腥膾乳酪，或貪食生冷肥膩，露臥濕處，當風取涼，動擾於胃，胃既病矣，則脾氣停滯，清濁不分，中焦爲之痞塞，遂成嘔吐之患焉。然此特論飲食過傷風涼冷濕之所由致者。又如憂思傷感，宿寒在胃，中脘伏痰，胃受邪熱，瘀血停蓄，亦能令人嘔吐，臨病宜審之。

## 金劉完素六書

### ㈠嘔吐

諸嘔吐酸，暴注下迫，皆屬於熱，流而不腐，動而不蠹，故吐嘔。酸者，胃鬲熱甚，則鬱滯於氣，物不化而爲酸也。酸者，肝木之味，或言吐酸爲寒者誤也。

胃膈熱甚則爲嘔，火氣炎上之象也。

吐酸，酸者肝木之味也。由火盛制金，不能平木，則肝木自甚，故爲酸也。如飲食熱則易於酸矣。或言吐酸爲寒者，誤也。又如酒之味苦而性熱，能養心火，故飲之則令人色赤氣粗，脈洪大而數，語澀譫妄，歌唱悲笑，喜怒如狂，冒昧健忘，煩渴嘔吐，皆熱證也，其吐必酸，爲熱明矣。况熱則五味皆厚，經曰：『在地爲化，化生五味，皆屬土也』。然土旺勝水，不能制火，則火化自甚，故五味熱食則味皆厚也。是以肝熱則口酸，心熱則口苦，脾熱則口甘，肺熱則口辛，腎熱則口鹹。或口淡者，胃熱也。胃屬土，土爲萬物之母，故胃爲一身之本，淡爲五味之本，然則吐酸豈爲寒者與？所以妄言爲寒者，但謂多傷生硬黏滑，或傷冷物而喜噫醋吞酸，故俗醫主於温和脾胃，豈知經言人之傷於寒也，則爲病

腹痛欲嘔者，黃連湯主之。太陽與少陽合病而自利，若嘔者，黃芩加半夏生薑湯主之。金匱諸嘔吐穀不得下者，小半夏湯，小半夏加茯苓湯，小半夏加橘皮湯，皆可選用。嘔而發熱者，小柴胡湯主之。嘔而發渴者，猪苓湯主之。先嘔却渴者，此爲欲解，急與之。先渴却嘔者，爲水停心下，此屬飲家。仲景云：『本渴飲水而嘔者，柴胡不中與也，宜治膈間之水，赤茯苓湯主之。若少陰證而嘔者，眞武湯去附子加生薑。若汗若吐若下後，虛煩不得眠，若嘔者，梔子生薑湯主之。傷寒差後，嘔者，有餘熱在胃脘，竹葉湯加生薑主之。』

大凡嘔者，飲食不下，乾嘔者，今人所謂啘也。或因汗出，或因有水，或因下利，脾胃有熱，故使乾嘔。官局中桔梗湯最佳，仲景治法汗自出乾嘔者，桂枝證也，表不解，心下有水氣，乾嘔發熱者，小青龍也。身涼汗出，兩脅痛，或乾嘔者，十棗湯也。少陽下利脈微，與白通湯，利不止，厥逆無脈，乾嘔煩者，白通加猪膽汁湯也。少陰下利，裏寒外熱，脈微欲絕或乾嘔者，通脈四逆湯也。乾嘔吐涎沫頭痛者，吳茱萸湯也。傷寒論曰：『食穀欲嘔，屬陽明也。吳茱萸湯主之。得湯反劇者，屬上焦也。仲景無治法。』大抵吳茱萸湯治少陰證也，穀入胃而嘔，屬陽明，宜與小柴胡湯。

若病人直患嘔吐，而復脚弱或疼，乃是脚氣，當作脚氣治之，法在脚氣門。

吐有冷熱二證，寸口脈數，手心熱，煩渴而吐，以有熱在胃脘，五苓散主之。傷寒有表證，渴欲飲水也。水入口卽吐者，名曰水逆，由心經受熱而小腸不利故也，宜服五苓散。發汗後，水藥不得入口爲逆，若更發汗，必吐下不止，小半夏加茯苓湯，大半夏加橘皮湯主之。曾經汗下，關脈遲，胃中虛冷而吐，乾薑黃芩黃連人參湯主之。寒多不飲水而吐者，理中湯去朮加生薑主之。少陰病，飲食入口則吐，心中溫溫欲吐，復不能吐，始得之手足寒，脈弦遲者，此胷中實不可下也，當吐之。若膈上有寒飲，乾嘔者，不可吐也，當溫之，宜四逆湯。吐利手足逆冷，煩躁甚者，吳茱萸湯主之。若傷寒解後，虛羸少氣，氣逆欲吐，竹葉石膏湯主之。

身涼汗出，兩脅疼痛，或乾嘔，此十棗湯證也。

脘有膿而嘔也。諸如此者，雖有殊別，大抵傷寒表邪欲傳裏，裏氣上逆，則爲嘔也。是以半表半裏證多云嘔也。傷寒三日三陽爲盡，三陰當受邪，其人反能食而不嘔，此爲三陰不受邪，是知邪氣傳裏者，必致嘔也。至於乾薑附子湯證云：『不嘔不渴，爲裏無熱。』十棗湯證云：『乾嘔短氣，汗出不惡寒者，此表解裏未和也。』即此觀之，其嘔爲裏熱明矣。嘔家之爲病，氣逆者必散之，痰飲者必下之。千金曰：『嘔家多服生薑，此是嘔家聖藥。』是要散其逆氣也。金匱要略曰：『嘔家用半夏以去其水，水去嘔則止。』是要下其痰飲也。嘔多雖有陽明證，不可攻者，謂其氣逆而收斂爲實也。其嘔而脈弱，小便復利，身有微熱見厥者，俱爲難治。蓋謂其虛寒之甚也。醫者必審其邪氣之虛實，疾證之逆順，而施藥圖治，則當矣。

## 元李杲十書

㊀用藥宜禁

吐多不得復吐，如吐而大便虛輭者，此上氣壅滯，以薑橘之屬宣之。吐而大便不通，則利大便，當歸桃仁麻仁郁李仁皂角仁，則所當禁也。

㊁論證分經

『嘔吐噦，胃所主，各有經乎？』答曰：『胃者總司也，內有太陽陽明少陽三經之別，以其氣血多少，而與聲物有無之不同，卽吐屬太陽，有物無聲，乃血病也。有食入卽吐，嘔食已則吐，食久則吐之別。嘔屬陽明，有物有聲，氣血俱病也。仲景云：『嘔多雖有陽明證，不可下。』

## 朱震亨心法

熱？蓋寒傷皮毛則腠理閉密，陽氣怫鬱，不能通暢，則爲熱也。故傷寒身表熱者，熱在表也，宜以麻黃湯類甘辛熱藥發散，以使腠理開通，汗泄熱退而愈。凡內傷冷物，或即陰勝陽而爲病，寒，或寒熱相擊而致腸胃陽氣怫鬱而爲熱者，亦有內傷冷物而反病熱，得大汗熱泄身涼而愈也，或微而不爲他病，止爲中酸，俗謂之酢心是也。法宜溫藥散之，亦猶解表之義，以使腸胃結滯開通怫熱而和也。若久吞酸而不已，則不宜溫之，宜以寒藥下之，後以涼藥調之，結散熱去則氣和也。所以中酸不宜食黏滑油膩者，是謂能令陽氣壅塞，鬱結不通暢，如飲食在器，覆蓋而自酸也，宜餐糲食蔬菜，能令氣之通利。

吐利腥穢，腸胃寒而傳化失常，子能制鬼賊，則己當自實，故寒勝火衰，金旺而吐利腥穢。腥者金之臭，由是熱則吐利酸臭，寒則吐利腥穢，亦猶飯漿熱則易酸，寒則水腥也。

凡嘔吐者，火性上炎也，無問表裏，通宜涼膈散。傷寒雜病一切嘔吐，調胃承氣湯。煩悶乾嘔，黃連解毒湯。嘔吐煩渴者，桂苓甘露飲五苓散。眩欬嘔者白虎加半夏橘皮湯。寒嘔吐四肢厥逆，清涼調胃散。濕溫內甚，惡心嘔吐者，白虎解毒湯。

## 成無己明理論

### ㊀嘔吐論

傷寒嘔吐何以明之？嘔者，有聲者也，俗謂之啘。吐者，吐出其物也，故有乾嘔而無乾吐。是以於嘔則曰食穀欲嘔，及吐則曰飲食入口即吐，則嘔吐之有輕重可知矣。傷寒嘔有責於熱者，有責於寒者，至於吐家則悉言虛冷也。經曰：『太陰之爲病，腹滿而吐，食不下，自利益甚，時腹自痛。』又曰『胃中虛冷，故吐也。』嘔家則不然。嘔有熱者，有寒者，有停飲者，有胃脘有膿者，皆當明辨之。嘔而發熱者，柴胡湯證具，與其嘔不止，心下急，鬱鬱微煩，大柴胡湯主之，[illegible]寒飲乾嘔者，不可吐也，當溫之。與其乾嘔吐涎沫頭痛者，吳茱萸湯主之，是寒邪爲嘔

謂寒藥不可治酸，而用安胃湯加減二陳湯，俱犯丁香，且無治濕熱鬱積之法，爲未合經意。予嘗治吞酸，用黃連茱萸各製炒，隨時令迭爲佐使，蒼朮茯苓爲主病，湯浸炊餅爲小丸呑之，仍敎以粗食蔬菜自養，則病易安。』

## 王履溯洄集

### ㊀嘔吐乾嘔噦欬逆辨

嘗讀成無己傷寒明理論有曰：『嘔者，有聲者也，俗謂之啘。吐者，吐出其物也，故有乾嘔而無乾吐。是以於嘔則曰食穀欲嘔，及吐則曰飲食入口卽吐，則嘔吐之有輕重可知矣。』又曰：『噦者，俗謂之欬逆是也。』余竊疑之，於是卽仲景傷寒論以考其是非，以訂其說。夫傷寒論曰嘔，曰吐，曰乾嘔，曰噦者，至多，曰欬逆者，則二而止也。因類聚而觀之。夫嘔者，東垣所謂聲物兼出者也。吐者，東垣所謂物出而無聲者也。至若乾嘔與噦，皆聲出而無物也，東垣但以噦該之，而無乾嘔之論。夫乾嘔與噦，其所異者，果何在哉？微甚而已矣。故仲景於乾嘔則皆平易言之，於噦則曰：『太陽中風，火刼發汗後，久則譫語，甚者至噦。』又曰：『陽明中風若不屎，腹滿加噦者，不治。』又曰：『大吐大下之極虛，復極汗出者，因得噦。』雖亦間有似平易言者，然比之言乾嘔則徑庭矣。竊又思之，乾嘔與噦，東垣視爲一，仲景視爲二，由爲一而觀之，固皆聲之獨出者也，由爲二而觀之，則乾嘔乃噦之微，噦乃乾嘔之甚，乾嘔者其聲輕而短，噦者其聲重大而長，長者雖有微甚之分，蓋一證也。今成氏乃以嘔爲有聲，與乾嘔混而無別，又以噦爲欬逆，若此者，余未之能從也。夫仲景以聲物兼出而名爲嘔，以物獨出而名爲吐，以聲獨出而名爲乾嘔，惟其嘔兼聲物，故無物而聲空鳴者，乃謂之乾，乾猶空也。至於吐則是必有物矣，其可謂之乾乎？仲景於嘔字加一乾字，所以別夫嘔爲聲物兼出者耳。成氏乃以嘔爲獨有聲，而同乎乾嘔，得不有失仲景措辭之本意歟？仲景曰：『嘔家有癰膿者，不可治嘔，膿盡自愈。』夫謂之嘔盡膿，其可以嘔爲獨有聲乎？至於曰得湯則嘔，得食而嘔，飲食則嘔，貪水者必嘔

㈠嘔吐。

凡有聲有物謂之嘔吐，有聲無物謂之噦。

胃中有熱膈上有痰者二陳湯加炒山梔黃連及生薑。有久病嘔者，胃虛不納穀也，用人參生薑黃芪白朮香附之類大抵嘔吐以半夏橘皮生薑爲主，劉河間謂嘔者火氣炎上此特一端耳。有痰膈中焦，食不得下者，有氣逆者，有寒氣鬱於胃口者，有食滯心肺之分而新食不得下而反出者，有胃中有火與痰而嘔者。

嘔吐藥忌苦蔞杏仁桃仁蘿蔔子山梔，皆要作吐丸藥帶香藥行散不妨。

注船大吐，渴飲水者，卽死。童便飲之最妙。

惡心有痰有熱有虛，皆用生薑，隨證佐藥。藏云：『惡心者，有聲無物，心中欲吐不吐，欲嘔不嘔，雖曰惡心，實非心經，病皆在胃口上，宜用生薑，蓋能開胃豁痰也。』

惡心欲吐不吐，心中兀兀，如人畏舟船，宜大半夏湯，或理中湯加半夏亦可。又胃中有熱惡心者，以二陳加生薑汁炒黃連黃芩各一錢，最妙。

蚘厥者乃胃寒所生。經曰：『蚘者，長蟲也。胃中冷卽吐蚘蟲，』宜理中湯加炒川椒五粒，檳榔半錢，吞烏梅丸效。蚘見椒則頭伏故也。

## 局方發揮

㈠吐酸

或曰：『吐酸，素問以爲熱，東垣又言爲寒，何也？』予曰：『吐酸與呑酸不同，吐酸是吐出酸水如酢，平時津液隨上升之氣，鬱積而成，鬱積之久，濕中生熱，故從火化，遂作酸味，非熱而何？其有積久不能自涌而出，伏於肺胃之間，咯[illegible]香熱湯丸，津液得行，亦得暫解，

㊀嘔吐

吐多者，理中丸去白朮加生薑。氣上逆者，則吐多。朮甘而壅，非氣逆者之所宜，千金曰：『嘔家多服生薑，此是嘔家聖藥，生薑辛散，於是吐者多加之。

傷寒吐而身熱，或不熱者，治用小半夏加茯苓湯，或小半夏加橘皮湯，或乾薑黃芩黃連人參湯治之。吐而手足寒或煩躁，治用四逆湯。

臟寒蚘上入膈，故吐蚘。此乃胃氣虛寒，非實寒也，治用仲景理中湯。

## 明戴思恭證治要訣

㊀論嘔吐

嘔與吐之辨，已於傷寒論之，然證亦不一：有寒嘔，有熱嘔，氣嘔，痰嘔，吐食嘔，吐血吐蚘，惡心乾嘔，除熱嘔吐血外，近世嘔吐二字皆通用，然却無甚利害，於理亦自不妨。並小半夏茯苓湯，或二陳湯多加生薑煎。生薑嘔中之聖藥，大痛，色如青菜色者，死。

寒嘔，中脘停寒，飲食喜辛熱物，入口即吐出，宜二陳湯加丁香十粒，或理中湯加枳實半錢，不效則溫中湯，甚則附子理中湯，或丁附湯，並須冷服。蓋冷遇冷則相入，庶不吐出。有痰飲粥藥到口即吐，人皆謂其翻胃，非也。此乃痰氣結在咽膈之間，宜先以薑蘇湯下靈砂丹，俟藥可進，則以順氣之藥繼之。

外有吐瀉及痢疾，或腹冷痛，進熱劑太驟，以致嘔逆，宜二陳湯加砂仁白豆蔻各半錢，甚則入沉香少許。寒熱氣食痰血六嘔。外有漏氣走哺。漏氣者，上焦熱，食必先吐而後下，汗出，身胃熱。走哺者，下焦熱，氣逆不續，大小便不通，嘔

之類,亦不可以嘔爲獨有聲矣。又少陰病,下利,用通脈四逆湯一條,其所敍諸證,既有乾嘔之文,何下文加減法中,又曰:『嘔者,加生薑?』設仲景果以嘔爲獨有聲,則又不當立乾嘔之名矣。觀其既曰嘔,又曰乾嘔,則其義之殊別也,詎不著明也哉?且仲景嘗言欲嘔矣,又言欲吐矣,未嘗言欲乾嘔欲噦也。夫欲之爲義,將出未出,而預有所覺之辭也。夫將出未出而預覺者,惟有形之物,無形之聲則不然也。有形之物,將出乎胷膈之間,則雖未出,而亦可以前知,若無形之聲,則不能前知其將出,必待夫既出而後可知也。嘔與吐主有形之物言,故可謂之欲。乾嘔與噦主無形之聲言,故不可謂之欲。成氏引食穀欲嘔,飲食入口即吐二句,而謂嘔吐有輕重,其意蓋以嘔言欲而爲輕,吐言即而爲重,安知言欲不言欲者,本爲有形無形設,不爲輕重設也?果如其說,則得湯則嘔,得食而嘔,心中溫溫欲吐,氣逆欲吐之語,不出於仲景乎?又引俗謂之啘一句以證嘔,夫啘與噦蓋字異而音義俱同者也,以之證嘔亦疏矣。雖然,以嘔與吐較之,吐輕於嘔,以吐與乾嘔較之,乾嘔輕於吐,然三者亦各自有輕重,必非三者之比矣。故太素曰:『木陳者其葉落,病深者其聲噦,夫噦雖亦有輕而可治,重而不可治者,然病至於噦,則其治也終不易矣。』

## 張潔古活法機要

### ㈠吐證

吐證有三,氣積寒也。皆從三焦論之:上焦在胃口,上通於天氣,主納而不出;中焦在中脘,上通天氣,下通地氣,主腐熟水穀,下焦在臍下,通於地氣,主出而不納。是故上焦吐者,皆從於氣,氣者,天之陽也。其脈浮而洪,其證食已暴吐,渴欲飲水,大便結燥,氣上衝而胷發痛,其治當降氣和中。中焦吐者,皆從於積,有陰有陽,食與氣相假爲積而痛,其脈浮而弦,其證或先痛而後吐,或先吐而後痛,治法當以小毒藥去其積,檳榔木香和其氣。吐者,皆從於寒地道也,其脈沉而遲,其證朝食暮吐,暮食朝吐,小便清利,大便祕而不通。治法當以大毒藥通其祕塞,溫其寒氣,大便漸通,復以中焦藥和之,不令大便祕結而自愈也。』

渴而吐或乾嘔者，理中湯去白朮加生薑。嘔而吐涎沫者，吳茱萸湯。太陰厥陰間有嘔吐，太陰宜理中湯，厥陰宜四逆湯，並加生薑煎。已上陰證乃陰中之陰，宜用熱劑。陽入陰者能爲利而不嘔，嘔屬上而近於外也。陽之所入者深，故利也。又有陽證病新瘥後見嘔，並無別因，此飲熱在胃脘也，宜竹葉石膏湯或橘皮竹茹湯。

大凡得之太陽而嘔者，必是合病，嘔乃病漸入內，非正太陽也。曾記有人初得病太陽證大嘔吐不止，藥投暖劑，莫能治之，知太陽已汗解，固當用冷劑，是太陽見嘔，非合陽明則合少陽，其嘔爲熱，用暖劑非矣。曾見太陽證大嘔不用嘔吐藥，只解表自除。

又記有人初病具太陽證而嘔，一家少長患狀悉類，進養胃湯八服，無不立效。此時行之氣，適然如此，是爲傷寒雜病，又非可以正經傷寒律之。

傷暑嘔而渴者，浸冷香薷湯，或五苓散，兼吞消暑丸。嘔不止者，枇杷葉散，去茅根，吞來復丹。嘔而有痰，却暑散吞消暑丸，或小半夏茯苓湯，或消暑飲。

傷酒惡心，嘔逆吐出宿酒，昏冒眩運，頭痛如破，宜沖和湯，半夏茯苓湯，或理中湯加乾葛七分，或用末子理中湯，和縮脾飲。傷食之證，胷膈痞塞，吐逆嚥酸，噫敗卵臭，畏食，頭痛發熱惡寒，病似傷寒，但身不痛耳。治中湯加砂仁一錢，或紅圓子小七香圓和服。

食過多而傷，停留中脘，聞食氣則嘔，二陳湯加砂仁一錢。未愈，更加丁香半錢，或治中湯加砂仁一錢，丁香十粒。大嘔不止者，大便去之，枳實半夏湯加砂仁一錢，白豆蔻仁半錢，嚥感應圓。

## 王綸明醫雜著

### ㈠吐酸吞酸

吐不禁。

凡進熱藥愈增者，當於寒嘔中求熱嘔，宜二陳湯加黃連一錢。氣嘔胷滿膈脹，關格不通，不食常飽，食則常氣逆而吐，此因盛怒中飲食而然，宜二陳湯加枳實木香各半錢，或吳茱萸湯；不效則丁沉透膈湯，及五膈寬中湯。

食嘔多因七情而得，有外感邪氣，並飲食不節而生，大槩治以理中爲先，二陳湯加枳實一錢，或加南星七分，沉香木香各四分，亦好。或只服枳南湯，或導痰湯。

又有中脘伏痰，遇冷卽發，俗謂之冷痸，或服新法半夏湯，或抓脾湯。外有熱痰而嘔者，宜小半夏茯苓湯，加竹茹如錢大。若嘔痰而或致厥者，乃寒痰逆悶，謂之痰厥，宜薑附湯，以生附代熟附。

惡心乾嘔，欲吐不吐，心下映漾如畏船人，宜大半夏湯，或小半夏茯苓湯，或理中湯治中湯，皆可用。

嘔吐諸藥不效，當借鎭重之藥，以墜其逆氣，宜薑蘇湯下靈砂丹，須百粒作一服，俟藥得效，却以養正丹半硫圓導之嘔吐，津液旣去，其口必渴，不可因渴而遂以爲熱。

又有嘔吐諸藥不效，又別無前項痰氣等證，乃蚘在胷膈作嘔，見藥則動，動則不納藥，藥出而蚘不出，雖非吐蚘之比，亦宜用吐蚘藥。或於治嘔藥中，入炒川椒十粒，蚘見椒則頭伏故也。

曾有患人，用附子理中湯四逆湯，加丁香到口卽吐，後去乾薑，只參附加丁木二香煎熟，更磨入沉香藥，立吐定。蓋虛痰氣凝結，丁附旣溫，佐以沉木則自通，乾薑白朮則泥耳。

風寒嘔吐，有寒熱二證，無物爲嘔，有物爲吐。何以吐爲有物？古語只聞有乾嘔，不聞乾吐，太陽與陽明合病，身熱頭疼項強煩熱，鼻乾目疼而嘔，宜葛根湯加半夏一錢。太陽與少陽合病，頭疼腰疼，往來寒熱，胷脅疼痛而嘔，宜黃芩湯加半夏一錢半，入生薑五片煎。若少陽證具，不係合病，嘔而熱者，宜小柴胡湯。若陽明證具，雖顯然有可下之者，兼之嘔多，猶屬上焦，未可遽下，宜小柴胡湯。若太陽不與少陽陽明合病，而獨見太陽證，或吐瀉者，恐病人膈間，素[illegible]太陽經[illegible]。若先嘔卻渴者，宜豬苓湯，先渴却嘔者，爲膈間有

# 欽定古今圖書集成醫部全錄

## 醫部彙考二百四十九

### 嘔吐門二

明李梴醫學入門

㈠嘔分乾濕

濕嘔有聲有物，食已則嘔，乾嘔空嘔無物，總屬陽明氣血俱病，故嘔比吐爲重。熱嘔口苦，煩渴脈數，手心身熱，寒嘔頭痛胷滿，厥冷吐沫，脈遲吐噦餶呃，皆然。濕嘔表邪傳裏，裏氣上逆，故半表裏證多嘔也。三陽發熱者，俱小柴胡加生薑主之。胷滿日晡潮熱，加芒硝，嘔不止，便閉者，大柴胡湯。嘔多雖有陽明證，胃薄不可下者，甘桔湯。煩渴者，半嘔後渴爲欲解，猪苓湯。先渴後嘔爲停水，赤茯苓湯。飲水卽嘔者，五苓散。虛煩渴者，竹葉石膏湯加薑汁或梔豉湯。上熱下寒嘔者，黃連湯。胃寒下利厥冷不渴者，理中湯去朮加薑汁，或正氣湯加薑汁。少陰三證，膈上寒飮嘔吐涎沫，或吐利而渴者，四逆湯加生薑。脈沉或欬或悸，挾水氣者，眞武湯去附子加薑汁。手足寒，心中溫溫，欲吐不吐，憒憒無奈何者，生薑汁半夏湯。經汗下虛者，乾薑芩連人參湯。汗後水藥及穀食不下者，危，小半夏湯救之。又有溫毒嘔者，心悶發斑，水證嘔者，先嘔怔忡，嘔膿血者，腥臊氣逆上衝，嘔盡自愈。乾嘔，胃熱與穀氣相併上熏，心下痞塞，故嘔則無所出，食則不能納，黃連解毒湯。有太陽無汗乾嘔者，風邪上壅也，

若素有痰火，胃膈鬱塞，嘈酸噯氣，及素有吞酸吐酸之證，或有酒積泄瀉結痛，此皆濕熱也，枳朮丸加黃連薑汁炒白芍藥酒炒陳皮各一兩，石膏生甘草各五錢，縮砂木香各一錢，川芎四錢。

註按前證吐酸吞酸，大略不同。吐酸者濕中生熱，吞酸者虛熱內鬱，皆屬脾胃虛寒，中傳末證，故內經以爲火者，指其病形而言也。東垣以爲胃寒者，指其病本而言也。凡患此者，先當辨其吞吐，而治以固本元爲主。若服寒涼，復傷胃氣，則實實虛虛者矣。復審其脾氣虛而飲食不能輸化，濁氣不能下降者，須用六君子湯補養脾胃爲主，少佐越鞠丸以清中。故東垣先生云，邪熱不殺穀，若悞認爲實熱而忘用寒涼，必變敗證。

嘔家不可下者常也，如喜冷煩渴，胷滿腹痛甚，大便閉者，大小膀胱結也。熱者，大柴胡湯下之，虛者潤之。

㈥濕痰火水

嘔吐痰火爲多，二陳湯加薑炒芩連，或小調中湯主之。肝火衝胃者，單黃連丸，或單入中白，薑汁化服。脾經濕痰鬱滯上中二焦，時時惡心，吐出清水，或如豆汁者，胃苓湯加半夏檳榔。水嘔心下怔忡，先渴後嘔者，赤茯苓湯。先嘔後渴者，猪苓湯。水入即吐者，五苓湯。

㈦膿血風暑

腥氣臊氣，熏炙惡心嘔吐，雜以涎血，此膿血聚於經中，所謂嘔家有癰膿不須治，膿盡自愈，四物倍赤茯苓牡丹皮。虛者八珍湯加陳皮。

風邪在胃，翻翻不定，或鬱酸水，全不入食者，不換金正氣散，麥冬湯，安脾丸，不宜輕用參朮補住，邪氣反甚。惟久病脅痛者，木剋土也，方敢用六君子湯，加青皮芍藥柴胡升麻川芎砂仁神麴。治水熱者，小柴胡湯加青黛薑汁，蒸餅爲丸服。

暑吐煩渴，黃連香薷散，六一散加砂仁，或枇杷葉散，錢氏白朮散。

㈧蚘蟲

久病胃氣虛弱，全不納食，聞食氣則嘔者，四味藿葉湯，或四君子湯，去茯苓加香附參芪。胷痞短氣者，調中益氣湯。胃虛寒痰作嘔者，增半湯。

蟲吐時常惡心，胃口作痛，口吐清水，得食暫止，饑則甚者，胃中有蚘也。二陳湯加苦楝根史君子白朮烏梅，或用錫灰檳榔等分，米飲調服亦可。凡吐如青菜汁者，死。此是乍然嘔吐，非翻胃比也。

桂枝湯。有太陽陽明合病，不下利而但嘔或乾嘔者，裏實氣逆上而不下也，葛根湯。胃寒津枯乾嘔渴者，理中湯。少陰三證，乾嘔下利脈微者，白通湯。裏寒外熱脈微欲絕者，通脈四逆湯。利不止，煩躁厥逆無脈者，白通加猪膽汁湯。厥陰頭痛乾嘔吐痰，或自利厥冷煩躁者，三味參萸湯。胷中似喘不喘，似嘔不嘔，似噦不噦，憒憒無奈何者，生薑汁半夏湯，大小橘皮湯。

㈡吐別腥酸

吐有物無聲，食入即吐，丹溪以屬太陽血病，然胃實主之。吐利腥臊者爲寒，酸臭者爲熱，治與嘔噦一同。凡嘔吐脚軟痛者，脚氣也。嘔吐脈弱，小便自利，身微熱而厥者，虛極難治。

㈢有冷熱氣食之殊

胃冷嘔清，手足厥，食久乃吐，二陳湯加薑桂，甚則加丁附，或丁香半夏丸。胃熱面紅，手足熱，食已即吐，二陳湯加薑炒芩連山梔，暴甚略加檳榔木香。胃口痛加薑汁，或葛根竹茹湯，加味橘皮竹茹湯，或小柴胡湯加竹茹。如時常口吐清水冷涎，自下湧上者，此脾熱所致也，二陳湯加白朮白芍升麻炒芩連山梔神麴麥芽乾生薑等分，或丸或煎，服。

凡氣吐者，氣衝胷痛，食已暴吐而渴，治當降氣和中，六君子湯，加木香藿香桔梗枇杷葉。或七氣湯熱氣衝者，古荊黃湯，加人參甘草。

中焦吐者，食積與氣，或先吐而後痛，或先痛而後吐，治當以木香檳榔等分爲末，調服行氣，紫沉丸。消積尋常平胃散二陳湯加青皮砂仁白豆蔻山樝神麴調之。

㈣下焦寒

下焦吐者，寒也。朝食暮吐，暮食朝吐，久則小便清利，大便不通，乃陰氣偏結，不與陽和，治當溫其寒而通其祕，復以

因上焦傷風，邪氣內著，麥門冬湯。二便不通，氣逆不續，名曰走哺，此下焦實熱，人參湯主之。乾嘔氣逆，橘皮生薑等分。惡心，胃傷虛者，人參橘紅茯苓甘草半夏生薑；實者，枳殼砂仁橘紅半夏白蔻藿香。嘔苦，邪在膽經，黃連甘草生薑橘皮柴胡。吐酸，責之肝臟，挾熱者，左金丸加白蔻生薑竹茹梔子；挾寒者，左金丸加丁香乾薑白朮沉香。嘔清水者多氣虛，六君子湯加赤石脂。吐蚘蟲者，皆胃冷，理中湯加川椒五粒，檳榔五分，呑烏梅。詳別其因，對證用藥，不膠於一定之跡，乃可應無窮之變耳。

## 陶華六書

### (一)論乾嘔

乾嘔者，空嘔而無物出也。大抵熱在胃脘，與穀氣併，熱氣上熏，心下痞結，則有此證。太陽汗出乾嘔，桂枝湯，主自汗也。少陰下利，乾嘔生薑湯，主下利也。厥陰吐涎沫，乾嘔，吳茱萸湯，主涎沫也。

邪去嘔自止。又有水氣二證，太陽表不解，心下有水氣，身熱乾嘔者，微喘或自利，小青龍湯。不發熱，只惡寒，脅痛欬而利乾嘔者，亦水氣也，十棗湯。膈上有寒飲乾嘔者，屬少陰，四逆湯也。

傷寒熱在胃口，與穀氣併，熱氣上熏，無物，名乾嘔，分實熱水氣治之，此與噦證不相類。

三四日邪傳少陽，膽脅痛而耳聾，寒熱嘔而口苦，按至半陰半陽及脈來弦數者，是半表半裏也。緣膽無出入之路，用小柴胡，其經有三禁，汗下吐也。蓋陽明與少陽三經，不從乎中治也。中者半表半裏而陽交中，名曰少陽也。

### (二)論嘔吐

嘔者，聲物俱出者也。吐者，無聲而但出物者也。故仲景復重言乾以別之，則嘔爲有物明矣。乾猶空也，但空嘔而無所出耳。然嘔吐俱有物出，較之輕重，則嘔甚於吐。蓋表邪搏裏，裏氣上逆，故嘔吐而水穀不下也。有胃熱脈弦數口

# 李中梓醫宗必讀

## ㈠嘔吐論

愚按古人以嘔屬陽明，多氣多血，故有聲有物，血氣俱病也。吐屬太陽，多血少氣，故有物無聲，血病也，噦屬少陽，多氣少血，故有聲無物，氣病也。東垣以嘔吐噦俱屬脾胃虛弱，或寒氣所客，或飲食所傷，致上逆而食不得下也。潔古老人從三焦分氣積寒三因，上焦在胃口，上通天氣，主納而不出，中焦在中脘，上通天氣，下通地氣，主熟腐水穀，下焦在臍下，下通地氣，主出而不納。故上焦吐者，皆從於氣，氣者天之陽也，其脈浮而洪，其證食已卽吐，渴欲飲水，治當降氣和中。中焦吐者，皆從於積，有陰有陽，氣食相假，其脈浮而弦，其證或先痛後吐，或先吐後痛，法當去積和氣。下焦吐者，皆從於寒地道也，其脈大而遲，其證朝食暮吐，暮食朝吐，小便清利，大便不通，法當通其閉塞，溫其寒氣。後世更爲分別，食刹則吐，謂之嘔，刹者頃刻也。食纔入口，卽便吐出，用小半夏湯。食入則吐，謂之暴吐，言食纔下咽，卽便吐出，生薑橘皮湯。食已則吐，謂之嘔吐，言食畢然後吐，橘皮半夏湯。食久則吐，謂之反胃，蓋食久則旣入於胃矣，胃中不能別清濁化精微，則復反而出，水煮金花丸。再食則吐，謂之翻胃，言初食一次不吐也，第二次食下則吐，直從胃之下口翻騰上出，易老紫泥丸。旦食暮吐，暮食朝吐，乃積一日之食，至六時之久，然後吐，此下焦病，半夏生薑大黃湯。以上諸證，吐愈速則愈在上，吐愈久則愈在下，陰陽虛實之間，未易黑白判也。古方通以半夏生薑爲正劑，獨東垣云生薑止嘔，但治表實氣壅，若胃虛穀氣不行，惟當補胃推揚穀氣而已。故服小半夏湯不愈者，服大半夏湯立愈。挾寒者，喜熱惡寒，肢冷脈小，或二陳湯加丁香炮薑，或理中湯加枳實，並須冰冷與服，冷則不吐。諸藥不效者，紅豆丸神效。挾熱者，喜冷惡熱，躁渴脈洪，二陳湯加黃連梔子竹茹枇杷葉乾葛生薑蘆根汁。氣滯者，脹滿不通，二陳湯加枳實沉香木香。痰飲者，遇冷卽發，俗名冷涎泛，先以薑蘇湯下靈砂丹，繼以順氣之藥。食積者，消導乃

究其所自來哉！

㈡久病火鬱吐酸宜辛溫發散

經曰：「木鬱達之，火鬱發之。」夫久病人脾胃虛弱，屬鬱者多，此吐酸宜從東垣安胃之治，是則熱因熱用之法也。或謂東垣以吐酸為寒，誠不知東垣者也。予觀前人立論，如局方以溫熱之劑治吐酸，不能使人不致疑於寒，是未審經旨專為熱證也。知此熱者，惟劉河間一人耳。

㈢新病吐酸當從寒味

丹溪云：「凡吐酸吞酸，皆屬於熱，必用吳茱萸順其性而折之。炒黃連炒梔子為必用之藥，此則火以病酸而出治也。故只從寒味，須用茱萸，亦順其火而折之者也。」知東垣者，其惟丹溪乎？

## 王肯堂證治準繩

㈠總論

東垣曰：「夫嘔吐噦者，皆屬於胃，胃者總司也，以其氣血多少為異耳。且如嘔者，陽明也，陽明多血多氣，故有聲有物，氣血俱病也。」仲景云：「嘔多雖有陽明證，慎不可下。」孫眞人曰：「嘔家多服生薑，乃嘔吐之聖藥也。氣逆者必散之，故以生薑為主。吐者太陽也，太陽多血少氣，故有物無聲，乃血病也。有食入則吐，有食已則吐，以陳皮去白主之。噦者少陽也，少陽多氣少血，故有聲無物，乃氣病也，以薑製半夏為主。故朱奉議治嘔吐噦，以生薑半夏陳皮之類是也。究三者之源，皆因脾氣虛弱，或因寒氣客胃，加之飲食所傷而致也。宜以丁香藿香半夏茯苓陳皮生薑之類主之。若素有內傷而兼此疾，宜察其虛實，使內消之；痰飲者必下之，當分其經對證用藥，不可亂也。

㈡治法

舌煩渴，有胃寒脈弦遲，逆冷不食，小便利有水氣，先渴後嘔，膈間怔忡，有膿血，喉中腥奔逆上衝，不須治之，嘔膿盡自愈。是四者不可不辨。大抵邪半在表半在裏，則多嘔吐，及其裏熱而致吐亦有之。故經曰『嘔多雖有陽明證，不可攻之，爲其氣逆未收斂爲實也。』設或嘔而脈弱，小便復利，身微熱而見厥者，難治，以其虛寒甚也。

食穀欲嘔者屬陽明也，因得湯反劇者屬上焦，橘皮湯，小柴胡湯。似嘔似噦似喘，心下憒憒，大橘皮湯。汗下後，關脈遲緩而吐，爲胃寒，理中丸。

瘥後虛煩嘔吐，竹葉石膏湯加生薑汁。屢經汗下，食氣膈塞，食入即吐，乾薑黃芩黃連人參湯。

汗後水藥不入口者，曰道半夏茯苓湯。金匱曰『諸嘔吐穀不下，半夏湯。嘔吐脈滑數或洪發熱，茅根湯。』

## 薛己醫按

### ㈠嘔吐

若脾胃氣虛，嘔吐而胸膈不利者，用六君子湯，壯脾土，生元氣。若過服辛熱之劑，而嘔吐噎膈者，用四君子湯，加芎歸益脾土以抑陰火。若胃火內格而飲食不入者，用六君子湯，加芩連清熱養胃。若病嘔吐，食入而反出者，用六君子加木香炮薑溫中補脾。若服耗氣之劑，血無所生而大便燥結者，用四君子加芎歸補脾生血。若火逆衝上，食不得入者，用四君子加山梔黃連，清熱養血。若痰飲阻滯而食不得入者，用六君子加木香山梔，補脾化痰。若脾胃虛寒，飲食不入，或入而不化者，用六君子加木香炮薑溫補脾胃。不能慎房勞，節厚味，調飲食者不治。年高無血者，亦不治。

## 徐春甫古今醫統

甚則爲嘔，火氣炎上之象也。』此言過矣，若執而用之，其害不小。又孫眞人曰：『嘔家聖藥是生薑，』此的確之見也，勝於河間遠矣。

仲景曰：『傷寒嘔多，雖有陽明證，不可攻之。』此但以傷寒爲言也。然以余之見，則不但傷寒，而諸證皆然，何也？蓋雜證嘔吐，尤非傷寒之比，其在傷寒，則猶有熱邪，但以熱在上焦，未全入腑，則下之爲逆，故不可下也。若雜證之嘔吐，非胃寒不能化，則脾虛不能運耳。脾胃既虛，其可攻乎？且上下之病氣或無涉，而上下之元氣實相依，此嘔吐之所以不可攻者，正恐病在上而攻其下，下愈虛而上愈困耳。

㈡虛證

凡胃虛作嘔者，其證不一，當知所辨。若胃脘不脹者，非實邪也。胷膈不痛者，非氣逆也。內無熱躁者，非火證也。外無寒熱者，非表邪也。無食無火而忽爲嘔吐者，胃虛也。嘔吐無常而時作時止者，胃虛也。食無所停而聞食則嘔者，胃虛也。氣無所逆而聞氣則逆者，胃虛也。或身背或食飲微寒卽嘔者，胃虛也。或吞酸或噯腐時苦惡心，兀兀然泛泛然，冷嚥靡甯者，胃虛也。或因病誤治，妄用尅伐寒涼，本無嘔而致嘔者，胃虛也。或朝食暮吐，暮食朝吐，食入中焦而不化者，胃虛也。食入下焦而不化者，土母無陽，命門虛也。凡此虛證，必皆宜補，是固然矣。然胃本屬土，非火不生，非煖不化，是土寒者，卽土虛也，土虛者，卽火虛也。故曰：脾喜煖而惡寒，土惡濕而喜燥，所以東垣脾胃論特著溫補之法，蓋特爲胃氣而設，庸可忽哉！第在河間則言嘔因胃火，是火多實，茲余言嘔因胃寒，是寒多虛也。一熱一寒，若皆失中和之論。不知嘔因火者，非謂其必無，但因火而嘔者少，因寒而嘔者多，因胃實而嘔者少，因胃虛而嘔者多，故不得不有此辨。

虛嘔之治，但當以溫胃補脾爲主，宜人參理中湯爲正治。或溫胃飲、聖朮煎、參薑飲之類，亦可酌用。或黃芽丸尤爲最妙。若胃口寒甚者，宜附子理中湯，或四味回陽飲，或一炁丹主之。若虛在陰分，水泛爲痰而嘔吐者，宜金水六君

金匱方：『諸嘔吐穀不得下者，小半夏湯主之。』又云：『嘔家本渴，渴者欲爲解，今反不渴，心下有支飲故也。小半夏湯主之。用半夏一斤，生薑半斤，水七升，煮一升半，分溫再服。』又云『卒嘔吐，心下痞，有水眩悸者，小半夏加茯苓湯主之。卽前方加茯苓四兩也。』則生薑半夏，固通治嘔吐之正劑矣。然東垣辛藥生薑之類治嘔吐，但治上焦氣壅表實之病，若胃虛穀氣不行，胸中閉塞而嘔者，惟宜益胃推揚穀氣而已，勿作表實用辛藥瀉之，故服小半夏湯不愈者，服大半夏湯立愈，此仲景心法也。

仲景云：『病人欲吐者，不可下之。』又用大黃甘草治食已卽吐，何也？曰：『欲吐者，其病在上，因而越之可也，而逆之使下，則必抑塞憒亂而益甚，故禁之。若旣已吐而吐不已，有升無降，則當逆而折之，引令下行，無速於大黃，故不禁也。兵法曰：『避其銳，擊其惰。』此之謂也。丹溪泥之而曰，凡病嘔吐切不可下，固矣夫。

## 景岳全書　臣張介賓著

### ㈠嘔吐論證

嘔吐一證，最當詳辨虛實，實者有邪，去其邪則愈，其虛者無邪，則全由胃氣之虛也。所謂邪者，或暴傷寒涼，或因胃火上衝，或因肝氣內逆，或以痰飲水氣聚於胸中，或以表邪傳裏，聚於少陽陽明之間，皆有嘔證，此皆嘔之實邪也。所謂虛者，或其本無內傷，又無外感，而常爲嘔吐者，此旣無邪，必胃虛也。或遇微寒，或遇微勞，或遇飲食少有不調，或肝氣微逆，卽爲嘔吐者，總胃虛也。凡嘔家虛實，皆以胃氣爲主，使果胃強脾健，則凡遇飲食必皆運化，何至嘔吐？故雖以寒熱饑飽，大有所傷，亦不能動，而玆略有所觸，便不能勝，使非胃氣虛弱，何以若此？此虛實之原，所當先察，庶不致誤治之害。凡胃氣本虛而或停滯不行者，是又虛中有實，不得不暫從清理，然後可以培補。又或雖有停滯，而中氣虛困不支者，是又所急在虛，不得不先顧元氣，而略兼清理。此中本末先後，自有確然之理，貴乎知權也。

一散若冒暑嘔吐而火不甚者宜香薷飲或五物香薷飲俱可，痰飲畱於胷中或寒濕在胃水停中脘而作嘔吐者宜和胃二陳煎苓朮二陳煎或小半夏加茯苓湯橘皮半夏湯之類皆可酌用。

氣逆作嘔者多因鬱怒致動肝氣，胃受肝邪，所以作嘔。然胃強者未必易動，而易動者多因胃虛，故凡致此者，必當顧胃氣，宜六君子湯，或理中湯主之。若逆氣未散或多脹滿者，宜二陳湯，或橘皮半夏湯之類主之。或神香散亦佳。

瘧痢作嘔者在瘧疾則以表邪內陷，凡邪在少陽陽明太陰者，皆能作嘔，表解，嘔必自止。在痢疾之嘔，則多因胃氣虛寒，蓋表非寒邪，無以成瘧，裏非寒邪，無以成痢，病不知本，尙何醫？云二證方論具載本門。

朝食午吐，午食晚吐，或朝食暮吐，詳後反胃門。

方治嘔吐之極，或反胃粥湯入胃卽吐垂死者，人參二兩，水一升，煑四合，熱服，日再進，兼以人參煑粥食之，卽不吐。

## ㊃吐蚘

凡吐蚘者，必因病而吐蚘，非因蚘而致吐也。故不必治其蚘，而但治其所以吐，則蚘自止矣。

有因胃火而吐蚘者，以內熱之甚，蚘無所容而出也。但清其火，火清而蚘自靜。輕者抽薪飲，甚者萬應丸之屬是也。

有因胃寒而吐蚘者，以內寒之甚，蚘不能存而出也。但溫其胃，胃煖而蚘自安。仲景烏梅丸之屬是也。

有因胃虛無食而吐蚘者，以倉廩空虛，蚘因求食而上出者。此胃氣大虛之候，速宜補胃溫中，以防根本之敗。如溫胃飲，理中湯，聖朮煎之屬是也。

以上三者，固皆治蚘之法。然蚘有死者，有活者。若吐死蚘，則但治嘔如前可也。若活蚘上出不已，則不得不有以逐之。蓋蚘性畏酸苦，但加烏梅爲佐使，則蚘自伏也。若胃實火盛者，可加苦楝根，或黃連亦善。其有未盡者，俱詳列諸蟲本門及後條吐蚘治按之中。

煎。虛甚者宜理陰煎，或六味回陽飲。若久病胃虛不能納穀者，但當以前法酌治之。若胃氣微虛而兼痰者，宜六君子湯主之。凡中毒而吐者，當察其所中者何物，蓋中熱毒而吐者，宜解以寒苦之劑，中陰寒之毒而吐瀉不止者，宜解以溫熱之劑，若因吐瀉而脾胃致虛者，非大加溫補不可。此證有中寒毒吐瀉，治按在後，當幷閱之。

㊂實證

凡實邪在胃而作嘔者，必有所因，必有見證。若因寒滯者，必多疼痛，因食滯者，必多脹滿，因氣逆者，必痛脹連於脅肋，因火鬱者，必煩熱燥渴，脈洪而滑，因外感者，必頭身發熱，脈數而緊。如無實證實脈而見嘔吐者，切不可以實邪論治。

寒邪犯胃而作嘔者，其證有三：一以食飲寒涼或誤食性寒生冷等物，致傷胃氣因而作嘔，若果寒滯未散而兼脹兼痛者，宜溫中行滯，以大小和中飲，神香散，或二陳湯加薑桂之類主之。或和胃飲，亦佳。

一以陰寒氣令，或雨水沙氣，及水土寒濕之邪犯胃，因而作嘔作泄，若寒滯未散而或脹或痛者，宜溫中散寒，以平胃散，神香散，加減二陳湯，除濕湯，局方四七湯，大七香丸之類主之。

一以風寒外感，或傷寒或痎瘧，凡邪在少陽，表邪未解而漸入裏，所以外爲寒熱，內作嘔吐。蓋少陽之經，下胷中貫膈而然，此半表半裏證也，治宜解表散寒，以柴陳煎，小柴胡湯，正柴胡飲之類主之。若微嘔微吐者，邪在少陽，若大嘔大吐者，此又邪在陽明，胃家病也，宜二陳湯，或不換金正氣散，藿香正氣散之類主之。若胃虛兼寒者，惟理中湯溫胃飲之類爲宜。

飲食傷胃而作嘔者，如果畱滯未消，而兼脹痛等證，宜大和中飲，排氣飲，神香散之類主之。或啓脾丸亦可酌用，如食已消而嘔未止者，宜溫胃飲主之。

火在中焦而作嘔者，必有火證火脈，或爲熱渴，或爲煩躁，脈必洪數，吐必湧猛，形氣聲色，必皆壯麗，若察其眞有火

利，腹痛嘔吐惡心者，溫胃飲，或理中湯，聖朮煎。若脾腎虛寒，上下不能運行，或脹滿，或嘔吐，或傷寒，陰證寒邪，深入三陰，而惡心嘔吐不止者，理陰煎，或溫胃飲。

實邪惡心，以一時邪滯犯胃，得吐則滯去，滯去則惡心自解，若有餘邪，如法治之。若惡心多痰，及風寒欬嗽，或傷生冷，或飲酒過多，脾胃不和者，二陳湯，或橘皮半夏湯。若脾胃多滯，或寒濕傷脾，惡心者，平胃散。若胃寒多滯，或傷生冷，或寒痰不清，吞酸脹滿惡心者，和胃飲，或和胃二陳煎。若受穢濁寒邪，脹滿腹痛惡心者，調氣平胃散。若感冒暑熱，火盛煩躁惡心者，仲景竹葉石膏湯。若中藥毒，或諸毒而惡心者，速宜於諸毒門求法治之。

## ㈦吐酸吞酸辨證

吐酸一證，在河間言其為熱，在東垣言其為寒，夫理有一定，奚容謬異若此？豈理因二子，可以易乎？必二子於理有一悖者，此余之不能無言，以東垣為是，而以河間為非也。何以見之？蓋河間之說，實本內經。經曰：『諸嘔吐酸，暴注下迫，皆屬於熱。』故河間病機，悉訓為火，而甚以主寒者為非，不知內經此論，乃以運氣所屬，概言病應，非以嘔吐注泄，皆為內熱病也。如果言熱，則何以又曰：『寒氣客於腸胃，厥逆上出，故痛而嘔也？』又曰：『太陽之復，心胃生寒，胸中不和，唾出清水，及為噦噫。』此言嘔吐之有寒也，豈皆熱耶？又曰：『太陽之勝，寒入下焦，傳為濡泄。』此言泄瀉之有寒也，豈亦熱耶？由此觀之，則其此處言熱，而彼復言寒，豈非自相矛盾？能無謬乎？不知內經之理，圓通詳悉，無不周備，故有此言其常，而彼言其變者，有此言其順，而彼言其逆者，有此篇未盡，而足之他論者，有總言所屬而詳言所病者，此內經之元奧，所以不易窮也。故凡善觀此者，務宜悟其源流，察其分合，其博也，必燭其為千為萬，其約也，必貫其總歸一理，夫如是，斯足稱明眼人矣。倘不能會其巔末，而但知管測一斑，又烏足以盡其妙哉？矧復有不明宗旨，悖理妄談，謬借經文，證已偏見者，尚難枚舉，無暇辨也。茲因二子之論，故并及之，而再悉於左，觀者其加政焉！

㊄治嘔氣味論

凡治胃虛嘔吐，最須詳審氣味。蓋邪實胃強者，能勝毒藥，故無論氣味優劣，皆可容受。惟胃虛氣弱者，則有宜否之辨，而胃虛之甚者，則於氣味之間，關係尤重。蓋氣虛者，最畏不堪之氣，此不但腥臊耗散之氣不能受，卽微香微郁，幷飲食之氣，亦不能受，其他可知矣。胃弱者最畏不堪之味，此非惟至苦極劣之味不能受、卽微鹹微苦，幷五穀正味，亦不能受，而其他可知矣。此胃虛之嘔，所以最重氣味，使或略有不投，則入口便吐，終無益也。故凡治陽虛嘔吐等證，則一切香散鹹酸辛味不堪等物，悉當以己意相測，一有不妥，切不可用，但補其陽，陽回則嘔必自止，此最確之法，不可忽也。余嘗見一沈姓者，素業醫，極多勞碌，且年及四旬，因患癪疝下墜，欲提使上升，自用鹽湯吐法，不知胃虛畏鹹，遂致吐不能止，湯水皆嘔，如此者一日一夜，忽又大便下黑血一二碗，而脈則微渺如毛，幾如將絕，此蓋吐傷胃氣，脾虛之極，兼以鹽湯走血，故血不能攝，從便而下。余令速用人參薑附等劑，以回垂絕之陽，庶乎可療。忽又一醫至，曰：『諸逆衝上，皆屬火也。大便下血，亦因火也。尙堪用參附乎？宜速飲童便，則嘔可愈而血亦止矣。』其人以爲有理，及童便下咽，卽嘔極不堪名狀，嘔不止而命隨繼之矣。嗚呼！夫以胃強之人，亦且聞尿欲嘔，況嘔不能止而復可加以尿乎？此不惟死者堪憐，而妄用若此者，尙敢稱醫，誠可惡可恨也！故筆之於此，幷以徵氣味之要。

㊅惡心證治

惡心證，胃口泛逆，兀兀不甯之病，凡惡心欲吐，口必流涎，嚥之不下，愈嚥愈惡，而嘔吐繼之。亦有不嘔吐而時見惡心者，然此雖曰惡心，而實胃口之病，非心病也。此證之因，則有寒有食，有痰飲，有穢氣，有火邪，有陰濕傷胃，或傷寒瘧痢諸邪之在胃口者，皆得有之。若欲察之，但當察其虛實寒熱，則盡之矣。然實邪惡心者，邪去則止，其來速，其去亦速。虛邪惡心者，必得胃氣大復，其病方愈。且此證惟虛寒者十居八九，卽有實邪嘔惡者，亦必其脾氣不健，不能運化而然，此所以凡治惡心者，必當知其實中有虛，勿得妄行攻擊，而胃氣不可不顧也。

將退也，寒肅之漸，必始於上，以陽氣之日降也。其云金旺者，非云肺氣之充實，正言寒氣之有餘也。其云子令母實者，以寒在上焦，則收氣愈甚，故治用鹹熱等劑，以瀉其子，亦無非扶陽抑陰之道，最切當也。丹溪未達其意，而反以非之，抑又何也？即如丁香氣味辛爽，無毒，凡中焦寒滯，氣有不順者，最其所宜，又何至以犯字相戒，而使後人畏之如虎耶？蓋丹溪但知丁香不可犯，而不知黃連黃芩，又豈吞酸證所宜輕犯者哉？然說雖如此，而說有未盡，則云寒云熱，猶不無疑，謹再竟其說焉。

吐酸證，諸言爲熱者，豈不各有其說？在劉河間則曰，如飲食熱則易酸矣，在戴原禮則曰，如穀肉在器，濕熱則易爲酸也。又有相傳者曰，觀之造酒者，涼作則甘，過熱則酸，豈非酸由熱乎？諸說如此，宛然可信，而欲人不從，不可得也。凡諸似是而非者，正以此類。譬之射者，但能不離於前後左右，便云高手，不知犯此四字，尙足以言射乎？而諸家之說，亦猶是耳。何以見之？蓋察病者當察以理，察理者當察以眞，即如飲食之酸由乎熱，似近理矣，然食在釜中，使能化而不酸者，此以火力強而速化無留也。若起置器中，必久而後酸，此停積而酸，非因熱而酸也。嘗見水漿冷積既久，未有不酸者，此言熱也，因不行也。又云造酒者，熱作則酸，亦似近理，然必於二三日之後，鬱熱不開，然後成酸，未有熱作，及時而遂致酸者。且人之胃氣，原自大熱，所以三餐入胃，俱能頃刻消化，此方是眞陽火候之應，若如造酒者，必待竟日而後成，則日不再餐，胃氣能無憊乎？若必如冷作之不酸，方云無火，則飲食之化，亦須旬日，此其胃中陽氣，不已竭乎？是可見胃氣本宜煖，稍涼不可也。酒甕本宜疏，鬱悶不可也。故酒甕之化，亦安能如胃氣之速，而胃氣之健，又安可同酒甕之遲乎？此其性理相懸，奚啻十倍，有不待辨也明矣。且人之餘食在胃，以速化爲貴，若胃中陽氣不衰，而健運如常，何酸之有？使火力不到，則其化必遲，食化既遲，則停積不行，而爲酸爲腐，此酸即敗之漸也。故凡病吞酸者，多見飲食不快，自食有不快，必漸至中滿痞隔泄瀉等證，豈非脾氣不強，胃脘陽虛之病，而猶認爲火，能無誤乎？余向在燕都，嘗有一縉紳患此而求治者，余告以寒，彼執爲熱，堅持造酒之說，以相問難，莫能與辨，竟

辨河間吐酸之論爲非。據河間曰：『酸者，肝木之味也，由火盛制金，不能平木，則肝木自甚，故爲酸也。如飲食熱則易於酸矣。或言吐酸爲寒者誤也。所以妄言爲寒者，但謂多傷生硬粘滑，或傷冷物而爲噫酸吞酸，故俗醫主於溫和脾胃，豈知經言人之傷於寒也，則爲病熱，故凡內傷冷物者，或即陰勝陽而爲病寒者，或寒熱相擊而致腸胃陽氣怫鬱而爲熱者，亦有內傷生冷而反病熱得大汗熱泄身涼而愈也。若久喜酸而不已，則不宜溫之，宜以寒藥下之，後以涼藥調之，結散熱去則氣和也。』凡此皆河間之說，余每見之，未嘗不反復切嘆，觀其所言病機，則由火及金，由金及木，由木及脾，所以爲酸，若發微談理，果可轉折，如此則指鹿爲馬，何患無辭？惟其執以爲熱，故不得不委曲若此。若余言其爲寒則不然也。夫酸本肝木之味，何不曰火衰不能生土，則脾氣虛而肝邪侮之，故爲酸也，豈不於理更爲明切？而何以曲折強解有若是乎？又若內經所言人之傷於寒也則爲病熱，此言傷寒證寒邪在表，則爲三陽之發熱，及其傳裏，則爲陽明之內熱，豈以內傷冷物而亦云病熱者耶？又豈有內傷冷物而可以汗解者耶？即以氣血強盛之人，偶傷生冷，久留不去，而鬱爲熱者，此以鬱久化熱，或亦有之，豈果因生冷而反熱耶？矧內經本以外感言，而河間引以證內傷，謬亦甚矣。此不惟大害軒岐之旨，而致後人執以藉口，其害又將何如也？

辨東垣吐酸之論爲是。據發明曰：『內經言諸嘔吐酸，皆屬於熱，此上焦受外來客邪也。胃氣不受外邪，故嘔，仲景以生薑半夏治之，以雜病論之，嘔吐酸水者，甚則酸水浸其心，其次則吐出酸水，令上下牙酸澀不能相對，以大辛熱藥療之必減也。酸味者收氣也，西方肺金旺也，寒水乃金之子，子能令母實，故用大鹹熱之劑瀉其子，以辛熱爲之佐，而瀉肺之實，病機作熱攻之誤矣。蓋雜病醋心，濁氣不降，欲爲中滿，寒藥豈能治之乎？』此東垣之說也。余謂其最爲得理，但其立言太諱，如所云收氣及西方金旺水爲金子等義，人有未達，每多忽之，即在丹溪亦曰：『東垣不言外得風寒而作收氣立說，欲瀉肺金之實，又謂寒藥不可治酸，而用安胃湯加減二陳湯，俱犯丁香，且無治濕熱鬱積之法，爲未合經意也。』因考丹溪治法，則用茱連丸二陳湯，且曰：宜用炒吳茱萸，順其性而折之，乃反佐之

丹溪曰「治酸必用吳茱萸順其性而折之乃反佐之法也。」不知此實正治非順性也蓋其性熱最能燥中下二
惟其味辛苦最能勝酸澀之味，謂之反佐，見之過矣。

上泛者或用此法未必即傷胃氣而亦可墜引下行即權宜用亦無不可然終非治本之道也若氣體略有虛弱及內傷年衰之輩，而患吐酸者，必不可妄用芩連，再殘陽氣，雖暫得苦降之力而胃氣愈傷，則病必日甚而無可爲矣。

嘔吐清水古法以二朮二陳湯，或六君子湯，本皆正治之法，然余嘗治水泛爲飲者，覺自臍下上衝，而吐水不竭，以理陰煎治之，其妙如神。故此三方，皆宜酌用。

凡肌表暴受風寒，則多有爲呑酸者，此其由息而入，則臟氣通於鼻，由經而入，則臟愈係於背，故凡寒氣一入，則胃中陽和之氣被抑不舒，所以滯濁隨見而即刻見酸，此明係寒邪犯胃也。今以訛相傳者，皆云肌表得風寒，則內熱愈鬱而酸味刺心，何其謬也？夫因鬱成熱者，必以漸久而成，或一日或二日然後鬱而爲熱也。今凡受寒呑酸者，無不隨寒而酸見在即刻，豈即刻便成鬱熱耶？惟其非熱，所以却之之法亦惟肌表宜溫，煖藥劑宜香燥，此自寒者熱之之正治，而說者必欲執言爲熱，故爾強解，所謂道在邇而求諸遠，凡屬謬妄者，何非此類？

# 石室祕籙 臣陳士鐸著

## ㊀嘔吐治法

吐嘔之證，人以爲胃虛，誰知由於腎虛。無論食入即出，是腎之衰，凡有吐證，無非腎虛之故，故治吐不治腎，未窺見病之根也。方用人參三錢，白朮薏仁芡實各五錢，砂仁三粒，吳茱萸五分，水煎服。此方似乎治脾胃之藥，不知皆治腎之法，方中除人參救胃之外，其餘藥品，俱入腎經，而不止留在脾也。腎火生脾，脾土始能生胃，胃氣一轉，吐嘔始平，此治胃而用治腎之藥，人知之乎？

更有大吐之證，舌如芒刺，雙目紅腫，人以爲熱也，不知此乃腎水乾槁，火不能藏，水不能潤，食入即出耳。法當用六味地黃湯一料煎服，恣其呑飲，則餘火下息，而飲食可入。蓋胃爲腎之關，胃中之火，必得腎中之水以潤之，腎水耗

爲芩連之屬所斃，而終不能悟，豈非前說之誤之也耶？亦可哀矣！余故曰：「人之察理，貴察其眞，若見理不眞，而疑似固執，以致釀成大害者，無非此類。」此似是而非之談，所以不可不辨也。

呑酸之與吐酸證有三種：凡喉間噯噫，即有酸水如酢浸心，嘈雜不堪者，是名呑酸，即俗所謂作酸也。此病在上脘最高之處，不時見酸而泛泛不甯者是也。其次則非如呑酸之近，不在上脘而在中焦胃脘之間，時多嘔惡，所吐皆酸，即名吐酸，而渥渥不行者是也。又其次者，則本無呑酸吐酸等證，惟或偶因嘔吐所出，或酸或苦，及諸不堪之味，此皆腸胃中痰飲積聚所化，氣味每有濁惡如此，此又在中脘之下者也。但其順而下行，則人所不覺，逆而上出，則喉口難堪耳。凡此三者，其在上中二脘者，則無非脾胃虛寒，不能運化之病，治此者，非溫不可；其在下脘偶出者，則寒熱俱有，但當因證以治其嘔吐，嘔吐止則酸苦無從見矣。雖然，此亦余之論證，故不得不曲進其說。若以實理言之，則凡胃強者，何暇計及於酸苦？其有酸苦者，必其停積不行而然，此宜隨證審察，若無熱證熱脈可據，而執言濕中生熱，無分強弱，惟用寒涼，則未有不悞者矣。

㈧論治

治呑酸吐酸，當辨虛實之微甚，年力之盛衰，實者可治其標，虛者必治其本。

凡胃氣未衰，年質壯盛，或寒或食，偶有所積而爲酸者，宜用行滯溫平之劑，以二陳湯、平胃散、和胃飲之類主之。中氣微寒者，宜加減二陳湯，或橘皮湯，甚者宜溫胃飲。氣微虛者，宜藿香安胃散，此皆治標之法也。

脾胃氣虛，及中年漸弱，而飲食減少，時見呑酸吐酸者，惟宜溫補脾胃，以理中湯、溫胃飲、聖朮煎之類主之，切不可用清涼消耗等藥。若虛在陰分，下焦不煖，而水邪上泛爲酸者，宜用理陰煎最妙。

丹溪曰：「治酸必用吳茱萸，順其性而折之，乃反佐之法也。」不知此實正治，非順性也。蓋其性熱，最能煖中下二焦，其味辛苦，最能務發罶之味，謂之反佐，見之過矣。

降火，寒吐宜祛寒而不可降寒。蓋降火則火引入脾而流入於大腸，必變爲便血之證，降寒則寒引入腎而流入於膀胱，必變爲遺溺之證矣。我今酌定二方，一治火吐，名清火止吐湯，茯苓一兩人參二錢，砂仁三粒黃連三錢水煎服。此方解火退熱，則嘔吐自止，妙在茯苓分消火勢，引火緩行於下而非峻祛於下也。尤妙人參以扶胃氣，則胃土自能剋水，不必止吐，吐自定也。況又有砂仁之止嘔乎？所以一劑而吐止耳。一治寒吐，名散寒止嘔湯，白朮二兩人參五錢，附子乾薑各一錢，丁香三分，水煎服，此方散寒而仍用補脾健土之藥，則寒不能上越，而亦不敢下行，勢不得不從臍中而外遁也。一劑亦即奏功如響。

胃吐由於脾虛，脾氣不下行，自必上反而吐，補其脾氣，則胃氣自安。用人參茯苓各三錢，白朮五錢，甘草肉桂神麴半夏各一錢，砂仁三粒，水煎服。此方乃治脾之藥居多，何以用之於胃吐之病反宜也？蓋胃爲脾之關，關門之沸騰，由於關中之潰亂，然則欲關外安靜，必先關內敉甯，方中全用補脾之藥，則脾氣得全，又何患胃口之吐哉？況方中又有砂仁半夏神麴等類，全是止吐之品，有不奏功如神者乎？此又脾胃雙治之妙法也。

(二)吞酸吐酸治法

吞酸，火也，泄瀉，寒也，似乎寒熱殊而治法宜變；不知吞酸雖熱，由於肝氣之鬱結，泄瀉雖寒，由於肝木之剋脾，然必一方以治木鬱，又一方以培脾土，則土必大崩而木亦大彫矣，不若於一方之中而兩治之。方用柴胡車前子各一錢，陳皮甘草神麴各五分，白芍藥五錢，茯苓三錢，水煎服，二證皆愈。此方之絕奇，在白芍之妙，蓋白芍乃肝經之藥，最善舒木氣之鬱，木鬱一舒，上不剋胃，下不剋脾，方中又有車前茯苓，以分消水濕之氣，水盡從小便出，何有餘水以吞酸，剩汁以泄瀉？況又有半夏神麴之消痰化粕哉？此一治而有分治之功，世人未盡知也。

肝經之病，兩脅脹滿，吞酸吐酸等證，乃肝木之鬱也。正治之法，方用白芍五錢，柴胡二錢，炒梔子茯苓蒼朮半夏甘草各一錢，神麴五分，丹皮三錢，水煎服。此方之妙，妙在用白芍丹皮柴胡也。蓋三味乃肝木專經之藥，而芍藥尤善

不能上潤脾胃，則胃火沸騰，湧而上出，以致雙目紅腫，舌如芒刺也。但此證時躁時靜，一時而欲飲水，及至水到又不欲飲，即強飲之，又不十分寬快，此乃上假熱而下眞寒也，理宜六味湯內加附子肉桂，煎冷與飲，始合病源，而今止用六味地黃湯者何？蓋腎雖寒，而胃正熱，溫腎之藥，必經過胃經，熱性發作，腎不及救，而胃反助其邪火之焰，則病熱轉添，不若竟用六味地黃湯，使其直趨腎宮，雖經過胃中，不致相犯，假道滅虢，不平胃而胃自平矣，此亦逆治之法也。

大吐之人，治之不可緩也。法當用人參五錢，茯苓白朮各三錢，甘草三分，陳皮一錢，豆蔻仁三粒，水煎服。此方純用健胃補脾之劑，而人不知其中奧妙也。大吐之後，津液已乾，如何又用健脾補胃以重燥之，得毋傷之太甚耶？不知脾胃之氣健，而後津液能生，苟以潤藥補之，則脾胃惡濕，反足傷其眞氣，所以不用潤劑而反用燥藥也。他臟腑惡燥，惟脾胃臟腑反惡濕而喜燥，以人參白朮投之，正投其所好，又安有燥烈之虞哉？

大吐有寒邪直入腎宮，將脾胃之水，挾之盡出，手足厥逆，少腹痛不可忍，以火熱之物熨之，少快，否則寒冷欲死。方用附子一箇，白朮四兩，肉桂一錢，乾薑三錢，人參三兩，救之。下喉便覺吐定，再進，則安然如故。蓋腎水養人，何能殺心以殺人？惟陰寒邪氣，直入腎宮，則腎火逃避，而諸邪挾衆逆犯，心君不甯矣。所以必用附子肉桂乾薑一派辛辣大熱之物，而又必多用人參以定變，使諸藥遍列分布，無非春溫之氣，自然寒邪散而吐止，此方之所以霸而奇也。

大吐之證，明是虛寒，亦有用參至數兩者。然而吐不可一類同觀，其勢不急，不妨少用，可以徐加，倘寒未深而吐不甚，亦以參數兩加之，恐增飽滿之證矣。

大吐之證，虛寒居多，然亦有熱而吐者，不可不講。熱吐者，必隨痰而出，不若寒吐之純是清水也。熱吐不可用參，以二陳湯飲之得宜。若寒吐必須加人參兩許，而雜以辛熱之品，始能止嘔而定吐。第人參可以暫用，而不可日日服之。[illegible]，[illegible]、參，[illegible]可，苟日日服之，必至陽旺陰衰，而陰不足，胃中乾燥，恐成關格之證矣。所以人參可[illegible]

# 醫部彙考二百五十

## 嘔吐門三

### 方一

㈠碧霞丹集驗方　治吐逆不止。

北黃丹四兩，用米醋半斤煎乾。　右以炭火三秤，就銚內煆紅，令定爲末，粟米飯丸梧子大，每服七丸，醋湯下。

㈡陰陽丸鄭氏小兒方　治諸般吐逆。

硫黃半兩，　水銀一錢研墨。　右薑汁糊丸小豆大，三歲三丸，冷水下。大人三四十丸。

㈢赤石脂散千金翼方　治痰飲吐水無時節者，其原因冷飲過度，遂令脾胃氣弱，不能消化飲食，飲食入胃皆變成冷水，反吐不停。

赤石脂一斤。　右擣篩服方寸匕，酒飲，自任稍加至三匕。服盡一斤，則終身不吐痰水，又不下利，補五臟令人肥健。有人痰飲，服諸藥不效，用此遂愈。

㈣又方拔萃方　治胃寒嘔惡，不能腐熟水穀，食即嘔吐。

人參，　丁香，　藿香，各二錢半。　橘皮五錢，　生薑三斤。　右水二盞，煎一盞溫服。

平肝，不去遠凌脾土，土得養而木益舒，木舒而氣爽，痛自除，吐漸止也。

佳。一方不用甘草。

㊂又方　治腹脹善噫食則欲嘔泄澼溏下口乾四肢重好怒不欲聞人聲忘誤喉痹。

黃連一兩，禹餘糧二兩，白朮，乾薑各三兩。大麻子五兩，桑白皮八兩，大棗二十枚。右七味㕮咀，以水一斗二升，煑取三升分四服。

㊃半夏湯　一名小茯苓湯，治逆氣，心中煩悶，氣滿嘔吐，氣上。

半夏一升，生薑一斤，茯苓，桂心各五兩。右四味㕮咀，以水八升，煑取二升半，分三服。若少氣加甘草二兩。

㊄前胡湯　治寒熱嘔逆少氣，心下堅聚彭亨滿不得食，寒熱消渴，補不足。

前胡，生薑各三兩。甘草，朴硝，大黃別漬各二兩。芍藥，茯苓，麥門冬，當歸，半夏，滑石，石膏，苦蔞根，黃芩，附子，人參。右十六味㕮咀，以水一斗二升，煑取六升，分四服。

㊅又方　治嘔吐四肢痹冷短氣腹熱三焦不調。

前胡，芎藭，甘草，當歸，石膏，人參，桂心，橘皮各二兩。芍藥三兩，半夏四兩，生薑五兩，大棗三十枚。右十二味㕮咀，以水一斗二升，下黃芩三兩合煑取三升，分三服。一方不用黃芩。

㊆小麥湯　治嘔吐不止。

小麥一升，人參，厚朴各四兩。甘草一兩，青竹茹二兩半，生薑汁三合，茯苓三兩。右七味㕮咀，以水八升，煑取三升，去滓，分三服。

㊇猪苓散　治嘔而膈上寒。

猪苓，茯苓，白朮各三兩。右三味，治下篩以飲，服方寸匕，日三。渴者多飲水。

㊈犀角人參飲子　治嘔逆胃氣虛邪風熱不下食並皆治之。

犀角，人參各二兩。薤白五兩，粟米一合。右四味㕮咀，以水四升半，煑取一升七合，下米煑令米熟，分四服，

㊄人參半夏湯仲景下同　治食入卽吐。

人參一兩，　半夏一兩五錢，　生薑半斤。　右水一斗，以杓揚二百四十遍，取三升，入白蜜三合，煑一升半，分服。

㊅小半夏湯　一名生薑半夏湯，治支飲作嘔似喘不喘，似嘔不嘔，似噦不噦，心下憒憒無奈者。

半夏泡七次一升，　生薑半斤。　右水七升，煑一升五合，分服。

㊆吳茱萸湯　治嘔涎頭痛。

吳茱萸一升，　大棗二十枚，　生薑，人參各一兩。　右以水五升，煎取三升，每服七合，日三服。

㊇淸膈散衞生家寶方　治胃熱吐食。

蟬蛻五十個去泥，　滑石一兩。　右爲末，每服二錢，水一盞，入蜜調服。

㊈半夏加茯苓湯仲景　治嘔噦眩悸，穀不得下。

半夏一升，　生薑半斤，　茯苓三兩。　右切，以水七升，煎一升半，分温服之。

㊉葱白湯千金方下同　治冷熱膈液發時頭痛悶亂，欲吐不得者。

葱白二七莖，　桃葉一把，　眞珠另研　恆山，　烏頭，　甘草各半兩。　右六味㕮咀，以水酒各四升，和煑取三升，去滓，內珠末，每服一升，吐卽止。桃葉一作枇杷葉。

⑪椒薑湯　治胷中積聚痰飲，飮食減少，胃氣不足，欬逆嘔吐。

蜀椒三合，　桂心，　附子，　甘草各一兩。　橘皮，　桔梗，　茯苓各二兩，　半夏三兩，　薑汁七合。　右九味㕮咀，以水九升，煑取二升半，去滓，內薑汁，煑取二升，分三服，服三劑佳。若欲服大散諸五石丸，必先服此湯，及進黃芪丸佳。一方不用甘草。

⑫[illegible]湯　一名高市湯，治心熱實，欲吐不出，煩悶，喘急，頭痛。

近火，宜冷飲食。

㉘半夏湯　治肺勞虛寒，心腹冷，氣逆，遊氣胷脅，氣滿從胷達背痛，噯氣往來，嘔逆，飲食即吐，虛乏不足。

半夏一升，生薑一斤，桂心四兩，甘草，厚朴各二兩。人參，橘皮，麥冬各三兩。右八味，吹咀，以水一斗，煑取四升，分四服。腹痛加當歸二兩。

㉙建中湯　治五勞七傷，小腹急痛，膀胱虛滿，手足逆冷，食飲苦吐酸，痰吐泄，少氣，目眩，耳聾，口焦，小便自利。

膠飴半斤，黃芪，乾薑，當歸各三兩。人參，半夏，橘皮，芍藥，甘草各二兩。附子一兩，大棗十五枚。右十一味吹咀，以水一斗，煑取三升半，湯成下膠飴烊沸，分四服。深師有桂心六兩，生薑一斤，無橘皮乾薑。

㉚厚朴湯　治上焦閉塞乾嘔，嘔而不出，熱少冷多，好吐白沫清涎吞酸。

厚朴，茯苓，芎藭，白朮，元參各四兩。桔梗，附子，人參，橘皮各三兩。生薑八兩，吳茱萸八合。右十一味吹咀，以水二斗，煑取五升，分為五服。

㉛止嘔人參湯　治下焦熱，氣逆不續，嘔吐不禁，名曰走哺。

人參，葳蕤，黃芩，知母，茯苓各三兩。生蘆根，梔子仁，白朮炒，橘皮各四兩。石膏八兩。右十味吹咀，以水九升，煑取三升，去滓，分三服。

㉜茱萸湯仲景下同　治嘔而胷滿者。

吳萸一升，人參三兩，生薑六兩，大棗十二枚。右四味，以水五升，煑取三升，溫服七合，日三服。

㉝四逆湯　治嘔而脈弱，小便復利，身有微熱見厥者難治。

去相七里久進一服。

⑳又方　治春夏時行傷寒，寒傷於胃，胃冷變啘。

橘皮，桂心，葛根各二兩。白茅根一升。右四味㕮咀，以水六升，煮取三升，分三服，服盡更合。有熱去桂心。

㉑又方　治嘔噦。

人參一兩，胡麻仁八合，橘皮去白，一兩。枇杷葉八兩，右四味㕮咀，以水一斗，煮枇杷葉，取五升，下藥煮取三升，內麻仁稍飲之。

㉒又方　治氣厥嘔噦不得息。

豉一升，半夏八兩，生薑二兩，人參，前胡，桂心，甘草，各一兩。右七味㕮咀，以水九升，煮取三升，分三服。

㉓又方　治前證。

大棗十五枚，附子一枚，橘皮二兩，豉一升，生薑，甘草，各一兩。右六味㕮咀，以水九升，煎取二升，分三服，日三。

㉔橘皮湯　治乾嘔噦，若手足厥逆者。

橘皮四兩，生薑半斤。右二味㕮咀，以水七升，煮取三升，分三服，不止，更合服之。

㉕又方　治傷寒後，噦乾嘔不下食。

生蘆根，青竹茹，各一升。粳米三合，生薑二兩。右四味㕮咀，以水五升，煮取二升，分三服，不止，服三劑。

㉖又方　治前證。

通草，橘皮，各二兩。粳米三合，生蘆根一升。右四味㕮咀，以水四升，煮取一升半，分三服。

㊵大半夏湯　治胃反嘔吐者。

半夏二升洗，　人參三兩，　白蜜一升。　右三味，以水一斗二升，和蜜揚之二百四十遍，煑藥取二升半，溫服一升餘分再服。

㊶大黃甘草湯　治食已即吐者。

大黃四兩，　甘草一兩。　右二味，以水三升，煑取一升，分溫再服。

㊷茯苓澤瀉湯　治胃反吐而渴欲飲水者。

茯苓半斤，　白朮三兩，　澤瀉，　生薑各四兩。　甘草，　桂枝各二兩。　右六味，以水一斗，煑取三升，內澤瀉再煑取二升半，溫服八合，日三服。

㊸半夏乾薑散　治乾嘔吐逆，吐涎沫。

半夏，　乾薑，各等分。　右二味，杵爲散，取方寸匕，漿水一升半，煎取七合，頓服之。

㊹橘皮竹茹湯　治噦逆者。

橘皮二斤，　生薑半斤，　竹茹二升，　甘草五兩，　大棗三十枚，　人參一兩。　右六味，以水一斗，煑取三升，溫服一升，日三服。

㊺甘草粉蜜湯，　治吐蚘。

甘草二兩，　粉一兩，　蜜四兩。　右三味，以水三升，先煑甘草取二升，去滓，內粉蜜，攪令和，煎如薄粥，溫服一升，差即止。

㊻烏梅圓　治蚘厥吐蚘。

烏梅三百個，　細辛，　附子炮，　桂枝，　人參，　黃蘗，各六兩。　乾薑十兩，　黃連一斤，　當歸，　川椒去汗，各四

附子一枚生用，乾薑一兩五錢，甘草一兩炙。右三味，以水三升，煮取一升二合，去滓，分溫再服。強人可大附子一枚，乾薑三兩。

㉔附子粳米湯　治腹中寒氣雷鳴，切痛，胷脅逆滿，嘔吐。

附子一枚炮，半夏，粳米各半升。甘草一兩，大棗十枚。右五味，以水八升，煮米熟，湯成去滓，溫服一升，日三服。

㉕五苓散　治瘦人臍下有悸，吐涎沫而癲眩。

澤瀉，一兩一分，猪苓，茯苓，白朮各三分。桂二分去皮。右五味爲末，白飲，服方寸匕，日三服。多飲煖水，汗出愈。

㉖桂苓五味甘草去桂加乾薑細辛半夏湯。治支飲冒而嘔者。

茯苓四兩，甘草，細辛，乾薑，各二兩。五味，半夏各半升。右六味以水八升，煮取三升，去滓，溫服半升，日三。

㉗半夏瀉心湯　治嘔而腸鳴，心下痞者。

半夏半升洗，黃連一兩，黃芩，乾薑，人參，甘草炙，各三兩。大棗十二枚。右七味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煮取三升，溫服一升，日三服。

㉘黃芩加半夏生薑湯　治乾嘔而利者。

黃芩，生薑，各三兩。甘草二兩炙，芍藥一兩，半夏半升，大棗十二枚。右六味，以水一斗，煮取三升，去滓，溫服一升，日再，夜一服。

㉙小柴胡湯　治嘔而發熱者。

兩。　右爲細末，生薑汁麪糊爲丸，如梧桐子大，每服三十丸，溫水送下，食後。

(五二)上二黃丸　治傷熱食痞悶，兀兀欲吐，煩亂不安。

黃芩二兩，　黃連酒浸一兩，　甘草二錢，　升麻，　柴胡各三錢。　右爲極細末，湯浸蒸餅，爲丸如菉豆大，每服五七十丸，白湯送下，量所傷服之。一方加枳實麩炒去穰五錢。

(五三)丁香半夏丸濟生方下同　治宿寒在胃，嘔吐吞酸。

丁香不見火一兩，　乾薑炮，　半夏湯泡七次，　橘紅各二兩，　白朮一兩半。　右爲細末，生薑自然汁打糊，爲丸如梧桐子大，每服五十丸，淡薑湯送下，食前。

(五四)大藿香散　治憂愁思慮悲恐驚七情傷感，氣鬱於中，變成嘔吐，或作寒熱眩運，痞滿，不進飲食。

藿香葉，　半夏麴，　白朮，　木香不見火，各一兩。　白茯苓，　人參，　桔梗剉炒，　枇杷葉拭去毛，　官桂不見火，甘草炙，各半兩。　右爲細末，每服三錢，水一大盞，生薑五片，棗子一枚，煎至七分，去滓溫服，不拘時候。

(五五)旋覆花湯　治中脘伏痰，吐逆眩運。

旋覆花去梗，　半夏湯泡七次，　陳皮去白，　乾薑炮各一兩。　甘草炙，　檳榔，　白朮土炒，　人參各半兩。　右㕮咀，每服四錢，水一盞半，生薑七片，煎至七分，去滓溫服，不拘時候。

(五六)竹茹湯　治胃受邪熱，心煩喜冷，嘔吐不止。

葛根三兩，　半夏湯泡七次二兩，　甘草炙一兩。　右㕮咀，每服五錢，水二盞，入竹茹棗許，大薑五片，煎至七分，去滓，取清汁，微冷，細細服，不拘時候。

(五七)玉浮丸　治男子婦人脾胃虛弱，一切嘔吐，及久新翻胃，不問得病之由，皆可服之，眞良方也。

人參，　白殭蠶炒去絲，　白朮，　乾薑炮，　丁香，　肉豆蔻麪裹煨，　橘紅，　白豆蔻仁，　麥蘖炒，　附子炮去皮

兩。右十味，異擣篩合治之，以苦酒漬烏梅一宿，去核蒸之五升米作飯，熟擣成泥，和藥令相得，內臼中，與蜜杵二千下，丸如梧子大，先食飲服十丸，日三服，稍加至二十丸，禁生冷滑臭等物。

㊼養胃丹中藏經　治脾胃不和，全不思食，中脘停寒，嘔逆惡心，臟寒泄利，腹痛腸鳴，常服溫中養胃散，即思食。

丁香一兩半，　人參三分，　甘草炙，　白豆蔻仁，　半夏麴，各半兩。　乾薑三兩炮。乾生薑尤佳。　右同爲細末，煉蜜爲丸，每兩作十丸，每服一丸，溫湯化下，空心食前服之。或細嚼湯下，亦可。

㊽丁香茱萸湯東垣下同　治胃虛嘔噦，吐逆，膈咽不通。

乾生薑，　黃蘗，各二分。丁香，　炙甘草　柴胡，　橘皮　半夏，各五分。　升麻七分，　吳茱萸，　草豆蔻，　黃芪，人參，各一錢。　蒼朮二錢，　當歸身一錢五分。　右件剉如麻豆大，每服半兩，水二盞，煎至一盞，去柤，稍熱服，食前，忌冷物。

㊾白朮湯　一名茯苓半夏湯，治胃氣虛弱，身重有痰，惡心欲吐，是風邪羈絆於脾胃之間，當先實其脾胃。

炒神麴二錢，　陳皮，　天麻，各三錢。　白朮，　白茯苓，　麥蘗麴炒黃色，　半夏，各五錢。　右㕮咀，每服五錢，水二盞，入生薑五片，同煎至一盞，去柤，稍熱服之。

㊿補肝湯　一名柴胡半夏湯，治素有風證，不敢見風，眼澀頭痛，眼黑，胸中有痰，惡心兀兀欲吐，遇風便覺皮肉緊，手足難舉重物，如居暖室，少出微汗，其證乃減，再或遇風，即復。

柴胡，　升麻，　藁本各五分。　白茯苓七分，　炒神麴，　蒼朮，各一錢。　半夏二錢，　生薑十片。　右爲粗末，都作一服，水一大盞，煎至半盞，去柤，稍熱服。

(六二)分氣紫蘇飲　治脾胃不和，氣逆喘促，心下脹滿，嘔逆不食。

五味子，桑白皮，茯苓，甘草炙，草果　腹皮　陳皮，桔梗各一斤。紫蘇十五兩。右剉，每服四錢，水煎，薑三片入鹽少許

(六三)匀氣散　治氣滯不匀，胷膈虛痞，宿食不消，心腹刺痛，脹滿噎塞，嘔吐惡心，調脾胃，進飲食。

生薑，沉香，丁香　檀香，木香各一兩。藿香，甘草炙各四兩。砂仁，白果仁各二兩。右爲末，每服二錢，沸湯調下，或水煎服。

(六四)快氣散　治一切氣，心腹脹痛，胷膈噎塞，噫氣吞酸，胃中痰逆嘔吐，及宿酒不解。

砂仁，甘草炙，香附，生薑，右爲末，鹽湯調下。

(六五)化氣湯　治一切氣逆，胷膈噎塞，心脾卒痛，嘔吐酸水，丈夫小腸氣，婦人血氣。

沉香，胡椒各一兩。縮砂仁去殼，桂心　木香各二兩。陳皮炒，乾薑炮，莪朮炮　青皮去穰炒，茴香炒，甘草，丁香皮各四兩。右爲末，每服二錢，薑蘇鹽湯調下。婦人淡酢湯下。

(六六)參苓白朮散　治脾胃虛弱，飲食不進，或致嘔吐泄瀉，及大病後調助脾胃。

山藥，白茯苓，人參，白朮各二斤。蓮子，砂仁，白扁豆炒，桔梗，薏苡炒黃各一斤。甘草炙三斤。右爲末，每服二錢，煎棗湯調下。

(六七)丁香煮散亙方下同　治脾胃虛冷，嘔吐不食。

丁香，乾薑炮　川烏炮去臍，甘草炙各半錢。紅豆去皮，良薑炒，青皮，胡椒各一錢。陳皮二錢，益智去皮三錢。右作一服，水二鍾，生薑三片，鹽一捻，煎至一鍾，不拘時服。

(六八)藿香半夏散　治胃虛中寒，停痰留飲，嘔吐噦逆。

臍，木香不見火，南星炮，檳榔，半夏湯泡七次，甘草炙。右等分爲細末，每服二錢，入生麪一錢和勻，生薑自然汁搜和，丸如梧桐子大，入百沸湯煮令浮亟取出，每用淡薑湯吞下，不拘時候。病甚者不過三服。惡熱藥者，生去附子。大便祕者去肉豆蔻。

(五八)胃丹　治眞陽衰虛，心火怯弱，不養脾土，沖和失布，中州虛寒，飲食不進，胸膈痞塞，或不食而脹滿，或已食而不消，痰逆惡心，翻胃吐食，臟氣虛寒，米穀不化，心腹絞痛，泄利不止，一切脾胃諸疾。

硃砂大塊不夾石者五十兩。人參，縮砂仁，肉豆蔻麪裹煨，紅豆，蓽澄茄，白豆蔻仁，高良薑剉炒，附子炮去皮臍，藿香葉，白朮，厚朴薑汁炒，丁香不見火，五味子，乾薑炮，胡椒，益智仁，橘紅，麥冬，草果仁各四兩。右將人參等二十味各如法修製，剉如豆大，以銀鍋一口，用白沙蜜五斤，將藥一半同蜜拌勻，入銀鍋內，以夾生絹袋盛貯硃砂，懸胎入銀鍋內，以桑柴火重湯煮四日四夜，換蜜五斤，入煎藥一半和勻，再煮三日三夜，取砂淘淨，焙乾，入乳鉢，用玉鎚研，直候十分細，米粽爲丸，如菉豆大，陰乾，每服十粒，加至十五粒，空心食前用人參湯送下，棗湯亦得。嘔吐用淡薑湯送下，忌食猪羊血。

(五九)大半夏湯　治嘔吐

半夏，陳皮，茯苓各二錢半。右㕮咀，水二盞，薑二錢半，煎八分，食後服。

(六〇)沉香降氣湯　治三焦痞滿，滯氣不宣，心腹痛滿，嘔吐痰沫，五噎五膈。

沉香，木香，丁香，藿香葉，人參，甘草，白朮各一兩。肉豆蔻，桂花，檳榔，陳皮，砂仁，川薑炮，枳實炒，白檀各二兩。青皮，白茯苓，白豆蔻。右每服三錢，水煎，入鹽少許。

(六一)鹽煎散　治男子婦人一切冷氣攻衝胸脅，刺痛不已，及脾胃虛冷，嘔吐泄瀉，膀胱小腸氣，婦人血虛痛。

化服亦得量病加減

⑭助胃膏 治嘔吐不食。

人參，白朮，茯苓，橘皮，縮砂仁各一分。丁香，木香，肉豆蔻煨，草果仁各一錢半。白豆蔻仁一錢。

右爲細末，煉蜜和丸如彈子大，每服一丸，生薑煎湯化下。

⑮炮附子丸 治胃脘有熱，胃中有寒，嘔吐不止。

附子炮去皮臍。右碾爲細末，以麪糊和丸如梧桐子大，就濕以大黃末爲衣，每服十丸加至二十丸，薑湯送下。

⑯加味二陳湯 治胃熱嘔吐不已。

半夏湯炮七次，陳皮各半兩。白茯苓三錢，甘草一錢半，刮筆竹青四錢。右㕮咀，每服四錢，水一盞半，生薑七片，煎至七分，去滓，不拘時嚥服。

⑰麥門冬湯 療煩熱嘔逆，食下則出。

麥門冬，青竹茹各三兩。茅根，生薑各五兩。人參，甘草炙各一兩，右切以水七升，煮取二升五合，分溫三服。如人行五里進一服。不吐利，忌海藻菘菜。

⑱加味七氣湯 治氣鬱嘔吐。

半夏製二兩半，人參，厚朴製，辣桂各一兩。茯苓一兩半，甘草炙半兩。右㕮咀，每服三錢半，生薑七片，棗一枚，煎至七分，去滓服，加木香煎亦得。

⑲小丁沉丸 治乾嘔和調胃氣。

丁香，蘹香子炒，各半兩。木香各半兩。沉香，縮砂仁，白芷炒，益智仁，甘草炙，橘紅焙，生薑一斤，細切，入青鹽四兩，淹一宿，焙乾各一兩。阿魏一分，用酢半升，熬成膏。右爲細末，入阿魏膏拌勻，用酢煮麪糊和

藿香二錢，半夏湯泡七次，炒黃色三錢半。丁香皮一錢半。右作一服，水二鍾，生薑七片，煎至一鍾，食前服。

(九九)丁附治中湯　治胃寒停痰，嘔吐不已。

丁香，青皮炒，陳皮，白朮煨，人參各二錢。附子炮，甘草炙各一錢。乾薑炮半錢。右作一服，水二盞，生薑五片，煎至一鍾，空心服。

(百)沉香煎丸　治嘔吐，除中滿痞氣，痰逆惡心，臟腑不調。

沉香，硫黃別研水飛，檳榔麪裹煨，胡椒，沒藥別研，丹砂別研水飛，良薑，丁香，硇砂別研水飛熬，青皮去白炒，木香各一兩。縮砂去皮，巴豆去皮心膜，新瓦上壓去油一分。阿魏醋浸開，用白麪和作餅，炙焦，別研為末。吳茱萸陳久者湯浸，取沉者炒各半兩。右除別研藥外，餘藥為細末，入別研藥研勻，煉蜜和丸如菉豆大，磁盒盛貯封，每服二丸，食前臨臥用溫生薑橘皮湯下，量人虛實大小加減。

(百一)丁香丸　治因食冷物凝滯胃間，嘔吐不止。

大丁香半兩，乾薑，肉桂各二錢。木香，胡椒，藿香，甘草炙，各三錢。右為細末，湯浸蒸餅，和丸如菉豆大，焙乾，時時乾嚼，不必飲湯水，水入即愈吐，如覺痿弱，更加附子隨意。

(百二)大養胃湯　治飲食傷脾，宿食不化，朝食暮吐，暮食朝吐，上氣復熱，四肢冷痹，三焦不調，及胃虛寒氣在下，二氣並爭，但出不入，嘔不得食。

厚朴去皮，生薑各二兩。白朮，山藥，人參，川芎，橘皮，當歸，五味子，藿香，黃芪，枇杷葉刷去毛尖，薑汁炙，甘草炙，各一兩。肥棗三兩，同厚朴生薑三味炒。右㕮咀，每服四錢，水一盞半，生薑三片，棗一枚，煎七分，去滓，空心服。或為細末，米湯調下，亦可。

(百三)十珍餅子　治大人小兒嘔吐，痰涎，粥藥難停，無問久新，皆治。

(八六)參粟湯　治乾嘔不下食

人參一兩，　陳粟米一兩半，　生薑切碎五兩。　半夏湯泡七次，去滑四兩，用生薑同搗碎焙乾。　右同入銀石鍋中，慢火焙，令焦黃，粗搗篩，每服三錢，水一盞，生薑三片，棗二枚，去核，煎至七分，去滓，微熱空心服。

(八七)三聖散　治噦逆不食。

半夏七枚，大者線穿於井華水內浸，一日一換水，七日取出焙乾。　丁香四十九粒，　胡椒四錢。　右爲細末，大人用生薑湯調一字，小兒筋頭蘸生薑汁，後點藥少許口中立愈。至甚者不過三服。

(八八)丁香附子散　治脾胃虛弱，胷膈痞結，吐逆不止。

母丁香四十九箇，　生薑半斤，取自然汁半碗，　附子一兩。　右用附子鑽孔四十九，以丁香刺上面塡內，將生薑汁用文武火熬盡，又用大蘿蔔一箇，取一穴子，入附子，又塡內，將蘿蔔蓋之，又用文武桑柴火燒香熟爲度，取出切附子作片子，焙乾，搗爲細末，每服一錢，米湯一盞調下，日進三服。

(八九)紫沉丸　治中焦吐食，由食積爲寒氣相假，故吐而痛，宜服之。

半夏麯，　代赭石，　縮砂仁，各三錢。　烏梅去核，　丁香，　檳榔，各二錢。　杏仁去皮尖，　沉香，　木香，　白朮，各一錢。　陳皮五錢，　白豆蔻，　巴豆霜另研各半錢。　右爲細末入巴豆霜，令勻，酢糊丸黍米大，每服五十丸，吐愈則止。治小兒食積吐食大妙。

(九〇)五積丹　治心腹痞滿，嘔吐不止，破積聚者。

皂莢一鋌，一尺二寸，燒留性，盆合土壅，勿令出烟。　巴豆十二箇，白麪一兩五錢，同炒令黃色爲度。　右爲末，酢麪糊爲丸菉豆大，每服十丸，鹽湯下，食後加減。

(九一)桔梗湯　治上焦氣熱上衝，食已暴吐，脈浮而洪，宜先和中。

丸如雞頭實大，研丹砂麝香細末各少許，同爲衣，每服一丸，細嚼，用薑鹽湯送下，空心服。

(八〇)草豆蔻湯　治乾嘔和胃下氣。

草豆蔻去皮，　藿香，　枳殼去瓤麩炒，　白朮，　橘紅焙，　山芋，各半兩。　桂心，　丁香，各一分。　右㕮咀，每服三錢，水一盞，棗二枚，擘破，粟米少許，同煎至七分，去滓，食前溫服。

(八一)生薑丸　治乾嘔惡心，益津液和胃氣。

生薑二斤，和皮切，以青皮三兩，同淹一宿，焙乾。　甘草炙，　陳皮湯浸去白，焙乾各四兩。　香白芷，　縮砂仁去皮，　胡椒，各一兩。　蓬朮炮二兩。　右爲細末，以麪糊和丸如小彈子大，用丹砂細末爲衣，每服一丸，細嚼溫酒送下，食前服。

(八二)溫中白朮丸　治胃寒嘔噦。

白朮炒三兩半，　半夏二兩製，　乾薑一兩，　丁香半兩。　右爲細末，生薑汁煮糊，和丸如梧桐子大，每服三十丸，不拘時，生薑湯送下。

(八三)思食丸　助脾胃，消飲食，止嘔逆。

烏梅肉五錢，　神麴炒，　麥蘖炒，各六錢。　人參，　乾薑炮，　甘草炙，各二錢。　右爲細末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服三五十丸，食前用米飲湯送下。

(八四)參香枳朮丸　開胃進食，止嘔吐。

人參，　木香，各三錢。　枳實炒一兩，　陳皮四錢，　白朮一兩半，　乾生薑二錢半。　右爲細末，用荷葉包米煨飯和丸如梧桐子大，每服五七十丸，不拘時，用米湯送下。

(八五)開胃丸河間下同　治乾嘔氣逆不下。

(九八)附子丸 治下焦吐食，朝食暮吐，暮食朝吐，大便不通。

附子炮五錢，巴豆霜一錢，砒一分。右同研極細，鎔黃蠟爲丸桐子大，每服一二丸，冷水送下，利爲度。後更服紫沉丸，常服，不令再閉。

(九九)白朮散 治酒積嘔噦。

白朮，茯苓去皮，人參，藿香葉各五錢。炙甘草一兩半。木香一分，葛根一兩。右爲末，白湯調下二錢。煩渴者，加滑石二兩。甚者加薑汁，續續飲之。

(一〇〇)乾薑芩連人參湯入門下同 治傷寒食入卽吐。

乾薑，黃芩，黃連，人參各三錢。水煎溫服。

(一〇一)羌活附子湯 治陰證寒厥嘔逆。

羌活一錢，大附子半枚炮，茴香，丁香，乾薑各一錢半。右水煎入鹽一撮，熱服。

(一〇二)大橘皮湯 治嘔逆胷滿，虛煩不安。

陳皮，甘草，各二錢。人參五錢，右薑七片，水煎服。

(一〇三)小橘皮湯 治嘔而手足厥冷者。

陳皮五錢，生薑一兩，右水煎溫服。

白朮一兩半，桔梗，橘紅，枳實麩炒，茯苓，厚朴薑製炒香，各一兩。半夏麴二兩。右㕮咀每服一兩，水一盞，煎至七分，取清温服，調木香散二錢，隔夜空腹食前服之。三服之後，氣漸下，吐漸止，然後用木香散加芍藥二兩，黃芪一兩半，每料中扣算加上件分兩，依前服之，病愈則已。如大便燥結，食不盡下，以大承氣湯去硝微下之，少利爲度。再服前藥補之。如大便復結，又依前再微下之。

㊼木香散　治氣逆嘔吐。

木香，檳榔各等分。右爲細末，煎服調服。

㊽荊黃湯　治暴吐者，上焦氣熱所衝也。經曰：『諸嘔吐酸暴注下迫，皆屬於火，脈洪而浮。』

荊芥一兩，人參五錢，甘草二錢半，大黃三錢。右爲粗末，都作一服，水二盞煎至一盞，去滓，調檳榔散二錢，空心服。

㊾檳榔散　治氣逆嘔吐。

檳榔二錢，木香一錢半，輕粉少許。右爲細末，用前藥調服，如爲丸亦可。用水浸蒸餅，爲丸如小豆大，每服二十丸，食後服。

㊿青鎮丸　治上焦吐，頭發痛，有汗，脈弦。

柴胡二兩去苗，黃芩七錢半，甘草，人參，半夏湯洗各半兩，青黛二錢半。右爲細末，薑汁浸丸，生薑湯食後服。

㊀白朮湯　治胃中虛損，有痰而吐。

半夏麴半兩，白朮，木香，甘草各二錢。檳榔二錢半，茯苓二錢。右六味，同爲細末，每服二錢，煎生薑湯

# 醫部彙考二百五十一

## 嘔吐門四

### 方二

㊃藿香安胃散寶鑑下同　治脾胃虛弱，不進飲食，嘔吐不得腐熟。

人參，　丁香，各一錢。　藿香七分半，　陳皮二錢半。　右爲末，每服二錢，水二盞生薑三片，煎至一盞，去查涼服。

㊄藿香散　溫脾胃，化痰飲，消宿冷，止嘔吐，治胃膈痞悶，腹脅脹痛，短氣噎悶，欬嘔痰水，噫酢吞酸，噯逆惡心，山嵐瘴氣。

厚朴薑製，　半夏炮，　藿香葉，　陳皮去白，　炙甘草各等分。　右五味㕮咀，每服二錢，水一盞，薑三片，棗子一箇，煎至七分，去滓溫服，無時日三服。

㊅大七香丸　治脾胃虛冷，心膈噎塞，漸成膈氣，脾泄瀉痢，反胃嘔吐。

香附子二兩，　麥糵一兩，　丁香三兩半，　藿香，　縮砂仁，　官桂，　甘草，　陳皮各二兩半。　甘松，　烏藥各六錢。　右十味爲末，蜜丸彈子大，每服一丸，鹽酒鹽湯任嚼下，忌生冷肥膩物。

㊆小七香丸　溫中快膈，化積和氣，治中酒嘔逆，氣膈食噎，茶酒食積，小兒疳氣。

白豆蔻五錢，右爲末，好酒調服。

㉖金水六君煎 景岳全書下同 治肺腎虛寒，水泛爲痰，嘔吐等證。

當歸，半夏，茯苓各三錢。熟地三五錢，陳皮一錢半，炙甘草一錢。水二鍾，生薑三五七片，煎七八分，食遠温服。

㉗和胃二陳湯 治胃寒生痰，惡心嘔吐，胸膈滿悶噯氣。

乾薑炒一二錢，砂仁四五分，陳皮，半夏，茯苓各一錢半。甘草炙七分。水一鍾半，煎七分，不拘時温服。

㉘苓朮二陳煎 治痰飲水氣停蓄，心下嘔吐吞酸等證。

猪苓，澤瀉，茯苓各一錢半。半夏二三錢，炙甘草八分，乾薑炒黃，白朮各一二錢。陳皮一錢，水一鍾半，煎服。如肝腎兼寒者，加肉桂一二錢。

㉙和胃飲 治寒濕傷脾，霍亂吐瀉，及痰飲水氣，胃脘不淸，嘔惡脹滿腹痛等證，此卽平胃散之變方也。凡嘔吐等證，多有胃氣虛者，一聞蒼朮之氣，亦能動嘔，故以乾薑代之。

陳皮，厚朴薑汁製各一錢半。乾薑炮一二錢，炙甘草一錢。水一鍾半，煎七分温服。此方凡藿香木香丁香茯苓半夏扁豆砂仁澤瀉之類，皆可隨宜增用之。若胸腹有滯而兼時氣寒熱者，加柴胡。

㉚排氣湯 治氣逆食滯，脹痛嘔吐等證。

陳皮，藿香，枳殼各一錢五分。香附，澤瀉，烏藥各二錢。木香七分或一錢。厚朴一錢，水一鍾半，煎七分，熱服。

㉛大和中飲 治飲食留滯，積聚嘔吐等證。

甘松八兩，益智仁六兩，香附子，丁香皮，甘草各十二兩。蓬朮，縮砂，各二兩。右爲末，蒸餅爲丸菉豆大，每服二十丸，溫酒薑湯熟水任下。

㉘木香餅子　快氣消食，利胷膈，化痰涎，止宿酒，痰嘔吐噦，惡心。

木香，官桂去皮，薑黃，香附炒去毛，川芎，香白芷，甘松，縮砂仁各二兩。甘草炙半兩。右九味爲末，水和捏成餅子，每服十數餅，細嚼薑湯送下，不拘時候。

㉙參朮調中湯　治內傷自利，臍腹痛，肢體倦，不喜食，食卽嘔，嗜臥，懶言，足胻冷，頭目昏。

人參，黃芪各五錢。當歸身，厚朴薑製，益智仁，草豆蔻，木香，白朮，甘草炙，神麴炒，麥蘖麴，橘皮各三錢。右十二味，剉如麻豆大，每服一兩，水二盞，薑三片，煎至一盞，去滓溫服，食前。

㉚鐵刷湯　治積寒痰飲，嘔吐不止，胷膈不快，不下飲食。

半夏四錢湯泡，草豆蔻，丁香，乾薑炮，訶子皮，各三錢。生薑一兩。右六味㕮咀，水五盞，煎至二盞半，去柤，分三服，無時。大吐不止，加附子三錢，生薑半兩。

㉛四味藿葉湯　治胃寒嘔吐，粥藥不停。

藿香，人參，橘皮，半夏各等分。右薑煎溫服。

㉜古參萸湯　治氣虛胃寒，嘔吐冷涎，陰證乾嘔通用。

吳茱萸，人參各等分。右薑棗煎服。

㉝古丁夏湯　治脾中虛寒，停痰留飲，噦逆嘔吐。

丁香，半夏各三錢。右薑煎溫服。

人參一二兩，製附子，炮乾薑各二三錢，炙甘草一二錢。[illegible]

㉛六味回陽飲　治嘔吐陰陽將脫等證。

人參一二兩或數錢，製附子，炮乾薑各二三錢。熟地五錢或一兩，當歸身三錢。泄瀉或者以冬朮代。水二鍾，武火煎七八分，溫服。

㉜理陰煎　治眞陰虛弱，脹滿嘔噦，痰飲惡心，吐瀉腹痛等證。

熟地三五七錢或一二兩，炙甘草一二錢，當歸二三錢或五七錢，乾薑炒黃色一二三錢，或加肉桂一二錢。水二鍾，煎七八分，熱服。

㉝溫胃飲　治中寒嘔吐，吞酸泄瀉，不思飲食，及婦人臟寒嘔惡，胎氣不安等證。

人參一二三錢或一兩，白朮炒一二錢或一兩，扁豆炒二錢，陳皮一錢或不用，炙甘草一錢，乾薑炒焦一二三錢，當歸一二錢。滑泄者勿用。水二鍾，煎七分，食遠溫服。

㉞參薑飲　治脾胃肺氣虛寒，嘔吐欬嗽氣短，小兒吐乳等證。

乾薑炮五分或一二錢，或用煨生薑三五片，人參三五錢或倍之，炙甘草三五分。水一鍾半，煎七八分，徐徐服之。

㉟黃芽丸　治脾胃虛寒，或飲食不化，或時多脹滿，泄瀉吞酸嘔吐等證。

人參二兩，焦乾薑三錢。煉白蜜爲丸，芡實大，常嚼服之。

㊱一炁丹　治脾胃虛寒嘔吐等證。

人參，製附子各等分。煉白蜜丸如菉豆大，每用滾白湯送下三五分或一錢。凡藥餌不便之處，或在途次，隨帶此丹最妙。

陳皮一二錢，枳實一錢，砂仁五分，山楂，麥芽各二錢。澤瀉，厚朴，各一錢半。水一鍾半，煎七八分，食遠溫服。

㉒小和中飲　治胸膈脹悶嘔吐等證。

陳皮，茯苓，厚朴各一錢五分。山楂肉，扁豆炒各二錢。甘草五分。水一鍾半，加生薑三五片煎服。

㉓大分清飲　治積熱閉結，小水不利嘔吐等證。

茯苓，澤瀉，木通各二錢。猪苓，枳殼，梔子或倍之。車前子各一錢。水一鍾半，煎八分，食遠溫服。

㉔小分清飲　治小水不利，濕滯嘔吐腫脹，不能受補等證。

茯苓，澤瀉，猪苓各二三錢。薏仁二錢，枳殼，厚朴，各一錢。水一鍾半，煎七八分，食前服。

㉕神香散　治胸脅胃脘，逆冷難解，疼痛嘔噦，脹滿，痰飲膈噎，藥不效者，惟此最妙。

丁香，白豆蔻或砂仁亦可。二味等分為末，清湯調下五七分，甚者一錢，日數服不拘。

㉖正柴胡飲　凡外感風寒發熱惡寒頭疼身痛嘔吐等證。

柴胡一二三錢，防風，甘草各一錢。陳皮一錢半，芍藥二錢，生薑三五片。水一鍾半，煎七八分，熱服。

㉗柴陳煎　治傷風兼寒，欬嗽發熱，痞滿多痰嘔吐等證。

柴胡二三錢，陳皮一錢半，甘草一錢，半夏，茯苓各二錢。生薑三五七片。水一鍾半，煎七分，食遠溫服。

㉘抽薪飲　治諸凡嘔吐火熾盛而不宜補者。

黃芩，石斛，木通，梔子炒，黃蘗，各一二錢。細甘草三分，枳殼，澤瀉各錢半。水一鍾半，煎七分，食遠溫服。內熱甚者，冷服更佳。

㉙太清飲　治胃火煩熱，發狂嘔吐等證，與白虎湯出入酌用。

中酒嘔逆，赤小豆煮汁徐徐服之。千金方

嘔逆不止，眞火酒一杯，新汲井水一杯，和服，甚妙。類湖。

乾嘔厥逆，頻嚼生薑，嘔家聖藥也。

嘔吐不止，生薑一兩，酢醬二合，銀器煎取四合，連滓呷之。又殺腹內長蟲。食醫心鏡。

頭運吐逆，胃冷生痰也。用川乾薑炮二錢半，甘草炒一錢二分，水一鍾半，煎減半服，累用有效。傳信適用方。

嘈雜吐水，眞橘皮去白為末，五更安五分於掌心舐之，即睡，三日必效。皮不眞則不驗。怪證奇方。

嘔吐痰水，白檳榔一顆，煨熟，橘皮二錢半，炙，為末，水一盞，煎半盞，溫服。千金方。

酢心吐水，檳榔四兩，橘皮一兩，為末，每服方寸匕，空心生蜜湯調下。梅師方。

嘔噦厥逆，蘡薁藤煎汁呷之。肘後方。

乾嘔不息，蔗汁溫服半升，日三次，入薑汁更佳。肘後方。

胃冷嘔逆，氣厥不通，母丁香三箇，陳橘皮一塊，去白，焙，水煎熱服。十便良方。

痰壅嘔逆，心胸滿悶不下飲食，厚朴一兩，薑汁炙黃為末，非時米飲調下二錢匕。聖惠方。

嘔逆不食，訶黎勒皮二兩，炒研，糊丸梧子大，空心湯服二十丸，日三服。廣濟方。

天行嘔逆，食入即吐，雞子一枚，水煑三五沸，冷水浸少頃，吞之。外臺。

吐逆不止，不拘男女，連日粥飲湯藥不能下者，即效。五靈脂治淨為末，狗膽汁和丸芡子大，每服一丸，煎生薑酒磨化，猛口熱吞，不得漱口，急將溫粥少許壓之。經驗。

脾虛吐食，羊肉半斤，作生，以蒜薤醬豉五味和拌，空腹食之。心鏡。

天行病後，嘔逆食即反出，用青羊肝作生，淡食，不過三度，食不出矣。外臺。

㈢溫臟丸　治吐蚘。

人參隨宜無亦可。　白朮米泔浸炒，當歸，各四兩。　芍藥酒炒焦，茯苓，細榧肉，史君子煨取肉，川椒去合口者炒出汗，　檳榔各二兩。　乾薑炮，　吳茱萸湯泡一宿炒各一兩。　右為末，神麴糊為丸桐子大，每服五七十丸或百丸，饑時白湯下。

㈢聖朮煎　治寒濕瀉利嘔吐，尤為聖藥。

冬白朮五六七八錢炒或一二兩，　乾薑炒，　肉桂，各一二錢。　陳皮酌用或不用。　水一鍾半，煎七分，溫熱服。

## 單方

嘔吐陽厥卒死者，飲新汲水三升，佳。千金方。

心痛吐水不下飲食，發止不定，雌黃二兩，酢二斤，慢火煎成膏，用乾蒸餅和丸梧子大，每服七丸，薑湯下。聖惠方。

暴得吐逆不下食，生滑石末二錢匕，溫水服，仍以細麪半盞壓定。寇氏衍義。

胃弱嘔逆不食，用草豆蔻仁二枚，高良薑半兩，水一盞，煮取汁，入生薑汁半合，白麪作撥刀，以羊肉臛汁煮熟，空心食之。普濟方。

口吐清水，乾蘄艾煎湯啜之。怪證奇方。

食已即吐，大黃四兩，甘草二兩，水三升，煮一升半，分再服。千金方。

嘔逆厥逆，內有寒痰，半夏一升，洗滑焙研，小麥麪一升，水和作彈丸，水煮熟，初吞四五枚，日三服，稍增至十五枚。旋煮旋吞，覺病減再作，忌羊肉餳糖。此乃許仁則方也。外臺。

乾嘔不息，葛根搗汁服一升，差。肘後方。

素問曰：心熱病者，熱爭則卒心痛，煩悶善嘔，頭痛面赤，無汗，刺手少陰太陽。

脾熱病者先頭重頰痛，煩心顏青欲嘔，身熱，刺足太陰陽明。

靈樞曰：善嘔嘔有苦，長太息，心中憺憺，恐人將捕之，邪在膽，逆在胃，膽液泄則口苦，胃氣逆則嘔苦，故曰嘔膽，取三里以下。胃氣逆則刺少陽血絡，以閉膽逆，却調其虛實，以去其邪。

甲乙經曰：熱病汗不出而苦嘔煩心，承光主之。

頭項惡風，汗不出，悽厥惡寒，嘔吐，目系急痛引頞，頭重項痛，玉枕主之。

醉酒風熱發，兩角眩痛，不能飲食，煩滿嘔吐，率谷主之。

傷寒熱盛煩嘔，大椎主之。

背痛惡寒，脊強俛仰難，食不下，嘔吐多涎，鬲俞主之。胷脅䐜滿，背痛，惡風寒，飲食不下，嘔吐不留住，魂門主之。

振寒瘈瘲，手不伸，欬嗽唾濁，氣鬲善嘔，鼓頷不得汗，煩滿因爲瘲衄，尺澤主之。左窒刺右，右窒刺左。

熱病煩心而汗不止，肘攣腋腫，善笑不休，心中痛，目赤黃，小便如血，欲嘔，胷中熱，苦不樂，太息，喉痹嗌乾，喘逆，身熱如火，頭痛如破，短氣胷痛，太陵主之。

熱病煩心善嘔，胷中憺憺善動而熱，間使主之。

熱病腹滿善嘔煩悶，大都主之。

熱病汗不出善嘔苦，痓身反折，口噤善鼓頷，腰痛不可以顧，顧而有似拔者，善悲，上下取之出血，見血立。

瘧欬逆心悶不得臥，嘔甚，熱多寒少，欲閉戶牖而處，寒厥足熱，太谿主之。

陽厥悽悽而寒，少腹堅，頭痛，脛股腹痛，消中，小便不利，善嘔，三里主之。

嘔逆酸水，羊屎十枚，酒二合，煎一合，頓服，未定更服必效。若以童子小便煑服，不過三升愈。肘後方。

食後喜嘔，鹿角燒灰二兩，人參一兩，爲末，薑湯服方寸匕，日三。肘後方。

嘔吐酸漿，水煎頭垢豆許，服一杯，效。普濟方。

虛寒嘔噦，飲食不下，細莘去葉半兩，丁香二錢半，爲末，每服一錢，柿蔕湯下。

嘔噦不止厥逆者，蘆根三斤，切，水煎濃汁，頻飲二升之。兵部手集。

嘔噦不止，酢和麪作彈丸二三十枚，以沸湯煑熟，漉出，投漿水中，待溫吞三兩枚，噦定，卽不用再吞，未定，至晚再吞。兵部手集。

嘔噦，心下痞堅，生薑八兩，水三升，煑一升，半夏五合，洗，水五升，煑一升，取汁同煑一升半，分再服。千金方下同。

乾嘔吐逆，涎水沫出，半夏乾薑各等分，二味㕮咀，以漿水一升半，煑取七合，頓服之，日三。

病人乾嘔，取羊乳汁飲一杯。

乾嘔，酒淩馬原一宿，取汁服之。

又方。煑豉三升，飲汁，佳。

又方。空腹飲薑汁一升。

噁心，取苦瓠瓤幷子一升，碎，以酒水三升，煑取一升，頓服，須臾吐幷下，如蝦蟆衣三升。

又方。服小便一百日，佳。

又方。麻子一升，熬令香熟，擣，取酒三升，熟研，濾取一升，飲盡，日二服，盡一石，瘥一切病，自能飲食。不能酒，任性多少。

治食飲輒吐方，頓服生熟湯三升，卽止。

頭痛食不下腸鳴臚脹欲嘔時泄三焦俞主之

食飲不化，入腹還出，下脘主之。

腹中腸鳴盈盈然，食不化，脅痛不得臥，煩熱中不嗜食，胷脅榰滿，喘息而衝，鬲嘔心痛，及傷飽身黃，疾骨羸瘦，章門主之。

溺難痛，白濁，卒疝，少腹腫，欬逆嘔吐，卒陰跳，腰痛不可以俛仰，面黑熱，腹中䐜滿，身熱厥痛，行間主之。

風眩善嘔，煩滿，神庭主之。如顏青者，上星主之。取上星者，先取譩譆，後取天牖風池。

頭身風，善嘔，怵，寒中，少氣，掌中熱，胕急，腋腫，間使主之。

凡好太息，不嗜食，多寒熱汗出，病至則善嘔，嘔已乃衰，卽取公孫及井俞，實則陽中切痛，厥頭面腫起。心狂多飲，霍則鼓濁，腹中氣大滯，熱痛不嗜臥，霍亂，公孫主之。

嘔吐煩滿，魄戶主之。

黃癉善欠，脅下滿欲吐，脾俞主之。

食飲善嘔，不能言，通谷主之。

寒熱頭痛如破，目痛如脫，喘逆煩滿，嘔吐流汗，難言，頭維主之。

肺氣熱，呼吸不得臥，上氣嘔沫，喘氣相追逐，胷滿脅膺急，息難，振慄，脈鼓，氣膈，胷中有熱，支滿，不嗜食，汗不出，腰脊痛，肺俞主之。

氣痛癃，小便黃，氣滿塞則遺溺，身時寒熱，吐逆，溺難，腹滿，石門主之。

脈經曰：左手關前寸口陰絕者，無心脈也。苦心下毒痛，掌中熱，時時善嘔，口中傷爛，刺手太陽經，治陽。

左手關上陰絕者，無肝脈也。苦癃遺溺難言，脅下有邪氣，善吐，刺足少陽經，治陽。

欬而嘔鬲寒食不下，寒熱，皮肉膚痛，少氣不得臥，胷滿支兩脅，鬲上兢兢，脅痛腹䐜，胷脘暴痛，上氣，肩背寒痛，汗不出，喉痹腹中痛，積聚，默然嗜臥，怠惰不欲動，身常濕濕，心痛無可搖者，脾俞主之。

肺系急，胷中痛，惡寒胷滿悒悒然，善嘔膽，胷中熱，喘逆氣相追逐，多濁唾不得息，肩背風，汗出，面腹腫，鬲中食饐，不下食，喉痹肩息，肺脹，皮膚骨痛，寒熱煩滿，中府主之。

寒濯濯，舌煩手臂不仁，唾沫脣乾引飲，手腕攣指肢痛，肺脹上氣，耳中生風，欬喘逆痹，臂痛嘔吐，飲食不下，膨膨然，少商主之。

寒熱欬嘔沫，掌中熱，虛則肩臂寒慄，少氣不足以息，寒厥交兩手而瞀，時則寒熱，饑則煩，飽則善，面色變，口噤不開，惡風，泣出，列缺主之。

寒熱善嘔，商丘主之。

嘔厥寒時有微熱，脅下支滿，喉痛嗌乾，膝外廉痛，淫濼脛痠，腋下腫馬刀瘻，肩腫吻傷痛，太衝主之。

氣疝，噦嘔面腫，奔肫天樞主之。

胷脅背相引，心下溷溷，嘔吐多唾，飲食不下，幽門主之。

欬逆上氣，喘不得息，嘔吐胷滿，不得飲食，俞府主之。

胷滿欬逆，喘不得嘔吐煩滿，不得飲食，神藏主之。

胷滿嘔無所出，口苦舌乾，飲食不下，膽俞主之。

胷脅榰滿，痹痛骨疼，飲食不下，嘔逆氣上煩心，紫宮主之。

胷脅榰滿，鬲塞飲食不下，嘔吐，食復出，中庭主之。

傷食，脅下滿不能展轉反側，目青而嘔，期門主之。

玉闕膺堂主吐食

頭維主喘逆煩滿嘔沫流汗。

魄戶中府主肺寒熱，呼吸不得臥，欬逆上氣，嘔沫，喘氣相追逐。

俠白主欬，乾嘔，煩滿。

少海主氣逆，呼吸，噫噦嘔。

巨闕主煩心喜嘔。

百會主汗出而嘔痓。

商丘主寒熱，好嘔。

大椎主傷寒熱盛，煩嘔。

膈腧主頭身熱赤振慄，腰中四肢淫濼，欲嘔。

尺澤主氣隔喜嘔，鼓頷不得汗，煩心身痛。

四肢寒熱，腰疼不得俛仰，身黃腹滿，食嘔舌根直，灸第十一椎上及左右各一寸五分三處，各七壯。

乾嘔，灸心主尺澤亦佳。

又方。灸乳下一寸三十壯。

又方。乾嘔不止，粥食湯藥皆吐不停，灸手間使五十壯。若四肢厥脈，沉絕不止者，灸之便通。此起死人法。

吐逆嘔不得食，灸心腧百壯。

吐嘔逆不得下食，今日食，明日吐者，灸膈腧百壯。

吐變不得下食，灸胷堂百壯。

右手關上陰絕者，無脾脈也。苦少氣下利，腹滿身重，四肢不欲動，善嘔，刺足陽明經，治陽。

千金方曰：期門主目青而嘔。

膽輸章門，主脅痛不得臥，胸滿嘔無所出。

章門主心痛而嘔。

商丘幽門通谷主喜嘔。又云：商丘主脾虛冷，入病寒，不樂，好太息，多寒熱，喜嘔。

俞府靈墟神藏巨闕主嘔吐胸滿。

率谷主煩滿嘔吐。

天容主欬逆嘔沫。

胃腧腎腧主嘔吐。

曲澤主逆氣嘔涎。

中庭中府主嘔逆吐，食不還出。

石門主嘔吐。

陽陵泉主嘔宿汁，心下憺憺。

維道主嘔逆不止。

少商勞宮主嘔吐。

絕骨主病熱欲嘔。

大鍾太谿主煩心滿嘔。

[illegible]門[illegible]關上[illegible]上下主，多涎。

衛生寶鑑曰：中書左丞相史公年六旬有七，至元丁卯九月間，因內傷自利數行，覺肢體沉重，不思飲食，嗜臥懶言語，舌不知味，腹中疼痛，頭亦痛而惡心。醫以通聖散大作劑料服之，覆以厚衣，遂大汗出，前證不除而反增劇，易數醫，四月餘，不愈。予被召至燕，命予治之。予診視得六脈沉細而微弦，不欲食，食即嘔吐，中氣不調，滯于升降，口舌乾燥，頭目昏眩，肢體倦怠，足胻冷，臥不欲起。丞相素不飲酒，肢體本瘦，又因內傷自利，又復發汗，是重竭津液，脾胃愈虛，不能滋榮周身百脈，故使然也。非甘辛大溫之劑，則不能溫養其氣。經云：『脾欲緩，急食甘以緩之。又脾不足者，以甘補之。』黃芪人參之甘，補脾緩中，故以為君。『形不足者，溫之以氣。』當歸辛溫，和血潤燥，木香辛溫，升降滯氣，生薑益智草豆蔻仁辛甘大熱，以蕩中寒，理其正氣，白朮炙甘草橘皮甘苦溫，乃厚腸胃，麥蘗寬腸胃而和中，神麯辛熱，導滯消食而為佐使也。右件㕮咀，一兩，水煎服之。嘔吐止，飲食進，越三日，前證悉去，左右侍者曰：『前證雖去，九日不大便，如何？』予曰：『丞相年高氣弱，既利且汗，脾胃不足，陽氣虧損，津液不潤也，豈敢以寒涼有毒之劑下之？仲景曰：「大發汗後，小便數，大便堅，不可用承氣湯。」如此雖內結，宜以蜜煎導之。』須臾，去燥屎二十餘塊，遂覺腹中空快，上下氣調，又以前藥服之，喜飲食，但有所傷，則以橘皮枳朮丸消導之，至月餘，其病乃得平復，丞相曰：『病既去矣，當服何藥以防其復來？』予曰：『不然，但慎言語，節飲食，不可服藥。夫用藥如用刑，民有罪則刑之，身有疾則藥之，無罪妄刑，是謂虐民；無病妄藥，反傷正氣。軍志曰：允當則歸，服而舍之可也。』丞相悅而然之。

奇效良方曰：政和中一人病傷寒，得汗身涼，數日忽嘔吐，藥與飲食俱不下。醫者皆進丁香藿香滑石等藥，下咽即吐。予曰：『此正汗後餘熱留胃，孫兆竹茹湯正相當爾。』急治藥與之，即時愈。

醫學正傳曰：在城黃氏婦年將三十，產後因食傷，致胃虛不納穀四十餘日矣，聞穀氣則惡心而嘔，聞藥氣亦嘔，求

吐逆不得食，灸巨闕五十壯。

吐逆食不住，灸胃脘百壯三報。

吐逆飲食却出，灸脾募百壯三報。章門穴也。

吐嘔宿汁吞酸，灸神光一名膽募百壯三報。

吐逆霍亂吐血，灸手心主五十壯。

噫噦嘔逆，灸石關百壯。

肺脹脅滿嘔吐上氣等病，灸上椎幷兩乳上第三肋間，各止七壯。

胷中痛引腰背心下嘔逆面無滋潤，灸幽門上，隨年壯。穴在俠巨闕兩邊，相去各半寸。一云一寸。

脾中風者，其人但踞坐而腹滿，身通黃，吐鹹汁出者，尚可治。急灸脾腧百壯，服續命湯。若目下青手足青者，不可復治。

## 導引

古今醫統曰：嘔吐導引法，正坐，兩手向後，捉腕摩肋，上下七息，左右換手亦然。除腹冷，宿氣積胃口，飲食進退，吐逆不下。

又法。偃臥展脛，兩手左蹻兩足踵，以鼻內氣，自極七息，除腹中食嘔。

又法。坐直舒兩脚，以兩手挽兩足，自極十二通，愈腸胃不能受食吐逆，以兩手直交兩足底脚痛舒，以頭枕膝下自極十二通，愈腸胃不能受食吐逆。

寒中。』不信，仍作火治，肢體腫脹如蠱。余以六君加附子木香治之，胃氣漸醒，飲食漸進，虛火歸經。又以補中益氣，加炮薑木香茯苓半夏兼服全愈。

陳湖陸佃母久患心腹疼痛，每作必胷滿，嘔吐，厥逆，面赤，唇麻，咽乾舌燥，寒熱不時而脈洪大。衆以痰火治之，屢止屢作。迨乙巳春發熱頻甚，用藥反劇。有朱存默氏謂：『服寒涼藥所致。』欲用參朮等劑。彼疑痛無補法，乃延予以折中焉。予診之曰：『此寒涼損眞之故，內眞寒而外假熱也。且脈息弦洪而有怪狀，乃脾氣虧損，肝脈乘之而然。惟當溫補其胃。』遂與補中益氣加半夏茯苓吳茱萸木香，一服而熟寐徹曉，洪脈頓斂，怪脈頓除，諸證釋然。

醫門法律曰：倪慶雲病膈氣十四日，粒米不入咽，始吐清水，次吐綠水，次吐黑水，次吐臭水，呼吸將絕。醫已歇手，余適診之，許以可救。渠家不信，余曰：『儘今一晝夜先服理中湯六劑，不令其絕，來早轉方，一劑全安。』渠家曰：『病已至此，滴水不能入喉，安能服藥六劑乎？』余曰：『但得此等甘溫入口，必喜而再服，不須過慮。』渠諸子或庠或弁，亦知理折衷，曰：『旣有妙方，何不卽投見效，必先與理中，然後迺用此何意也？』余曰：『金匱有云：病人噫氣不除者，旋覆代赭石湯主之。吾於此病，分別用之者有二道：一者以黑水爲胃底之水，臭水爲腸中之水，此水且出，則胃中之津液久已不存，不敢用半夏以燥其胃也。一者以將絕之氣，止存一系，以代赭墜之，恐其立斷，必先以理中分理陰陽，脾氣易於降下，然後代赭得以建奇奏績，一時之深心，卽同千古之已試，何必更疑。』及簡仲景方，見方中止用煨薑而不用乾薑，又謂：『乾薑比半夏更燥而不敢用。』余曰：『尊人所噫者，下焦之氣也，所嘔者，腸中之水也，陰乘陽位，加以日久不食，諸多蛔蟲必上居膈間，非乾薑之辣，則蛔蟲不下轉，而上氣亦必不下轉，妙處正在此，君曷可泥哉！』諸子私謂：『言有大而非誇者，此公頗似。姑進是藥，觀其驗否。』進後果再索藥，二劑後，病者能言，云：『內氣稍接。』但恐太急，俟天明再服，後且轉方爲妥。至次早，未及服藥，復請前醫參酌，衆醫交口極沮，渠家

予治。予曰：『藥不能入口，又將何法以治之乎？』懇求不已，遂制一方，用人參白朮茯苓各一錢，甘草二分，陳皮藿香砂仁各五分，炒神麴一錢，十年以上陳倉米一合，順流水二大白盞，煎沸，泡伏龍肝，研細攪渾，放澄清，取一盞，加薑棗同煎藥至七分，稍冷服此藥，遂納而不吐，別以陳倉米煎湯時時與之，日進前藥二三服，漸能食粥而安。後以此法治十餘人皆驗。

醫宗必讀曰：兵尊高元圃久患嘔吐，閱醫頗衆，病竟不減。余診之曰：『氣口大而軟，此穀氣少而藥氣多也。且多犯辛劑，可以治表實，不可以治中虛，可以理氣壅，不可以理氣弱。』投以熟半夏五錢，人參三錢，陳倉米一兩，白蜜五匙，甘爛水煎。服二劑，減十劑安。

屯院孫瀟湘夏月食瓜果過多，得食輒嘔，十日弗止，舉家驚惶，千里迎余。比至署中，已二十日矣。困頓牀褥，手足如冰。余曰：『兩尺按之有神，胃氣縷縷不絶，祗因中氣本弱，復為寒冷所傷耳。』遂用紅豆丸連進三服，至明日便能食粥。兼與理中湯加丁香沉香，旬日之間，飲食如常矣。

薛己醫按曰：府庠沈文姬母食濕麪吞酸，嘔吐絶食，服芩連等劑，加寒熱，口乾流涎；又食冬瓜一星，而嘔吐愈甚。余謂此脾氣虛寒也，急用鹽艾附子炒熱熨臍腹，又令其子口氣接其母氣，神氣少甦。以參朮附子陳皮為丸如粟米大，津嚥五七粒，次日加至十餘粒，漸服煎劑一二匙，乃思粥飲。又以參朮藥五十餘劑而愈。

譚侍御每頭痛必吐清水，不拘冬夏，吃薑便止。余作中氣虛寒，用六君當歸黃芪木香炮薑而瘥。

趙吏部文卿患吐不止，吐出皆酸味，氣口脈大於人迎二三倍，速予投劑。予曰：『此食鬱上，宜吐，不須用藥。』乃候其吐清水無酸氣，寸脈漸減，尺脈漸復，翌早吐止，至午脈俱平復，勿藥自安。

余母六十有五，己卯春二月，飲食後偶聞外言忤意，嘔吐酸水，內熱作渴，飲食不進，惟飲冷水，氣口脈大而無倫，面

用』呼噓呼吸有亡尙圖殍容構須乎攝理[illegible]

赭石一方，可收神功於百一。』進一劑而噦勢稍減，二劑加代赭至五錢，噦遂大減。連進粥，神清色亮，脈復體輕，再用參苓麥冬木瓜甘草平調，二日，遂康復如初。此蓋祖翁少時純樸不凋，故松柏之姿，老而彌勁，非盡藥之功能也。卽論藥亦非參之力，乃代赭墜參下行之力也。

景岳全書曰：凡胃寒者多爲嘔吐，而中寒毒者又必吐而兼瀉，余在燕都嘗治一吳參軍者，因見鮮蘑菇肥嫩可愛，令庖人貿而羹之，以致大吐大瀉，延彼鄉醫治之，咸謂速宜解毒，乃以黃連黑豆桔梗甘草枳實之屬，連進之，而病益甚；遂至胷腹大脹，氣喘，水飲皆不能受，危窘已甚，延救於余。投以人參白朮甘草乾薑附子茯苓之類，彼疑不敢用，曰『腹脹氣急口乾如此，安敢再服此藥？』乃停一日而病愈劇，若朝露矣。因而再懇，與藥如前，彼且疑且畏而決別於內閫曰：『必若如此，則活我者此也，殺我者亦此也。余之生死，在此一舉矣。』遂不得已含淚吞之。一劑而嘔少止，再劑而脹少殺，遂大加熟地黃以兼救其瀉亡之陰，前後凡二十餘劑，復元如故。彼因問曰：『余本中毒致病，鄉人以解毒而反劇，先生以不解毒而反愈者，何也？』余曰：『毒有不同，豈必如黃連甘桔之類乃可解耶？卽如蘑菇一物，必產於深坑枯井或沉寒極陰之處，乃有之，此其得陰氣之最盛，故肥白最嫩也。公中此陰寒之毒，而復解以黃連之寒，其謂之何？茲用薑附，非所以解寒毒乎？用人參熟地，非所以解毒補元氣乎？然則彼所謂解毒者，適所以助毒，余所謂不解毒者，正所以解毒也。理本甚明，而人弗能辨。凡諸病之誤治者，無非皆此類耳。』公頓首愀然嘆曰：『使非吾丈，吾幾爲含寃之魄矣。祈壽諸梓，以爲後人之鑑云。』

金宅少婦，宦門女也。素任性，每多胷脅痛及嘔吐等證，隨調隨愈，後於秋盡時，前證復作，而嘔吐更甚，病及兩日，甚至厥脫不省，如垂絕者，再後延予至，見數醫環視，僉云：『湯飲諸藥皆不能受，入口卽嘔，無策可施。』一醫云：『惟用獨參湯，庶幾可望其生耳。』余因診之，見其脈亂數甚，而且煩熱躁擾，莫堪名狀，意非陽明之火，何以急劇若此？

拌後三劑不肯服矣。余持前藥一盞，勉令服之，曰：『吾卽於衆醫前立地轉方，頃刻見效，再有何說！』乃用旋覆花一味，煎湯，調代赭石末二茶匙與之。纔一入口，病者曰：『好藥！吾氣已轉入丹田矣，但恐此藥難得。』余曰：『易耳。』病者十四日衣不解帶，目不交睫，憊甚，因圖脫衣安寢，冷氣一觸，復嘔，與前藥立止。思粥，令食半盞，渠饑甚，竟食二盞。少頃已食六盞，復嘔，與前藥立止。又因動怒，以物擊婢，復嘔，與前藥立止。已後不復嘔，但困憊之極，服補藥二十劑，丸藥一斤，將息二月，始能遠出。方悔從前少服理中二劑耳。

岵翁公祖，偶因飽食當風，忽然一吐，傾囊而出，胃氣大傷，隨召診問。體中微似發熱，左關之脈甚大，自云：『始先中脘不舒，今覺氣反攻左，始用梨汁不投，今用蔗漿稍定，不知此何證也？』昌因斷曰：『此虛風之候也。以胃中所受之水穀，出盡無留，空虛若谷，而風自內生，兼腸中久蓄之風，乘機上入，是以胃中不安。然風入於胃，必左投肝木，而從其類，是以氣反攻左，而左脈卽爲之大且勁。內經云：「風淫於內，治以甘寒。」梨汁蔗漿俱甘寒對證之物，而一效一不效者，又可知胃中氣虛已極，不耐梨性之達下，而喜蔗性之和中也。』於是以甘寒一派之藥定方，人參竹瀝麥門冬生地黃之屬，衆議除參不用，服後腹中呱呱有聲，嘔出黃痰少許，胷中遂快，次早大便亦通，證似向安，然有可怪者，本是胃經受病，而胃脈反不見其病，祇是上下兩旁，亦腎肝肺之脈，時時另起一頭，不安其常，因爲剖心爭論，謂：『此非上下兩旁之見病端也，乃中央氣弱不能四迄，如母病而四子失乳，故現饑餒之象耳。觀祖翁自云，口中之味極淡，又云水到喉管卽汪汪不肯下行，明明是胃中之氣不轉，宿水擋住喉間，不能更吞新水耳。宜急用四君子湯，以理胃氣，則中央之樞軸轉，而四畔之機關盡利，喉管之水氣不逆，而口中之淡味亦除矣。如不見信，速請明者商之，不便在此羈時悞事也。』然而言過激烈，反怪爲故意驚駭，改召二醫，有謂中風者，有謂傷寒者，見各不同，至於人參之可用，則同聲和之，謂證之輕而易療，則同力擔之。微用發表之藥，卽汗出沾濡，又同口讚之，曾不[illegible]矣。再[illegible]幸而投黃連一劑，將絕之系，加極苦

# 醫部彙考二百五十二

## 泄瀉門一

### 黃帝素問

㈠四氣調神大論

秋三月，此爲容平，天氣以急，地氣以明，早臥早起，與雞俱興，使志安甯，以緩秋刑，收斂神氣，使秋氣平，無外其志，使肺氣清，此秋氣之應，養收之道也。逆之則傷肺，冬爲飧泄，奉藏者少。

註 肺屬金，王於秋，逆秋收之氣則傷肺，肺傷至冬爲飧泄之病，因奉藏者少故也。蓋秋收而後冬藏，陽藏於陰而爲中焦釜底之然，以腐化水穀，秋失其收，則奉藏者少，至冬寒水用事，陽氣下虛，則水穀不化而爲飧泄矣。

㈡生氣通天論

凡陰陽之要，陽密乃固，兩者不和，若春無秋，若冬無夏，因而和之，是爲聖度。故陽強不能密，陰氣乃絕，陰平陽祕，精神乃治，陰陽離決，精氣乃絕。因於露風，乃生寒熱，是以春傷於風，邪氣留連，乃爲洞泄。

註 傷於風者，上先受之，傷於濕者，下先受之。陽病者，上行極而下，是以春傷於風，乃爲洞泄。

㈢金匱眞言論

乃問其欲冷水否?彼卽點首,遂與以半鍾,惟此不吐,且猶有不足之狀。乃復與一鍾,稍覺安靜。余因以太淸飲投之,而猶有謂『此非傷寒,又値秋盡,豈堪此乎?』余不與辨,及藥下咽,卽甘睡半日,不復嘔矣。然後以滋陰輕淸等藥調理而愈。大都嘔吐多屬胃寒,而復有火證,若此者,經曰『諸逆衝上,皆屬於火』卽此是也。自後凡見嘔吐,其有聲勢湧猛,脈見洪數,證多煩熱者,皆以此法愈之。

胡宅小兒,年甫三歲,偶因飲食不調,延幼科診治,所用之藥,無非淸火化滯等劑,因而更損胃氣,反致嘔吐溏泄,復加淸利,遂致吐蚘,初止數條,漸至數十條,細如燈草,甚至成團攪結而出,早晚不絕,所下者亦如之,羸困至極,求治於余。因與溫胃飲二三劑,其蟲朝夕不止,其多如故,初不識其何所從來,而神化之速,一至如此。乃翁切懇曰:『止此一兒,生死在公矣!萬望先逐此蟲;蟲不盡則病日甚,其能生乎?』予弗之聽,但以前藥倍加人參,仍加附子二三劑,而嘔吐漸稀,瀉亦隨止。瀉止後,乃以理陰煎溫胃飲,出入間用,十餘日而蟲漸少,一月餘而飲食進,肌肉生,復元如故矣。其翁積誠稱謝,因問曰:『小豚之病,誠然危矣,今何以不治蟲,不治嘔泄,而三者俱愈,可聞教乎?』予曰:『公之所畏者,蟲也。予之所畏者,胃氣也。且凡逐蟲之藥,無有不傷胃氣者。向使胃氣再傷,非惟不能逐蟲,而命必隨之矣,其害孰甚!故保全之權,在知本末,但使脾胃日強,則拔去化蟲之源,而三病同歸一得矣,尙何蟲瀉之敢橫哉!』

王宅少婦,年未二旬,素喜瓜果生冷,因常病心腹疼痛,每發必數日不食,後及二旬之外,則每發必至吐蚘,初吐尙少,自後日甚日多,每吐必一二十條,每發必旬日不食,所經諸醫,但知攻蟲,旋去旋生,百藥不效。予爲診視脈證,并察病因,知其傷於生冷,以致脾胃虛寒,陰濕氣聚,故爲此證,使不溫養脾胃,以杜寒濕化生之源,而但事攻蟲,蟲去復生,終無濟也。因製溫臟丸與之,藥未完而病隨愈矣。後因病愈而少年任意,仍躭生果,舊病復作,再製丸服,乃得愈。觀此二證,如前之小兒,乃因凉藥傷脾,所以生蟲,後之女人,乃因生果傷胃,所以生蟲。可見陰濕內淫,而脾胃虛

㈥平人氣象論

尺寒脈細，謂之後泄。

註夫陽氣生於陰中，尺膚寒生陽之氣少矣。陽氣衰於下，故主虛泄，泄則亡陰，故脈細也。

泄而脫血脈實者，皆難治。命曰反四時也。

註泄脫之病，氣應虛散而脈反實，此脈證之不相應，正氣亂也，故難治。

㈦玉機眞臟論

脈細，皮寒，氣少，泄利前後，飲食不入，此謂五虛，漿粥入胃，泄注止，則虛者活。

註脈細，心氣虛也。皮寒，肺氣虛也。肝主春生之氣，氣少，肝氣虛也。泄利前後，腎氣虛也。飲食不入，脾氣虛也。蓋邪之所湊，其正必虛，是以邪氣盛者死，正氣虛者亦死也。五臟之氣，皆由胃氣之所資生，漿粥入胃，泄注止，胃氣復也。

㈧太陰陽明篇

食飲不節，起居不時，則陰受之。陰受之則入五臟，入五臟則䐜滿閉塞，下爲飧泄，久爲腸澼。

註入五臟，謂太陰爲之行氣於三陰，太陰病則五臟之氣皆爲之病矣。脾氣逆則䐜滿，太陰爲開，開折則倉廩無所輸而爲飧泄，久則爲腸澼矣。

㈨欬論

人與天地相參，故五臟各以治時感於寒，則受病，微則爲欬，甚則爲泄爲痛。

註五臟之氣，與四時五行之氣相合，故五臟各以所主治之時而感於寒則受病，微則上乘於肺而爲欬，甚則上行極而下爲泄痛矣。

長夏善病洞泄寒中。

註　夏時陽氣在外，裏氣虛寒，長夏濕土主氣，風入於經俞，卽內薄而爲洞泄，風木乘虛而勝土也。脾爲陰中之至陰，不能化熱而爲寒中也。

故冬不按蹻，長夏不病洞泄寒中，飧泄而汗出也。

註　按蹻者，按摩導引，引陽氣之通暢於四支也。冬時陽氣伏藏，若導引其四出，則無以奉春生夏長之氣，是以有洞泄寒中之病。人能藏養元眞之氣，必不使邪傷經脈，病在內而爲飧泄也。亦不使邪傷陽氣，病在外而汗出也。

### ㊃陰陽應象大論

寒氣生濁，熱氣生清，清氣在下則生飧泄，濁氣在上則生䐜脹，此陰陽反作，病之從逆也。

註　寒氣下凝，故生濁陰，熱氣上散，故生清陽。如清氣在下，是上而下降，故飧泄。濁氣在上，是下而上凝，故䐜脹。此身中陰陽反作，氣之逆從爲病也。

濕勝則濡瀉。

註　濕淫所勝，則脾土受傷，而爲濡瀉之病。

故重陰必陽，重陽必陰，春傷於風，夏生飧泄。

註　春傷風而夏傷暑，謂之重陽。春傷風而飧泄，乃重陽而變陰病也。

### ㊄脈要精微論

胃脈實則脹，虛則泄。

註　經曰：『脾氣實則腹脹，不足則爲溏泄，』蓋脾與胃以膜相連耳。胃爲陽，脾爲陰，陰陽病者上行極而下，是以脈見於胃而病見於脾也。

註腎者胃之關，關門不利，則聚水而爲腹脹飧泄。

一陽發病，少氣善欬善泄。　㈥陰陽別論

註一陽者少陽之氣病也。少陽主初生之氣，病則生氣少矣。足少陽相火主氣，氣少則火壯矣。火鑠金故善欬，木火之邪賊傷中，故土善泄也。

久風入中，則爲腸風飧泄。　㈦風論

註風邪久在肌腠，而入於中，則脾胃之氣受傷，而爲腸風飧泄。

胃風之狀，頸多汗，惡風食飲不下，鬲塞不通，腹善滿，失衣則䐜脹，食寒則泄，診形瘦而腹大。

註頸有風池風府，乃經脈之要會，故頸多汗，胃腑受邪，故飲食不下，鬲塞不通，腹善滿也。胃氣不足，則身以前皆寒，腹脹滿，是以形寒則䐜脹，飲冷則泄者，胃氣虛傷也。胃者肉其應，腹者胃之郛，故主形瘦而腹大。

少陰厥逆，虛滿嘔變，下泄清，治主病者。　㈧厥論

註少陰之氣，上與陽明相合而主化水穀，少陰氣厥，以致中焦虛滿，而變爲嘔逆。上下水火之氣不交，故下泄清冷也。

脾熱病者，熱爭則腰痛不可用俛仰，腹滿泄。　㈨刺熱論

註經云：陽病者，腰反折不能俛，陰病者不能仰，故腰痛不可用俛仰。腹者脾土之郛郭，故腹滿泄。

㈠舉痛論

寒氣客於小腸，小腸不得成聚，故後洩腹痛矣。

註寒氣客於小腸之間，轉入於腸內，故不成積聚而爲後洩腹痛也。

怒則氣逆，甚則嘔血及飧泄。

註肝主怒而藏血，怒則肝氣上逆，故甚則嘔血，木氣乘脾，故爲飧泄。

㈡痹論

腸痹者，數飲而出不得，中氣喘爭，時發飧泄。

註腸痹者，兼大小腸而言。小腸爲心之腑，而主小便，邪痹於小腸，則火熱鬱於上而爲數飲，下爲小便不得出也。大腸爲肺之腑，而主大便，邪痹於大腸，故上則爲中氣喘爭，而下爲飧泄也。

㈢標本病傳論

先病而後泄者，治其本。先泄而後生他病者，治其本。必且調之，乃治其他病。

註泄乃濕土之病，他病如濕邪所勝，民病心痛耳聾之類，故當先治其虛泄，以調脾土，而後治他病。

㈢臟氣法時論

脾病者，虛則腹滿腸鳴，飧泄食不化。

註脾主通會五臟元眞之氣，脾氣傷則不能化水穀，而有飧泄之病。

㈣宣明五氣論

五氣所病，大腸小腸爲泄。

註大腸小腸受盛水穀，變化糟粕，病則不能化物而爲泄矣。

註陽明司天卯酉歲也腹中鳴注泄鶩溏寒淸於中也。

厥陰司天，風淫所勝，民病冷泄腹脹，溏泄瘕水閉。

註厥陰司天，巳亥歲也。冷泄諸證，皆脾經之病，

太陰之勝，濕氣內鬱，善注泄，太陰之復，則濕變乃舉，甚則入腎，竅瀉無度。

註濕氣內鬱而迫於下，故注泄。復者謂受所勝之氣勝制，鬱極而復發，甚則入腎，下乘冬令之寒水也。腎開竅於二陰，故曰竅瀉。

厥陰之勝，腸鳴飧泄，少腹痛，注下赤白。

註腸鳴飧泄諸證，風氣淫於下也。

少陰之勝，腹滿痛溏泄，傳爲赤沃。

註腹滿溏泄，陰寒在下也。傳爲赤沃，君火下淫也。

陽明之勝，淸發於中，左胠脅痛溏泄。陽明之復，則淸氣大舉，甚則心痛否滿，腹脹而泄。

註金氣寒肅，故淸發於中，金勝則木虧，故脅痛下爲溏泄也。心痛否滿腹脹而泄者，乘火土也。陽明之復，發於本位主令之時，是以淸氣大舉，心痛否滿腹脹而泄，乘火土也。

諸厥固泄，皆屬於下。

註從上而下也。蓋在上之陽氣，下逆則爲厥冷，在上之水液，下行則爲固泄，亦猶天地陰陽之氣，上下相乘，而水隨氣之上下也。

諸嘔吐酸，暴注下迫，皆屬於熱。

註暴注者，瀉水痛一陣，瀉一陣，張機謂之協熱自利，熱者君火之氣也。

土不及曰卑監，⑩五常政大論
卑監之紀，是謂減化，其病飧泄，邪傷脾也。
註 土運不及，則化氣迺減，木反勝之，是以脾氣傷而病飧泄也。

㈡氣交變大論
歲土太過，臟氣伏，化氣獨治之，病腹滿溏泄腸鳴。
註 臟氣，水氣，化氣，土氣也。歲土太過則制水，是以臟氣伏，腹滿溏泄腸鳴，脾土之虛證也。
歲水太過，濕氣變物，病反腹滿腸鳴溏泄，食不化。
註 歲水太過，諸丙歲也。民病腹滿腸鳴溏泄食不化者，皆水泛土敗之證也。
歲木太過，風氣流行，脾土受邪，民病飧泄。
註 諸壬之歲，木運太過，則制勝其土氣，故民應之而爲脾病也。飧泄，脾土之病。
歲水不及，濕乃大行，民病濡泄。
註 六癸之歲，水運不及，土乃勝之，故濕氣大行。濕土太過，傷及腎陰，故爲濡瀉之病。
歲木不及，燥乃大行，民病中清腸鳴溏泄。
註 肝氣虛逆而更兼中清，故腸鳴溏泄也。
歲火不及，寒乃大行，病鶩溏寒中，腸鳴泄注。
註 六癸之歲，火運不及，水反勝之，故寒乃大行。鶩溏諸病，皆寒濕之證也。
歲土不及，風迺大行，民病飧泄。
註 六己之歲，土運不及，木反勝之，故風乃大行。風木傷土，民則有飧泄之病。

### ㈠邪氣臟腑病形篇

肺脈小甚爲泄。

註小則氣血皆虛而爲泄，肺與大腸爲表裏也，

腎脈小甚爲洞泄。

註腎氣虛也。

### ㈡經脈篇

脾足太陰之脈，是主脾，所生病者，溏瘕泄。

註脾家實則爲瘕泄。

肝足厥陰之脈，是主肝，所生病者，胷滿嘔逆飧泄。

註食氣入胃，散精於肝，行氣於經，肝所生病，則肝氣厥逆，不能行散穀精，故胷滿嘔逆也。肝主疎泄，肝氣虛則飧泄。

### ㈢師傳篇

腸中熱則出黃如糜，臍以下皮寒。腸中寒則腸鳴飧泄。

註寒熱外內之相應也。

### ㈣論疾診尺篇

大便赤辦，飧泄脈小者，手足寒，難已。飧泄脈小，手足溫，泄易已。

註大便赤辦，謂黃赤相間，乃中焦之血與糟粕幷下也。飧泄乃大腸虛而不能濟泌，此腸胃虛泄於下，中焦之汁，

太陽之勝，凝溧且至，寒入下焦，傳爲濡瀉。

註太陽寒水氣勝，故凝溧且至。寒入下焦者，太陽標陽而本寒，是以陽熱上行而陰寒下行也。

太陰在泉，客勝則便溲不時，濕客下焦，發而濡泄。

註便溲不時者，在泉之濕氣，客於太陰之經而下及於內也。濕客下焦，發而濡瀉，因客淫於下，而太陰之主氣自病也。

陽明在泉，主勝則下爲鶩溏。

註下爲鶩溏者，水下泄也。

㊂六元正紀大論

太陽司天之政，氣化運行先天，寒濕之氣，持於氣交，民病寒濕，發濡瀉血溢。

註寒濕之氣，持於氣交者，上下交互也。民病濡瀉，乃寒濕之氣發也。

三之氣，天政布，寒氣行，雨乃降，民病注下。

註司天寒水之氣，加臨於三氣，故其時天政乃布，而寒氣行，雨乃降，注下，火鬱病也。

少陽司天之政，氣化運行先天，民病寒中，外發瘡瘍，內爲泄滿。

註風熱之氣在外，則寒濕之氣在內，是以外發瘡瘍，內爲寒中泄滿。

少陽所至爲暴注，太陽所至爲流泄禁止。

註此冬病之常也。

火鬱之發，民病注下。

註火熱盛而清血瀉也。

泄凡有幾，皆有名不？然：泄凡有五，其名不同，有胃泄，有脾泄，有大腸泄，

註此五泄之目，下文詳之。

胃泄者，飲食不化，色黃。

脾泄者，腹脹滿泄注，食卽嘔吐逆。

大腸泄者，食已窘迫，大便色白，腸鳴切痛。

小腸泄者，溲而便膿血，少腹痛。

大瘕泄者，裏急後重，數至圊而不能，便莖中痛，此五泄之要法也。

㈡死候

病若腹大而泄者，脈當微細而濇，反緊大而滑者，死。

## 漢張機金匱要略

㈠下利病脈證治

夫六腑氣絕於外者，手足寒，上氣脚縮，五臟氣絕於內者，利不禁，下甚者，手足不仁。

下利脈沉弦者，下重也。脈大者，爲未止，脈微弱數者，爲欲自止，雖發熱不死。

下利手足厥冷，無脈者，灸之不溫，若脈不還，反微喘者，死。少陰負趺陽者，爲順也。

下利有微熱而渴，脈弱者，今自愈。

下利脈數，有微熱，汗出，今自愈。設脈緊，爲未解。

下利脈數而渴者，今自愈。設不差，必淸膿血，以有熱故也。

不能榮於脈中，故脈小。若手足溫者，得下焦之生氣，故泄易已。

尺膚寒，其脈小者，泄，少氣。

註 氣者，所以溫膚熱肉，從陰而生，自內而外，故知其泄於內而虛於外也。

### ㈤脹論

大腸脹者，腸鳴而痛濯濯，冬日重感於寒，則飧泄不化。

註 此衛氣逆於城郭之中而爲病也。

### ㈥玉版篇

腹鳴而滿，四肢清泄，其脈大，逆也。

註 腹鳴而滿，四肢清泄，其脈大者，逆傷於腎也。

其腹大脹，四末清，形脫，泄甚，逆也。欬嘔腹脹，且飧泄，其脈絕，逆也。如是者，不過一時而死矣。

註 夫皮膚分肉之氣血，從胃腑而注於臟腑之大絡，從大絡而出於孫絡，從孫絡而外滲於皮膚，如腹大脹，四肢清，形脫泄甚，是逆於胃之大絡，不得出於皮膚，充於四體也。欬嘔腹脹且飧泄，其脈絕，逆於肝脾之絡也。夫胃者，水穀血氣之海也，如逆而不行，則開闔已息，是以不過一周而死矣。

大泄之後，奪也，不可瀉。

註 形肉血氣已虛脫者，雖有實邪，皆不可瀉。

病泄脈洪大，逆也

註 病泄者，脈宜沉弱，反洪大者，陰泄於下，陽盛於上，陰陽上下之相離也。

(二)因食致瀉

疫死牛肉，食之令人洞下，亦致堅積，宜利藥下之。

(三)鶩溏

脈沉小遲，名脫氣，其人疾行則喘喝，手足逆寒，腹滿甚則溏泄，食不消化也。

熱在上焦者，因欬爲肺痿。熱在中焦者，則爲堅。熱在下焦者，則尿血，亦令淋祕不通。大腸有寒者，多鶩溏，有熱者，便腸垢。小腸有寒者，其人下重便血，有熱者必痔。

肺水者，其身腫，小便難，時時鴨溏。

師曰：寸口脈沉而遲，沉則爲水，遲則爲寒。寒水相搏，趺陽脈伏，水穀不化，脾氣衰則鶩溏，胃氣衰則身腫。少陽脈卑，少陰脈細，男子則小便不利，婦人則經水不通。經爲血，血不利則爲水，名曰血分。

黃家日晡所發熱，而反惡寒，此爲女勞得之，膀胱急，少腹滿，身盡黃，額上黑，足下熱，因作黑疸，其腹脹如水狀，大便必黑，時溏，此女勞之病，非水也。腹滿者難治，消石礬石散主之。

## 華佗中藏經

(一)利屬臟腑虛實寒熱

病熱人四肢厥，脈弱，不欲見人，食不入，利下不止者，死。食入，四肢溫，脈大，語狂，無睡者，生。

小腸實則傷熱，熱則口瘡。虛則傷寒，寒則泄膿血，或泄黑水，其根在小腸。虛則左寸口脈浮而微軟弱，不禁按，病驚狂無所守，下空空然，不能語者，是也。

脾脈不及則令人中滿，不食乏力，手足緩弱不遂，涎引口中，四肢腫脹，溏泄不時，夢中飲食，寒則吐涎沫而不食，四

下利脈反弦，發熱身汗者，自愈。

下利氣者，當利其小便。

下利寸脈反浮數，尺中自濇者，必清膿血。

下利清穀不可攻其表，汗出必脹滿。

下利脈沉而遲，其人面少赤，身有微熱，下利清穀者，必鬱冒汗出而解，病人必微厥。所以然者，其面戴陽，下虛故也。

下利後脈絕，手足厥冷，晬時脈還手足溫者生，脈不還者死。

下利腹脹滿，身體疼痛者，先溫其裏，乃攻其表。溫裏宜四逆湯，攻表宜桂枝湯。

下利三部脈皆沉，按之心下堅者，急下之，宜大承氣湯。

下利脈遲而滑者，實也，利未欲止，急下之，宜大承氣湯。

下利脈反滑者，當有所去，下乃愈，宜大承氣湯。

下利已差，至其年月日時復發者，以病不盡故也。當下之，宜大承氣湯。

下利讝語者，有燥屎也，小承氣湯主之。

下利便膿血者，桃花湯主之。

熱利下重者，白頭翁湯主之。

下利後更煩，按之心下濡者，爲虛煩也，梔子豉湯主之。

下利清穀，裏寒外熱，汗出而厥者，通脈四逆湯主之。

下利，肺痛，紫參湯主之。

氣利，訶黎勒散主之。

右手關上脈陰陽俱虛者，足太陰與陽明經俱虛也。[illegible]

右手尺中神門以後脈陰陽俱虛者，足少陰與太陽經俱虛也。病苦心痛，若下重不自收，篡反出，時時苦洞泄，寒中泄，腎心俱痛。

關脈伏，中焦有水氣，溏泄，宜服水銀圓，鍼關元，利小便，溏泄便止。

關上脈滑而大小不勻，是爲病方欲進，不出一二日復欲發動，其人欲多飲，飲即注利，如利止者生，不止者死。

尺脈細微，溏泄，下冷利。

脈實緊，胃中有寒，苦不能食，時時利者，難治。

病人大腸絕不治。何以知之？泄利無度，利絕則死。

溫病八九日，頭不疼，身不痛，目不赤，色不變而反利，脈來牒牒，按之不彈手，時大，心下堅，十七日死。

洞泄，食不化，不得留，下膿血，脈微小遲者生，緊急者死。

泄注，脈緩，時小結者生，浮大數者死。

中央直前者，手少陰也。動苦心痛微堅，腹脅急，實堅者爲感忤，純虛者爲下利腸鳴。

關上伏，有水氣泄溏。

尺中滑，下利少氣。

## 脈訣

㊀瀉利之脈

診脈入式，歌曰：陽數即吐兼頭痛，陰微即瀉臍中吼。陽微浮弱定心寒，陰滑食注脾家咎。

肢痛，滑泄不已，手足厥，甚則顫慄如瘧也。胃者，腑也，虛則腸鳴脹滿，引出滑泄，胃中風則溏泄不已。

肺絕則十三日死，其病足滿瀉利不覺出也，面白目青，此謂經亂也，此雖天命亦不足治。

肺病久則傳入大腸手陽明是其經也。寒則泄，熱則結，絕則利下不止而死。虛寒則滑泄不定，又積冷，脾痛不能久立，痛已則泄何物。

腎脈緩甚則折脊，微緩則洞泄，食不化，入咽還出，小甚則洞泄，微小則消癉，脈來沉而大，堅浮而緊，手足腫，厥陰痿，腰背疼，小腸心下有水氣，時脹滿洞泄。

膀胱者，津液之腑也，寒則精神不守，泄利不止，語聲不出也。

中焦寒則下利不止，食飲不消中滿。

㈡死候

病嗽而嘔，便滑不禁，脈弦，弦欲絕者死。

病洞泄，不下食，脈急者死。

病泄注，脈浮大而滑者，死。

脾絕，口冷足腫脹，泄不覺者，十二日死。

## 晉王叔和脈經

㈠泄利之脈

左手寸口人迎以前脈，陰陽俱虛者，手少陰與太陽經俱虛也。病苦洞泄，苦寒少氣，四肢寒，腸澼。

連阿膠散，雖然自利而渴屬少陰，然三陰下利亦不能[illegible]，口乾燥者，却宜下之。此又不可不知也。少陰泄利下重，不可投熱藥，先濃煎薤白湯，內四逆散。緣四逆散用枳實芍藥之類。又尋常胃中不和，腹中腸鳴下利，生薑瀉心湯最妙。此二法不特傷寒證也。

## 金劉完素六書

### ㈠泄瀉

太陰脾經受濕，水泄注下，體微重微滿，困弱無力，不欲飲食，暴泄無數，水穀不化，先宜白朮芍藥湯和之。身重暴下，是大勢來，亦宜和之。

厥陰動爲瀉利者，寸脈沉而遲，手足厥，下部脈不至，咽喉不利，或涕唾膿血，瀉利不止者，爲難治，宜升麻湯或小續命湯以發之。法曰：謂表邪縮於內，故下利不止，當散表邪於四肢，布於脈絡，外無其邪，則臟腑自安矣。

太陽爲協熱利，涼膈散主之。

陽明爲痼瘕，進退大承氣湯主之。

少陽風氣自動，其脈弦，大柴胡湯主之。

太陰濕勝濡瀉，不可利，而可溫，四逆湯主之。

少陰蟄封不動，禁固可澀，赤石脂丸乾薑湯主之。

厥陰風泄，以風治風，小續命湯消風散主之。

四時以胃氣爲本，久下血痢，則脾虛損，而血不流於四肢，入於胃中爲血，宜滋養脾胃則愈。

夫五瀉之病，其治法各不同者，外證各異也。

脾臟歌曰：濕多成五泄，腸走若雷奔。

雜病生死歌曰：下利微小却爲生，脈大浮洪無差日。外實內熱吐相連，下清注穀轉難安。忽然診得脈洪大，莫費神功定不痊。

脾臟察色歌曰：臍趺腫滿面浮黃，泄利不覺汚衣裳。肌肉粗澀兼脣反，一日十二內災殃。

## 宋朱肱活人書

㊀傷寒下利

傷寒下利多種，須辨識陰陽，勿令差互。三陽下利則身熱，太陰下利手足溫，少陰厥陰下利身不熱，以此別之。大抵下利，挾太陽脈證，便不得用溫藥，俗醫但見下利，便作陰證，用溫熱藥，鮮不發黃生斑而死也。太陽陽明合病，必下利，葛根湯主之。下利而頭疼腰痛，肌熱目疼，鼻乾，其脈浮大而長者，是其證也。太陽少陽合病，自下利，黃芩湯主之。若嘔者，黃芩湯加半夏生薑也。下利而頭疼胷滿，或口苦咽乾，或往來寒熱而嘔，其脈浮大而弦者，是其證也。陽明少陽合病必下利，其脈不負者順也，負者失也。互相剋賊，名爲負也。下利而身熱胷脅痛滿，乾嘔，或往來寒熱，其脈長大而弦者，是其證也。蓋陽明者土，其脈長大，少陽者木，其脈弦，若合病，土被木賊，更下利，爲胃已困。若脈不弦者順也，爲土不負，負者死。自利不渴屬太陰，四逆湯理中湯主之自利而渴屬少陰，白通湯，白通加猪膽湯，通脈四逆湯，猪苓湯，眞武湯，四逆加人參湯，可檢證而用之。其餘下利，皆因汗下後證也。大抵傷寒下利，須看脈與外證，下利而脈大者，虛也；脈微弱者，爲自止；下利日十餘行，脈反實者，逆；下利脈數而滑者，有宿食也，下之愈；脈遲而滑者實也，其利未得便止；更宜下之；下利三部脈皆平，按其心下硬者，急下之；協熱利者，臍下必熱，大便赤黃色，及腸間津汁垢膩，謂之腸垢；寒毒入胃，則臍下必寒，腹脹滿大便或黃白，或青黑；或下利清穀，濕毒氣盛，則下利腹痛，大便如

難是也

泄有虛實寒熱，虛則無力黏衣，不便已泄出，謂不能禁固也。實則數至圊而不能便，俗云虛坐努責是也。裏急後重，皆依前法進退，大承氣湯主之。素問云『春傷於風，夏必飧泄。』又云『久風爲飧泄者』，乃水穀不化而完出爾，非水入胃而成此證，非前水恣也。此一證不飲水而穀完出，名曰飧泄。治法於後，先以宣風散導之，出錢氏方中四味者是也。後服蒼朮防風湯。

五泄傷寒，乃分三節，初說暴，次說中，後說久，此說在難經二十二難，是三節內包十五法，初以暴藥，中以的對證藥，候疾得中也。末治久泄法，仲景論厥陰經治法是也。

治久泄法，先進縮脾煎小續命湯，是發其汗，使邪氣不能以外侵於內，然後治其利，秋冬間下利風吐論中，加減厚朴丸大效。

㊂自利幷悞下

自利者，不經下藥攻裏而自利也。脈浮表不解，自利或小便不利者，五苓散。一切瀉利間作，桂苓甘露飲。溫濕內甚而作利者，黃連解毒湯。或自利淸水，色純靑，心下痞痛，口燥者，皆濕熱相搏於腸胃之內而成，下利者三一承氣湯，當汗而反下，及不成結胷而但下利，淸穀不化，表證在表，熱裏寒也，急以四逆湯溫裏，利止裏和，急以桂枝解表，或用巴豆熱藥下之，而協熱利不止，皆宜五苓散止利兼解表。

暴注者，注泄也，乃腸胃熱而傳化失常，經所謂淸氣在下，則生飧泄，下迫者，後重裏急，窘迫急痛也。火性急速而能造物，俗云虛坐努責而痛。

瀉白爲寒，靑黃紅赤黑皆爲熱也。蓋瀉白者，肺之色，由寒水甚而制火，不能平金，則金肺自甚，故色白如濁水凝冰，則自然淸瑩而白也。靑者，肝木之色，由火甚制金，不能平木，則肝木自甚，故色靑。或言利色靑爲寒者，誤也。仲景法

胃泄者，飲食不化，多黃，承氣湯下。

脾泄者，腹脹滿注，下食即嘔吐逆，建中及理中湯。

大腸泄者，食已窘迫，大便色白，腸鳴切痛，乾薑及附子湯。

小腸泄者，溲便膿血，少腹痛，承氣湯。

大瘕泄者，裏急後重，數至圊而不能便，足少陰也。莖中痛，急利小便，此五泄之病也。

傷寒表熱未入於裏，悞以寒藥下之太早，其表熱卒未入，因而裏寒下利不止，或表熱裏寒自利不止者，急以四逆湯溫裏。脈浮不渴，小便清白不溫，完穀不化是也。或辨便溺之色者，須更審其飲食之色，或下後協熱利不止者，則喉乾煩渴，此又不宜溫，宜五苓散之類，散其濕熱也。惟裏寒者可以溫之，止其寒瀉利止。裏和表邪尚在者，急以桂枝湯解其表。

清氣在下則生飧泄，清濁交錯，食不化而清穀出矣，白朮湯主之。

腸痹證雖多飲不得溲，不成大便，使糟粕不化，故氣喘急而飧泄，木香丸主之。

胃寒主收，水穀不化，泄瀉寒之氣在上，熱之氣在下，故脹而泄，妙應丸主之。

內經云：『濕勝則濡。』甲乙經云：『寒客生濡。』胃瀉如隨氣而下利，豆蔻散主之。

脾虛風冷，陰盛糟粕不化，大便黃黑如鶩溏，此大腸有寒也，吳茱萸丸主之。

㈡寒熱水泄例

泄者一也，總包五法，謂之六義，曰六解，難經有傷寒五泄，叔和云：『濕多成五泄』，仲景解四經泄利，有不可汗，不可下者，有可吐可灸者，仲景隨經自言之，假令渴引飲者，是熱在膈上，水多入則下鬲，入胃中，胃經本無熱，不勝其水，名曰水恣，故使水穀一時下，此證當灸大椎三五壯，立已，乃瀉督脈也。如用藥乃使車前子、糯丸，白朮茯苓之類，

乃若世[illegible]
大毒之藥，必是善藥不能取效，不得已而用之可也。幸有善藥，雖不能取效，但有益而無損者，何必用大毒之藥而謾勞蠛蠓也。經曰『甯小與其大，甯善與其毒』此之謂也。

## 成無已明理論

㊀自利

傷寒自利，何以明之？自利者，有不經攻下，自然溏泄者，謂之自利也。傷寒自利多種，須知冷熱虛實，消息，投湯無致失差。雜病自利，多責爲寒，傷寒下利，多由協熱，其與雜病有以異也。表邪傳裏，裏虛協熱，則利不應下，而便攻之，內虛協熱，遂利，是皆協熱也。又合病家皆作自利，太陽與陽明合病，必自下利，葛根湯主之。太陽與少陽合病，必自下利，黃芩湯主之。陽明與少陽合病，必自下利，大承氣湯主之。三者皆合病下利，一者發表，一者攻裏，一者和解，所以不同者，蓋六經以太陽陽明爲表，少陽太陰爲在半表半裏，少陰厥陰爲在裏。太陽陽明合病爲在表者也，雖曰下利，必發散經中邪氣而後已，故與葛根湯以汗之。太陽與少陽合病，爲在半表半裏者也，雖曰下利，必和解表裏之邪而後已，故與黃芩湯以散之。陽明少陰合病，爲少陽邪氣入腑者也，雖曰下利，必逐去胃中之實而後已，故與承氣湯以下之。是三者所以有異也。下利家何以明其寒熱耶？且自利不渴，屬太陰，以其臟寒故也。下利欲飲水者，以有熱也。故大便溏，小便自可者，此爲有熱。自利小便色白者，少陰病形悉具，此爲有寒。惡寒脈微，自利清穀，此爲有寒。發熱後重，泄色黃赤，此爲有熱，皆可理其寒熱也。凡腹中痛，轉氣下趨少腹者，此欲自利也。自利家身涼脈小爲順，身熱脈大爲逆。少陰病脈緊，下利，脈暴微，手足反溫，脈緊反去者，此爲欲解。下利脈大者爲未止，脈微弱數者爲欲自止，雖發熱不死。是知下利脈大爲逆，而脈小爲順也。自利宜若可溫，理中、白通、諸四逆輩，皆溫臟止利之劑。又

曰：少陰病下利清水，色純青者，熱在裏也，大承氣湯下之。及夫小兒熱甚，急驚，利色多青，爲熱明矣。利色黃者，由火甚，則水必衰，而脾土自旺，故色黃也。利色紅爲熱者，心火之色；或赤者，熱深甚也。至若利色黑，亦言爲熱者，由火熱過極，則反兼水化制之，故色黑。如傷寒陽明病，熱極則日晡潮熱，甚則不識人，循衣摸牀，獨語如見鬼狀，法當大承氣湯下之。大便不黑者易治，黑者難治，諸利同法。然辨色以明寒熱者，更當審其飲食藥物之色。如小兒病熱，吐利霍亂，其乳未及消化而利，尙白者，不可便言爲寒，當以脈證別之。大法瀉利，小便清白不澀爲寒；赤色者爲熱；又完穀不化而色不變，吐利腥穢，澄澈清冷，小便清白不澀，身涼不渴，脈遲細而微者，寒證也。穀雖不化，而色變非白，煩渴，小便赤黃而或澀者，熱證也。凡穀消化者，無問色及他證，便爲熱也。未有寒泄而穀消化者，由寒則不能消化穀也。或火主疾速而熱甚，則傳化失常，穀不能化而飧泄者，亦有之。仲景曰：『邪熱不殺穀，然熱得濕則飧泄。』或言下利白爲寒，誤也。若果爲寒，則不能消穀，何由反化爲膿也？所謂下利，穀反爲膿血，如世之穀肉果菜，濕熱甚則自然腐爛潰發，化爲濁水，故食於腹中，感人濕熱邪氣，則自然潰發，化爲膿血也。其熱爲赤，屬心火，其濕爲黃，屬脾土，燥鬱爲白，屬肺金也。經曰：『諸氣膹鬱，皆屬於肺，』謂燥金之化。王冰曰：『鬱而奔迫，金氣之爲用也。』然諸瀉利皆兼於濕，今反言氣燥者，謂濕熱甚於腸胃之內，而腸胃怫熱鬱結，而又濕主乎痞，以致氣液不得宣通，因以成腸胃之燥，使煩渴不止也。假如下利赤白，俗言寒熱相兼，其說猶誤，豈知水火陰陽寒熱者，猶權衡也，一高則必一下，一盛則必一衰，豈能寒熱俱甚於腸胃而同爲利乎？如熱生瘡瘍而出白膿者，豈可以白爲寒？與由其在皮膚之分屬肺金，故色白，在血脈之分屬心火，故爲血癤，在肌肉屬脾土，故作黃膿，在筋部屬肝木，故其膿色帶蒼，深至骨屬腎水，故紫黑血出，各隨五臟之部而見五色，是謂標也，其本則一出於熱，但分淺深而已。大法下迫窘痛，後重裏急，小便赤澀，皆屬燥熱，而下利白者，必多有之，然則爲熱明矣。或曰：『白利既爲熱病，何故服辛熱之藥，亦有愈者耶。』『蓋辛熱之藥，能開發腸胃鬱結，使氣液宣通，流濕潤燥，氣和而已。然病微者可愈，甚者鬱結不開，其病轉加而死。』

㈠論五泄所宜氣味

胃泄者，飲食不化，完穀出色黃，風乘胃也，宜辛劑之類。

脾泄者，腹脹滿，注食則生嘔逆，三證宜和劑淡劑甘劑淸劑之類。

大腸泄者，腸鳴切痛，先宜寒劑奪之，次甘劑分其陰陽。

小腸泄者，溲而便膿血，小腹痛，宜寒劑奪之，淡劑甘劑分之。

大瘕泄者，裏急後重，數至圊而不能便，先宜淸劑寒劑奪之，後以淡劑甘劑分之，或莖中痛亦然。

㈡金匱十全之法

飧泄，春傷於風，夏必飧泄，暮食不化，亦成飧泄。風而飧泄者，先宜發劑，次宜淡劑甘劑分劑之類。

洞泄，春傷於風，邪氣留連，乃爲洞泄，瀉下褐色，治法同上。又宜灸水分穴。濕氣在下，又宜以苦劑越之。

洞泄寒中，俗呼曰休息利，洞泄屬甲乙風木，可灸氣海水分三里，愼勿服峻熱之藥。小便澀則生，足腫腹脹滿者，死於庚辛之日。如屍臭者不治。

注下，火氣太過，宜涼劑，又宜淡劑調冰水，令頓服之則愈，此爲暴下不止也。

支滿鶩溏，上滿而後泄，下泄而後復上滿，可服木香檳榔丸，青皮陳皮。久則反寒，治法同寒中。如鶩溏而腸寒者，亦斯義。風濕亦有支滿者。

㈢金匱十全五泄法後論

天之氣一也，一之爲用，風火燥濕寒暑；故濕，六氣之一也，相乘而爲五變，其化在天爲雨，在地爲泥，在人爲脾，甚則爲泄。故風而濕，其泄也胃，暑而濕，其泄也脾，燥而濕，其泄也大腸，熱而濕，其泄也小腸，寒而濕，其泄也大瘕，若胃泄

有腸胃有積結，與下焦客邪投溫劑不能止之，必也或攻泄之，或分利之而後已。經曰：『理中者理中焦，』此利在下焦，宜赤石脂禹餘糧湯。復不止，當利其小便，是泄在下焦滲泄而聚利者也。少陰病自利清水，色純青，心下必痛，口乾燥，或下利，三部脈皆平，按之心下鞕，或脈沉而滑，或不欲食而讝語，或差後至年月日復發，此數者，皆腸胃有積結而須攻泄者也。內經有曰：『大熱內結，注泄不止，』熱宜寒療，結伏須除，以寒下之。結散利止，大寒凝內，久利泄溏愈而復發，綿歷歲年，以熱下之。寒去利止，謂之通因通用。下利雖有表證，又不可發汗，以下利為邪氣內攻，走津液而胃虛也。故經曰：『下利不可攻其表，汗出必脹滿，』者是已。大抵下利脫氣，至急五奪之中，此為甚者，其或邪盛正虛，邪擁正氣下脫，多下利而死。何以言之，經曰：『下利日十餘行，脈反實者死。發熱下利，至甚厥不止者，死。直視讝語下利者，死。下利手足厥冷無脈者，灸之不溫，脈不還者，死。少陰病自利，復煩躁不得臥寐者，死。』此數者皆邪擁正氣下脫而死者也。金匱要略曰：『六腑氣絕於外者，手足寒，五臟氣絕於內者，利下不禁。』嗚呼！疾成而後藥，雖神醫不可為也。氣既脫矣，孰能治之！

## 元張潔古活法機要

### ㈠治法

五泄之病，胃小腸大瘕三證，皆以清涼飲子主之，其泄自止。厥陰證加甘草以緩之；少陰證裏急後重，故加大黃；又有太陰陽明二證，當進退大承氣湯主之；少陰證不能食也，當先補而後泄之，乃進藥法也。先煎厚朴半兩，製，水煎二三服後，未已，謂有宿食不消，又加枳實二錢，同煎二三服。泄又未已，如稍進飲食，尚有熱毒，又加大黃三錢，推過，泄止住藥。如泄未止，為腸胃有久塵垢滑黏，加芒硝半合，宿垢去盡則愈也。陽明證能食是也，當先泄而後補，謂退藥法也。先用大承氣湯五錢，水煎服。如利過泄未止，去芒硝，後稍熱退，減大黃一半，再煎兩服。如熱氣雖已，其人必

夫大人小兒暴注瀉水不已，乃火運太過之病，火主暴逆之故也。急宜用水調桂苓甘露散，五苓散，益元散，或以長流水煎過放冷服則愈。愼不可驟用罌粟殼乾薑豆蔻聖散子之類，縱瀉止則腸胃不通轉生他疾，止可以分陰陽利水道而已。

凡泄瀉米穀不化，日夜無度，腹中雷鳴，下利完穀，可用導水丸禹攻散泄之。或病人老弱氣虛，可用無憂散泄之。再觀病勢強弱，候一二日，可服胃風湯以治其風。如不愈者，更服桂枝麻黃湯汗之則愈。內經曰：『夫風之中，爲腸風飱泄』。啓元子云：『風入胃中，上熏於胃，故食不化而下泄。』又云：『暮食不化爲飱泄。』又經云：『春傷於風，夏爲飱泄』。故風宜出汗。腸中鳴者，風以動之，動而有聲。愼不可用罌粟豆蔻乾薑大燥之藥。病微者燥之，去其濕則愈。病甚者攻之不動，反能爲害。經曰：『其減則漸，其加則甚』。可用五苓散去猪苓加人參散服之。

夫男子婦人病水濕瀉注不止，因服豆蔻烏梅薑附峻熱之劑，遂令三焦閉溢，水道不行，水滿皮膚，身體否腫，面黃腹大，小便赤澀，兩足按之，陷而復起。內經曰：『諸濕腫滿，皆屬脾土』。可用獨聖散吐之。如時月寒涼，宜於暖室不透風處，用火一盆，以藉火力出汗，次以導水禹功散量虛實瀉十餘行，濕去腫減則愈矣。是汗下吐三法齊行，既汗下吐訖，臟腑空虛，宜以淡粥調養腸胃二三日；次服五苓散益元散，同煎燈心湯調下。如勢未盡，更宜服神助散，舊名葶藶散，可以流濕潤燥，分陰陽，利小便，不利小便，非其法也。既平之後，宜大將息，忌魚鹽酒肉瓜果房室等事，如此三年，則可矣。如或不然，決死而不救也。

瀉利之疾，歲歲有之，醫者不察，便用聖散子之屬，乾薑赤石脂烏梅罌粟殼官桂石榴皮龍骨牡蠣之屬，變生小便癃閟，甚者爲脹，又甚者水腫之疾。間有愈者，病有微者也，甚則必不愈矣。

大暑末上四之氣爲病，多發暑氣，頭痛身熱，發渴，不宜作熱病治，宜以白虎湯。得此病不傳染，次發脾泄，胃泄，大腸

不已，變而爲飱泄，飱泄不已，變而爲洞泄，洞泄，不已，變而爲脾泄，寒中，此風乘濕之變也。若脾泄不已，變而爲霍亂，霍亂不已，變而爲注下，注下不已，變而爲腫蠱，此暑乘濕之變也。若大腸泄不已，變而爲瞋脹，瞋脹不已，變而爲腸鳴，腸鳴不已，變而爲支滿鶩溏，此燥乘濕之變也。若小腸泄不已，變而爲腸澼，腸澼不已，變而爲臟毒，臟毒不已，變而爲前後便血，此熱乘濕之變也。若大瘕泄不已，變而爲脫肛，脫肛不已，變而爲廣腸痛，廣腸痛不已，變而爲乳痔腸風，此寒乘濕之變也。凡此二十五變，若無濕則終不成疾，況脾胃二土，共管中州，胃好飲脾惡濕，此泄之所由生也。凡下利之脈，微且小者生，浮大者死，水腫反是，脈浮大者生，沈細者死。夫病在裏脈沈，在表脈浮，裏當下之，表當汗之。下利而脈浮滑，水腫者脈沈細，表裏俱受病，故不治也。凡臟血便血，兩手脈俱弦者死絕，俱滑大者生，血溫身熱者死。王太僕則曰：『若下血而身熱血溫，是血去而外逸也。血屬火故也。七日而死者，火之成數也。』夫飱泄得之於風，亦汗可愈。或伏驚怖，則膽木受邪，暴下綠水，蓋謂戊己見伐於甲木也。嬰兒泄綠水，素問有嬰兒風理亦如之。洞泄者，飱泄之甚，但飱泄近於洞泄，洞泄久則寒中，溫之可也。治法曰：『和之則可，汗之則不可，』蓋在腑則易治，入臟則難攻，洞泄寒中，自腑而入臟，宜和解而勿爭。水腫之作，未遽然也，由濕遍於大腸小溲自濇，水濕既瀦，腫滿日倍面黃腹大，肢體如泥，濕氣周身，難專一法，越其高而奪其下，發其表而滲其中，酸收而辛散，淡滲而苦堅，用攻劑以救其甚，緩劑以平其餘，如是則孤精得氣，獨魄反陽，亦可保形，陳莝去而淨腑潔矣。彼豆蔻烏梅罌粟囊，勿驟用也。設病形一變，必致大悞，或通而塞，或塞而通，塞塞通通，豈限一法？世俗止知塞劑之能塞，而不知通劑之能塞者，拘於方也。凡治濕皆可以利小溲爲主，諸泄不已，宜灸水分穴，謂水穀之所別也。臍之上一寸半，灸五七壯。腹鳴如雷，水道行之候也。凡濕勿鍼，內經雖云繆刺其處，莫若以張長沙治傷寒法治之，蓋泄者亦四時傷寒之一也。仲景曰：『上涌而下泄，表汗而裏攻，半在表半在裏，則宜和解之，表裏俱見，隨證滲泄，』此雖以治傷寒，其於治濕也同。乃察脈以視深淺，問年壯以視虛實，所投必如意矣。諸厥固泄，皆屬於下，下謂下焦肝腎氣也。夫守司於下，腎

## 泄瀉門二

### 元李杲十書

#### ㈠春傷於風夏爲飧泄論

素問生氣通天論曰『春傷於風，邪氣留連，乃爲洞泄。』陰陽應象論曰：『春傷於風，夏生飧泄。』王冰註曰：『風中於表，則內應於肝，肝氣乘脾，故洞泄或飧泄。』成無己註云：『當春之時，風氣大行，春傷於風，風氣通於肝，肝以春適旺，風雖入之，不能卽發。至夏肝衰，然後始動，風淫末疾，則當發於四肢。夏以陽氣外盛，風不能外發，故攻內而爲飧泄。』王海藏曰：『木在時爲春，在人爲肝，在天爲風，當春之時，發爲溫令，反爲寒折，是三春之月，行三冬之令，以是知水太過矣。水既太過，金肅愈嚴，是所勝者乘之而妄行也。所勝者乘之，則木虛明矣。木氣既虛，火令不及，是所生者受病，故所不勝者侮之。是以土來木之分，變而爲飧泄也。所以病發於夏者，以木絕於夏，而土旺於夏，濕本有下行之體，故也。不病於春者，以春時風雖有傷，木實當權，故也。或謂春傷於風，是人爲風所傷，非也。若是則止當頭痛，惡風自汗，何以言夏爲飧泄哉？今言春傷於風，卽是時傷令也明矣。』諸家註釋，皆不得經旨者，蓋由推求太過故耳。夫風天地之氣也，其傷於人，人豈能於未發病之前，預知其客於何經絡，何臟腑，何部分，而成何病？及其旣

泄小腸泄大瘕泄，霍亂吐瀉下利，及赤白相雜，水穀不分，消腸鳴切痛，面浮足腫，目黃口乾，脹滿氣痞，手足無力。小兒亦如此。四之氣病宜滲泄五苓散之類。

(二)春傷於風，夏生飧泄（與前說異）

木在時爲春，在人爲肝，在天爲風。風者，無形之清氣也。當春之時，發爲溫令，反爲寒折，是三春之月，行三冬之令也，以是知水爲太過矣。水既太過，金肅愈嚴，是所勝者乘之，則木虛明矣。故經曰：『從後來者爲虛邪』。木氣既虛，火令不及，是所生者受病也。故所不勝者侮之。是以土來木之分，變而爲飧泄也。故經曰：『清氣在下，則生飧泄』。以其濕令當權，故飧泄之候，發之於夏也。若當春之時，木不發生，溫令未顯，止行冬令，是謂傷衛，以其陽氣不出地上，當以麻黃湯發之。麻黃味苦，味之薄者，乃陰中之陽，故從水中補木而瀉水，發出津液爲汗。若春木已生，溫令已顯，陽氣出於地上，寒再至而復折之，當以輕發之，謂已得少陽之氣，不必用麻黃也。春傷於風，夏生飧泄，所以病發於夏者，以其木絕於夏，而土王於長夏，濕本有下行之體，故飧泄於夏，不病於春者，以其春時風雖有傷，木實當權，故飧泄不病於木之時，而發於濕之分也。經曰：『至而不至，是爲不及，所不勝妄行，所不勝者薄之，所生者受病』，此之謂也。

六脈沉緊，按之不鼓，膀胱小腸也。或瀉利不止而腹脹，或純便血赤血，或雜膿血，便雖多而不渴，精神短少，或面白脫色，此失血之故。或面黃而氣短，此元氣損少之故。且小腸者，手太陽經丙火也。膀胱者，足太陽經壬水也。是壬水來丙小腸之位，小腸爲壬所剋而外走也。諸手經短而足經長，兼以五行相剋論之，俱是足經。此火投於水，大寒之證，宜溫之則愈。其與難經一證，寒熱相反，亦名曰小腸瀉，亦作洩。海藏云：『此雜病火投於水，變爲寒證。又外傷足太陽膀胱經，左脈俱浮，爲表陽之候也。忽變爲內寒，亦旺火投盛水，而屈丙就壬化，脈反不浮而微沉。此內病與外病，俱有此火投水例，非精於診脈者，孰能知之？宜薑附赤石脂硃砂丹。』

如飧泄不禁，以升陽除濕防風湯導其濕。如飧泄及泄不止，以風藥升陽，蒼朮益胃去濕。脈實䐜脹，閉塞不通，從權以苦多甘少藥泄之。加得通，復以升陽湯助其陽，或便以升陽湯中加下泄藥。

發病，然後可以診候，始知其客於某經絡，某臟腑，某部分，成某病耳。註釋者，苟悟因病始知病原之理，則於此傷不勞餘力，自迎刃而解矣。夫洞泄是因其發動之時，形診昭著，乃逆推之而知其昔日致病之原爲傷風耳，非是初受傷之時，能預定其今日必爲此病也。且夫傷於風也，有當時發病者，有過時發病者，有久而後發病者，有過時之久自消散而不成病者，何哉？蓋由邪氣之傳變聚散不常，及正氣之虛實不等故也。且以傷風言之：其當時而發，則爲惡風發熱頭疼自汗欬嗽喘促等病；其過時與久而發，則爲癘風熱中寒中偏枯五臟之風等病。是則洞泄飧泄者，乃過時而發之中之一病耳。因洞泄飧泄之病生，以形診推之，則知其爲春傷於風，藏蓄不散而致。苟洞泄飧泄之病未生，孰能知其已傷風於前，將發病於後邪？假如過時之久自消散而不成病者，人亦能知乎？夫風者，春之令也，春感之不卽發而至夏，邪既不散則必爲疾，其所以爲洞泄者，以風乃天地浩蕩之氣，飛揚鼓舞，神速不恆，人身有此腸胃之職，其能從容傳化泌別而得其常乎？故水穀不及分別而併趨下，其爲飧泄，亦類此義。夫王冰之註，雖未免泥於必字，及未得經旨，然却不至太遠也。若成無己之說，則似太遠矣，然猶未至於甚也。至王海藏立論，則推求過極，欲異於人，殊不知反穿鑿綴緝，乖悖經旨，有不可勝言者。此先儒所謂如大軍游騎，出遠而無所歸矣。姑摭成無己王海藏之說，辨其甚者一二。夫無己謂：『風淫末疾，則當發於四肢，雨淫腹疾，則當發爲下利』，竊謂則當二字，決然之辭也。春傷風，遇夏之陽氣，外盛而不能外發，故攻內爲飧泄，此或若可通矣。經曰：『木發無時，倘風不傷於春而傷於他時，不遇夏之陽氣，外盛將外發乎？將內攻乎？况風屬陽，與夏同氣，果欲外出，則當隨其散越之勢而出，安有不能之理乎？且風善行數變，其爲病非一，豈獨能爲四肢之疾乎？所謂雨淫腹疾之義，其不通亦如此乎？乃若海藏則又以春傷風，爲時傷令，故於春傷風謂春行冬令而溫爲寒折，又謂母亢而害所承之子，吁！何支離破碎，徒費辭如此乎？經曰：『亢則害，承乃制，』其義謂已亢極則勝己者來制，如火亢極則水來制之，經所謂相火之下，

因傷於酒，每晨起必瀉者，宜理中湯加乾葛，或吞酒煮黃連丸。

因傷麪而瀉者，養胃湯加蘿蔔子炒研破一錢。痛者更加木香半錢。瀉甚者，去藿香加炮薑半錢。

有每日五更初洞瀉，服止瀉藥並無效，米飲下五味丸，或專以五味子煎飲，亦治脾腎瀉，惟省節飲食，忌口。但得日間上半夜無事，近五更其瀉復作。此病在腎，俗呼為脾腎瀉，分水飲下二神丸，及椒朴丸，或平胃散下小茴香丸，病久則重，其人虛甚，宜椒附湯。

暑瀉因中暑熱者，宜胃苓湯，或五苓散，加車前子末少許，甚效。

世俗類用澀藥治利與瀉，若積久而虛者，或可行之，初得之者，必變他疾，為禍不少。殊不知多因於濕，惟分利小水，最為上策。

## 平治會粹

### ㈠泄瀉從濕治有多少

泄瀉者，水濕所為也。由濕本土，土乃脾胃之氣也。得此證者，或因於內傷，或感於外邪，皆能動乎脾濕。脾病則升舉之氣下陷，濕變下注，并出大腸之道，以胃與大腸同乎陽明一經也。云濕可成泄，垂教治濕大意而言，後世方論泥云：治濕不利小便，非其治也。故凡泄瀉之藥，多用淡滲之劑利之。下久不止，不分所得之因，遽以為寒，而用緊澀熱藥兜之。夫泄有五，飧泄者，水穀不化而完出，濕兼風也。溏泄者，漸下汗積黏垢，濕兼熱也。鶩泄者，所下澄澈清冷，小便清白，濕兼寒也。濡泄者，體重軟弱，泄下多水，濕自甚也。滑泄者，久下不能禁固，濕勝氣脫也。若此有寒熱虛實之不同，舉治不可執一而言，謹書數法於後。夫泄有宜汗解者，經言：『春傷於風，夏必飧泄。』又云：『久風為飧泄。』若保命集云，用蒼朮麻黃防風之屬是也。有宜下而保安者，若長沙言下利脈滑而數者，有宿食也，當下之。下利已

腸中寒則食已窘迫，腸鳴切痛，大便色白。腸中寒，胃中熱，則疾饑小腹痛脹。腸中熱，胃中寒，則脹而且泄，非獨腸中熱則泄，胃中寒傳化亦泄。

## 朱震亨心法

### ㈠泄瀉

泄瀉有濕火氣虛痰積。濕用四苓散加蒼朮，甚者蒼白二朮同炒用。燥濕兼滲泄火用四苓散，加木通黃芩伐火利小水。痰積宜豁之，用海粉青黛黃芩神麯糊丸服之。在上者，用吐提，在下陷者，宜升提之，用升麻防風。氣虛用人參白朮炒芍藥升麻，食積二陳湯和澤瀉蒼朮白朮山楂神麯川芎，或呑保和丸。

瀉水多者，用五苓散。久病大腸氣泄，用熟地半兩炒，白芍知母各三錢，升麻乾薑各二錢，炙甘草一錢，爲末，粥丸服之，仍用艾炷如麥粒，於百會穴，灸三壯。

脾瀉當補脾氣，健運復常，用炒白朮四兩，炒神麯三兩，炒芍藥三兩半，冬月及春初，用肉蔻代之，或散或湯。作餅子，尤佳。

食積作瀉，宜再下之。神麯大黃作丸子服。

脾瀉已久，大腸不禁，此脾氣已脫，宜急澀之，以赤石脂肉豆蔻乾薑之類。

寒泄寒氣在腹，攻刺作痛，洞下淸水，腹內雷鳴，米飲不化者，理中湯，或呑大已寒丸，附子桂香丸。畏食者八味湯。

熱瀉糞色赤黃，肛門焦痛，糞出穀道，猶如湯澆，煩渴，小便不利，宜五苓散，呑香連丸。

濕瀉，由坐臥濕處，以致濕氣傷脾，土不尅水，梅雨久陰，多有此病。宜除濕湯，呑戊己丸，佐以胃苓湯，重者朮附湯。

傷食瀉，因飲食過多，有傷脾氣，遂成泄瀉，必噫氣如敗卵臭，宜治中湯加砂仁半錢，或呑感應丸，尤當。

[illegible]之乎？」予曰：「經云暴注下迫皆屬於熱，」又曰「[illegible]

注屬於火，又下利清白屬於寒也。』熱者君火之氣，火者相火之氣，寒者寒水之氣，屬火熱者二，屬水寒者一，瀉利一證，似乎屬熱者多，屬寒者少，詳玩局方，專以熱澀爲用，若用之於下利清白而屬於寒者斯可矣。經所謂下迫者，卽裏急後重之謂也。其病屬火，相火所爲，其毒甚於熱也，投以澀熱，非殺之而何？謹按仲景之法，謂下利脈滑而數者，有宿食，當下之。下利脈遲而滑者，實也，利爲未止，急下之。下利脈反滑，當有所去，下之安。下利不欲食，有宿食者，當下之。下利腹滿痛，爲寒爲實，當下之。下利腹堅實，當下之。下利讝語，有燥矢，當下之。下利三部脈皆平，按之心下堅，急下之。下利已差，至其時復發者，此爲下未盡，更下之安。下利脈大浮弦，下之當自愈。風寒在者不可下，下後，心下堅痛，脈遲，此爲寒，宜溫之。脈浮大，此爲虛，強下之故也。設脈浮革者，因而腸鳴，當溫之。下利脈遲緊，痛未欲止，當溫之。下利心痛，急當救裏，可與理中、四逆、附子輩。下利大孔痛，宜溫之。觀仲景可下者十法，可溫者五法，謂之下者，率用承氣加減，何嘗以砒丹巴硇決烈燥熱重毒之劑？謂之溫者，率用薑附爲主，何嘗用鍾乳龍骨石脂粟殼緊澀燥毒之劑？

或曰：『可下者，豈非腸胃有積滯乎？不用砒丹巴硇，恐積滯未易行也，吾子以爲未然，幸發明承氣之意可乎？』予曰：『大黃之寒，其性善走，佐以厚朴之溫，善行滯氣，緩以甘草之甘，飲以湯液，灌滌腸胃，滋潤輕快，無所留滯，積行卽止。砒丹巴硇毒熱類聚，劑成丸藥，其氣凶暴，其體重滯，積垢雖行，毒氣所過，譬如強暴貪賊，手持兵刃，其可使之徘徊顧瞻於堂奧間乎？借使有愈病之功，其腸胃清淯之氣，能免旁損暗傷之患乎？仲景治利，可溫者溫，可下者下，或解表，或利小便，或待其自已，區別易治難治不治之證，至爲詳密。然猶與滯下衮同立方命論。其後劉河間分別在表在裏，挾風挾濕挾熱挾寒挾虛，明著經絡，隄防傳變，大槩發明滯下證治，尤爲切要。和血則便膿自愈，調氣則後重自除，此實盲者之日月，聾者之雷霆也。』

差，至其時復發者，此爲下未盡，更下之安，悉用大承氣湯加減之劑，有宜化而得安者，格致餘論夏月患泄，百方不效，視之久病而神亦瘁，小便少而赤，脈滑而頗弦，膈悶食減，因悟此久積所爲，積濕成痰，留於肺中，宜大腸之不固也，清其源則流自清，以茱萸等作湯溫服一椀許，探喉中一吐痰半升，如利減一半，次早晨飲，吐半升而利止。有以補養而愈者，若脾胃論言：『脈弦氣弱自汗，四肢發熱，大便泄瀉，』從黃芪建中湯。有宜調和脾濕而得止者，若潔古言曰：『四肢懶倦，小便不利，大便走泄，沉困，飲食減少，』以白朮芍藥茯苓加減治之。有宜升舉而安者，若試效方言胃中濕，脾弱不能運行，食下則爲泄，助甲膽風勝以剋之，以升陽之藥羌活獨活升麻防風炙甘草之屬。有宜燥濕而後除者，若脾胃論言：『土濕有餘，脈緩怠惰，嗜臥，四肢不收，大便泄瀉，』從平胃散。有宜寒涼而愈者，若長沙言：『協熱自利者，黃芩湯主之。』舉其濕熱之相宜者，若長沙言：『下利脈遲緊痛，未欲止，當溫之。下利心痛急當救裏，下利清白，水液澄澈，可與理中四逆湯輩，』究其利小便之相宜者。河間言濕勝則濡泄，小便不利者，可與五苓散益元散分導之。以其收斂之相宜者，東垣言：『寒滑氣泄不固，製訶子散澀之。』以上諸法，各有所主，宜獨利小便而濕動也，豈獨病因寒，必待龍骨石脂緊重燥毒之屬澀之？治者又當審擇其說，一途取利，約而不博可乎？

## 局方發揮

### ㈠泄利滯下治法不同

泄利一門，其用鍾乳健脾丸，朝眞丸，駐車丸，訶黎勒丸，大溫脾丸，黃連阿膠丸，胡粉丸，桃花丸，訶黎勒散，木香散，七棗湯，赤石脂散，養臟湯，御米湯，金粟湯，狗頭骨丸，豆蔻丸，肉豆蔻散，三神丸，丁香豆蔻散，止瀉丸，皆用熱藥爲主治，以澀藥爲佐使，當爲腸虛感寒而成滑利者設也。彼瀉利者，將無熱證耶？將無積滯耶？內經曰：『春傷於風，夏爲飧泄，多屬帶下。』夫瀉利證其類尤多，先賢曰濕多成五泄，此確論也。曰風曰濕，固不可得而通治矣。况風與濕之外，

㈠泄瀉

冷泄，不言而喻熱亦能瀉者。蓋冷瀉譬之鹽，見火熱則凝，冷則復消，熱瀉譬之水，寒則凝結，熱則復化爲水。此外證狀不一，疑似之間並用先見分水丸一二服。惟傷熱瀉不可用。五虛者死。脈細皮寒少氣，前後泄痢，飲食不入，元是冷瀉，因瀉而煩躁，飲水轉飲轉瀉者，參附湯，理中湯加茯苓黃連名連理湯用之多有奇功。且如今當暑月若的知暑瀉，自合用暑藥，的知冷瀉自合用熱藥，中間有一等感暑又復內傷生冷，非連理湯不可。下泄無度，泄後却彈過響，肛門熱，小便赤澀，心下煩渴，且又喜冷，此藥爲宜。若元是暑瀉，經久下元虛甚，日夜頻併，暑毒之勢已然，而瀉不已，若用暑藥，則決不能取效，便用薑附輩，又似難施，疑似之間尤宜用此。余生治傷寒協熱自利，有用白薑黃對半名金銀湯者，卽此意也。然不若連理湯爲穩。如寒瀉服上藥未效，宜木香湯，或薑附湯，六柱湯，吞震靈丹，養氣丹，手足厥逆者兼進硃砂丹。藥食方入口而卽下者，名曰直腸，難治。如瀉已愈而精神未復舊者，宜十補湯。寒瀉腹中大痛，於服前藥外，間進乳豆丸，服諸熱藥以溫中並不見效，登圊不迭，穢物卽出，此屬下焦，宜桃花丸二五粒，訶黎勒丸以澀之。

暑瀉由冒感暑氣，或飲啖日中之所曬物，坐日中熱處，證狀與熱瀉略同，宜胃苓飲，或五苓散加車前子少許，兼進來復丹。凡瀉津液既去，口必渴，小便多是赤澀，未可便作熱論，的知熱瀉，方用冷劑，不然，勿妄投以致增劇。瀉止瀉自止，小便亦能如常。

氣瀉，腸鳴，氣走胷膈，痞悶，腹急而痛，瀉則稍可，須臾又急；亦有腹急氣塞而不通者，此由中脘停滯，氣不流轉，水穀不分所致。宜大七香丸入米煎服。久而不愈者，寬中散吞震靈丹，仍佐以米飲調香附末。

濕瀉，如其人本不甚瀉，每日二三次，鴨溏，此脾家不燥，常服平胃散自愈。緣內有蒼朮，可以燥脾。

或曰：『局方治法，將終不能彷彿仲景之方耶？』予曰：『圓機活法，內經具舉，與經意合者，仲景之書也。仲景因病以治方，局方製藥以俟病，若之何其能彷彿也？宋命近臣讎校方書，近臣者，術業素異，居養不同，焉知醫之事哉？雖知尊仲景矣，亦未嘗不欲效之也；徒以捧心效西施爾。觀桃花丸一方可見矣，即要略桃花湯也，仲景以治便膿血，用赤石脂丸者，乾薑粳米同煮作湯，一飲病安便止，後藥意謂病屬下焦，血虛且寒，非乾薑之溫，石脂之澀且重，不能止血，粳米味甘，引入腸胃，不使重澀之體，少有凝滯，故煮成湯液，藥行易散，餘毒亦無，局方不知深意，不造妙理，但取易於應用，喜其性味溫補，借爲止瀉良方，改爲丸藥，劑以麪糊，日與三服，其果能與仲景之意合否乎？』

## 羅天益衛生寶鑑

### (一)濡泄

內經云：『濕勝則濡泄。』甲乙經云：『寒氣客於下焦，傳爲濡泄。』夫脾爲五臟之至陰，其性惡寒濕，今寒濕之氣，內客於脾，故不能培助胃氣，腐熟水穀，致清濁不分，水入腸間，虛莫能制，故洞泄如水，隨氣而下，爲之濡泄。法當除濕利小便也。

### (二)飧泄

內經云：『清氣在下，則生飧泄。』又曰：『久風入胃中，則爲腸風飧泄。』夫脾胃土也，其氣沖和，以化爲事，今清氣下降而不升，則風邪久而干胃，是木賊土也，故沖和之氣不能化，而令物完出，謂之飧泄。或飲食太過，腸胃所傷，亦致米穀不化，此俗呼水穀利也。法當下者舉之而消剋之也，以加減木香散主之。

下多者，還用白朮。氣泄而不收則下多，白朮甘溫補，使正氣收而不下泄也。或曰：『濕勝則濡泄，朮專除濕，於是下

反熱要知陰陽二證，發熱自是不同，發於陽而發熱者頭必疼，發於陰而發熱者頭不痛，此爲驗。有元是陽證，因冷劑太驟，遂見下利不止，而諸陽證仍在，略不少衰，此當以暖藥固其下，洞泄稍定，又宜隨證治之，不可用熱。初病是陽經見頭疼，以次陽傳入陰，頭略不疼，不可便謂不疼爲陰證，須問其得病之初頭疼與否。

瀉而腹痛有積者，生料五苓散、藿香正氣散，均各半貼；若瀉雖無積，其腹痛甚，生料五苓散加木香七分，或六和湯加木香半錢，或不加木香，止與二藥煎熟，去滓，調下蘇合香丸。

瀉而發熱者，胃苓飲；瀉而發渴者，胃苓飲兼縮脾飲。餘瀉渴兼作未透者，湯化蘇合香丸，呑來復丹，或研來復丹作末，白湯調下。已透者，香薷飲。

傷濕小便祕，大便溏者，五苓散呑戊己丸。戊己屬土，土能剋水，因以得名。五苓乃濕家之要藥，經云：『治濕不利小便，非其治也』，意蓋取此。

傷食瀉，傷於生冷油膩，停滯膈間，脾氣不溫，食難消化，或多餐糯食及一切難化之物，並宜紅丸子、金上牢內消丸。

## 樓英醫學綱目

### ㊀泄瀉

五虛之證，予嘗治數人，在下則泄瀉不止，在上則吐痰不已者，皆死。蓋氣脫無所管攝故也。若用參朮膏救之於早，者，十活二三。

泄瀉身熱，小便不利，口渴者，益元五苓。若火多，四苓加木通、黃芩。泄而困倦，不便及脈數虛熱者，宜參朮滑石苓通。

泄而脈滑堅者，實熱，宜大承氣湯。

傷食瀉因飲食過多，有傷脾氣，遂成泄瀉，俗呼爲傷敗腹，其人必噫氣如敗卵臭，宜治中湯，加砂仁半錢，或七香丸紅丸子雜服。

食積腹疼而瀉，不可遽用治中兜住，先用調脾飲，吞感應丸。或因食一物過傷而瀉，後復食之卽瀉者，以脾爲其所傷未復而然，宜健脾湯。因食冷物停滯傷脾，脾氣不暖，所食之物不能消化，瀉出而食物如故，宜治中湯加乾薑吞酒煮黃連丸。

或重而瀉泄頻數者，宜沖和湯。

瀉已愈隔年，及後期復瀉，古論云：『病有期年而發者，有積故也，宜感應丸。』

風寒泄利，下重其人四逆，先以水盞半，葱白二根，煎一盞，去葱煎四逆散至七分。欬加北五味子乾薑各半錢，悸加桂枝一錢，小便不利加茯苓一錢，腹痛加熟附子半錢。

若審是不利淸穀，手足四逆，其人面帶赤，或腹痛，或乾嘔，或咽痛，四逆湯倍乾薑。面赤者加葱一根，腹痛加芍藥一錢半，嘔加生薑，咽痛加桔梗一錢。

若口中和而背惡寒，宜正方四逆湯不必加減。四逆散四逆湯俱治少陰下利，四肢逆冷，泄利下重者，與下利淸穀者，一涼一溫，又自有陰陽之別。蓋四逆散是治四逆陽證，四逆湯是治四逆陰證。

若初得病，便是少陰證，其人發熱惡寒，身疼頭不痛，宜麻黃附子細辛湯微汗之。或五積散加熟附半錢，或五積散加順元散。若煩悶厥逆，或舌捲囊縮，或下利淸穀，裏寒外熱，此屬厥陰經陰中之陰，宜進通脈四逆湯，或當歸四逆湯，加生薑茱萸。舌捲囊縮，不特陰中之陰有之，陽明之熱，陷入厥陰亦有之。蓋陽明主宗筋，宗筋爲熱毒風所致，故弗榮而急引舌與卵，是以舌捲囊縮，當瀉陽以救陰，宜大承氣湯。

[illegible]少陰厥陰，其餘身熱下利，皆屬陽經。然陰利有反發熱，或初

## (一)證治

泄本屬濕，然多因飲食不節，致傷脾胃而作，須看時令，分寒熱新入而施治。治法補脾消食，利小便，亦有升提下陷之氣，用風藥以勝濕，亦有久泄腸胃虛滑不禁者，宜澀之。用白朮二錢，茯苓，芍藥炒各一錢五分，已上三味，乃泄瀉必用者。陳皮一錢，甘草炙五分。若傷食瀉黃，或食積，加神麴，麥芽，山楂各一錢，黃連炒七分。若腹中窄狹，再加厚朴枳實以消停滯。

註 按前證若飲食已消，而泄瀉未止，此脾胃之氣傷也，宜五味異功散。若泄瀉而腹中重墜，此脾胃之氣下陷也，宜補中益氣湯。若服剋滯之劑而腹中窄狹，此脾氣虛痞也，宜六君子湯。若脅脹少食善怒，瀉青，此脾虛為肝所乘，宜六君子加柴胡，升麻，木香。若少食體倦，善噫，泄黃，此脾虛下陷也，宜六君子加升麻，柴胡。大凡諸證若脾脈弦長者，肝木乘脾土也，當補脾平肝。若脾脈沉弦者，寒水侮脾土也，當溫中補腎。夫黃連，枳實雖消停滯，開痞悶，若脾胃充實，暴患實痞，宜暫用。若屢患屢服，或脾胃虛痞者用之，則脾胃反傷而諸證蜂起。故東垣云：『脾胃實者，用黃連枳實瀉之，虛者，用白朮陳皮補之，須分病之虛實，人之南北而治之。』

若小便赤澀短少，加猪苓，澤瀉各一錢，以分利之。夏月加茵陳七分，山梔仁炒四分。

註 按前證若津液偏滲於大腸，大便瀉而小便少者，宜用此藥分利。若陰陽已分而小便短少者，此脾肺氣虛而不能生水，宜補中益氣湯加麥門五味。陰火上炎而小便赤少者，此肺氣受傷而不能生水，六味地黃丸加麥門五味。若腎經陰虛，陽無所生而小便短少者，滋腎丸。若腎經陽虛，陰無所化，而小便短少者，益氣湯，六味丸。若誤用滲泄分利，復傷陽氣，陰無所生而小便不利，或目睛凸出，腹脹如鼓，或腿膝腫硬，或皮膚斷裂者，先用滋腎丸益氣湯，每見元氣虛而復用澤瀉，猪苓，因損眞陰，以致前證益盛者，急投金匱加減腎氣丸，多有復生者。若反服

運氣泄瀉有六：一曰，土助脾濕盛而泄瀉。經云：『歲土太過，雨濕流行，民病溏泄腸鳴。』又曰：『歲水不及，濕乃下行，民病身重濡泄。』又云：『歲火不及，寒乃大行，復則病鶩溏腹痛腸鳴泄注。』又云：『土鬱之發，民病飲發注下。』又云：『濕勝則濡泄，治以苦溫』是也。

二曰，風木攻脾虛而泄瀉；經云：『厥陰司天，風淫所勝，民病冷泄溏泄。』又云：『春傷於風，邪氣留連，乃為洞泄，治以辛涼』是也。

三曰熱瀉；經云：『少陽所至為暴泄。』又云：『少陰之勝，腹滿溏泄。』又云：『火鬱之發，民病注下，治以寒劑』是也。

四曰寒泄；經云：『歲水太過，寒氣流行，民病腸鳴溏泄。』又云：『太陽所至為流泄禁止。』又云：『太陽之勝，寒入下焦，傳為濡泄，治以熱劑』是也。

五曰熱中寒中泄；經云：『太陽司天之政，三之氣，寒氣行，民病寒，反熱中注下者，是外寒內熱泄也。』又云：『長夏善病洞泄寒中者，是外熱內寒泄也。治以寒熱兼施』是也。

六曰燥泄；經云：『歲木不及，燥乃大行，民病腸鳴溏泄。』又云：『陽明司天，燥淫所勝，民病腹中鳴注泄鶩溏。』又云：『陽明之勝，清發於中溏泄。』又云：『陽明之復，腹脹而泄，治以溫劑』是也。

## ㈡飧瀉

久風入中為飧泄。經云：『虛邪之中人也，始於皮毛，留而不去，傳舍於絡脈，留而不去，傳舍於經，留而不去，傳舍於腧，留而不去，傳舍於伏衝之脈，留而不去，傳舍於腸胃，在腸胃之時，賁響腹脹，多寒則腸鳴飧泄，食不化』此久風入中為飧泄之義同也。

用十全大補湯送四神丸。若大便滑利，小便閉塞，或肢體漸腫喘嗽唾痰，爲脾腎氣血俱虛，宜用十全大補湯送四神丸。若大便滑利，小便閉澀，或肢體漸腫喘嗽唾痰，爲脾腎虧損，宜用金匱加減腎氣丸。

若飲酒便泄，此酒積熱瀉也，加黃連炒茵陳乾薑各一錢，木香五分。

註按前證若酒濕未散，脾氣未虛，宜用此藥分利濕熱。若濕熱已去，中氣被傷，宜六君子調補中氣。若誤服剋伐分利之劑，胷膈漸滿，小便短少，或腿足與腹漸腫者，急用加減金匱腎氣丸調補脾胃，多有生者。夫酒性大熱，乃無形之物，無形元氣受傷，當用葛花解醒湯分消其濕，往往反服大熱酒癥丸，重瀉有形陰血，使陽毒大旺，元氣消亡，折人長命。金匱要略云：『酒疸下之久久爲黑疸』。每見善飲服酒癥丸者，多患疸證，不悟其因，反服分利化痰，以致變證而歿者多矣。

若寒月溏泄，清冷腹痛，傷生冷飲食，加神麴麥芽炒乾薑炙各一錢，縮砂益智木香各七分。

註按前證若脾腎虛寒，宜用四神丸。若脾腎虛脫，用六君薑桂。如不應，急補命門火以生脾土。

凡泄瀉病誤服參芪等甘溫之藥，則病不能愈，而或變爲黃疸。蓋泄屬濕，甘溫之藥能生濕熱，故反助病邪，久則濕熱甚而爲疸矣。惟用苦寒瀉濕熱，苦溫除濕寒，則愈。泄止後，脾胃虛弱，方可用參芪等藥以補之。

若元氣素弱，飲食難化，食多卽腹內不和，疼痛泄瀉，此虛寒也，枳朮丸加人參白芍藥酒炒神麴炒大麥芽炒杵去皮各一兩。

註按前方乃飲食所傷之治法也。東垣云：『亦有六淫而致瀉者，又有飲食所傷而致瀉者，有因胃氣下流而致泄者，有因風而成飧泄者，有因痰積於上焦以致大腸不固而泄者，有因脾胃氣虛而洩者，治法外淫所傷，當調六氣，七情所傷，當平五臟，飲食所傷，當消停滯，胃氣下流，當升舉之，因風者解散之，痰積於上焦去其痰，脾胃氣

牽牛大黃峻劑通之，是速其危也。

若口渴引食，加乾薑一錢五分，人參麥冬各一錢，升麻四分，烏梅肉五箇。

註 按前證若胃氣傷而內亡津液者，用七味白朮散。胃氣弱而津液少者，用補中益氣湯。氣血俱虛而津液少者，用十全大補湯。腎虛津液少者，用六味地黃丸。腎水不足而虛火上炎者，用加減八味丸。若腎水不足之人患泄瀉，或服分利之劑過多，而患口渴者，若不用前藥以固其本源，則肺腎復傷，多變小便不利，肚腹水腫等危證矣。

若夏秋之間，濕熱大行，暴注水瀉，加黃連蒼朮澤瀉各一錢，升麻木通各五分。發熱作渴，加乾薑石膏各一錢，黃疸小便赤，加茵陳一錢，山梔木通各五分。

註 按東垣云，若值秋燥令行，濕熱少退，體重節痛，口舌乾燥，飲食無味，二便不調，不欲飲食，或食不化，兼灑淅惡寒，悽慘面惡，此肺與脾胃虛而陽氣不伸也，用升陽益胃湯治之。前證若濕熱內作，脾胃不能通調而致者，宜用此藥分利之。濕熱已去，脾胃虛弱而致者，宜用六君子當歸調補之。濕熱已去，脾氣下陷而致者，宜用補中益氣湯升舉之。其黃疸若小便不利，四肢沉重，渴不欲飲，此濕勝於熱，用大茵陳湯。大便自利，茵陳梔子黃連湯。若往來寒熱，身黃者，宜用小柴胡加梔子。若因勞傷形體，飲食失節而身黃者，用小半夏湯。蓋黃疸為內傷不足之證，宜調補脾胃元氣為主，若妄用驅逐，復傷元氣，多致不起。

若久瀉脾胃虛弱，飲食難化，加黃芪炙人參各一錢，神麴麥芽各一錢二分，木香煨乾薑炙各五分。

註 按前證或作嘔，或飲食少思，屬脾胃虛弱，用四君子加半夏木香。或兼作嘔，或腹作痛，屬脾胃虛寒，用六君子加炮薑木香。若麥芽善損腎，神麴善化胎，損神，不宜輕用。大抵此證多由泛用消食利水之劑，損其眞陰，元氣不能自主持，遂成久泄。若非補中益氣湯四神丸滋其本源，後必胷痞腹脹，小便淋瀝，多致不起。

者，大柴胡湯或陶氏黃龍湯。下利脈和者，內實，下利脈滑或浮大按之反澀不飲食者有宿食並宜下之又太陽初傷風，下利不惡寒，頭痛乾嘔心痞，腹痛，者桂枝湯加芫花或十棗湯。胃不和，腸鳴下利者，生薑瀉心湯。小便澀大便利者，赤石脂丸。下利頻而溺如常者自止，橘皮竹茹湯調之。合病自利及心痞下利見各條。裏氣協寒下利清白；太陰不渴者，理中湯四逆湯。寒毒入胃者，四逆湯加韭白。少陰自利，虛渴脈微者，白通湯。厥逆無脈者，白通加猪膽汁湯通脈四逆湯。少陰下利咽痛者，甘桔湯，厥陰下利先厥而後發熱者；下利必自止，若再厥者必復利也，小建中湯當歸四逆湯。利不止者，赤石脂禹餘糧湯又下利身痛者，先以四逆湯救裏利止但身痛者急服桂枝湯救表。凡下利讝語直視，及厥躁不得眠，汗不止，無脈及自利不禁，身熱脈實者皆死。

少壯人實熱下利，不宜止澀，止之則加熱悶而死，名曰壯熱斷下。

邪在表則能食，邪在裏則不能食，表裏之間者欲食而不能食。今傷寒厥深，下利服脈，當不能食而反能食者，名曰除中，中之胃氣既除，豈可再復？

## ㈡泄瀉證治

濡瀉卽濕瀉，腸垢卽熱瀉，鴨溏卽寒瀉虛瀉滑瀉。大要熱者小便赤澀，煩渴，腹中熱，穀或不化而色變青黃或黃赤黑，身能動作聲響亮，手足溫寒者，小便清白不渴腹中冷，完穀色亦不變，變亦白色身懶動作，目睛不了了，飲食不下。機要云『暴瀉非陽，久瀉非陰』正如傷寒始寒而終熱也。

濕瀉如水傾下，腸鳴身重，腹不疼。外濕者，胃苓湯除濕湯，朮附湯加茯苓，內濕者，白朮芍藥湯白朮茯苓湯二白丸。

風濕相搏者，麴芎丸。痛甚者，治痛瀉方。

風濕惡風自汗，或帶清血卽太陰飱瀉，反其所食原物，由春傷風寒，夏感冷濕發動，故其瀉暴一方，長幼相似，不可

虛者補益之。』丹溪謂:『飲食畢而腸鳴腹痛,瀉盡食物者,脾虛食泄,用理中湯加炮薑。攻刺腹痛,洞下水穀,名寒瀉,用理中湯送大戊己丸。寒甚者附子桂香丸。惡食者八物湯。糞色青黃,肛門痛,煩躁作渴,小便不利者,名熱瀉,用五苓散香連丸。瀉而惡食氣噫腐臭,名食瀉,治中湯加砂仁,或送感應丸。』

若傷冷食不消,腹痛溏泄,枳朮丸加半夏薑製一兩,縮砂乾薑神麴各炒,大麥芽各五錢。

註:按前證若傷性熱之物者,二陳加黃連山楂;傷濕麪之物者,二陳加神麴麥芽;傷米食者,六君加穀蘗;傷麪食者,六君加麥蘗;傷肉食者六君加山楂;傷魚腥者六君倍加陳皮;傷角黍炊飯者,六君倍加酒麴。若物已消而瀉未愈者,此脾胃受傷也,宜六君子湯。若飲食減少,或食而難化者,屬脾胃虛寒,加炮薑木香肉果,不應加五味吳茱萸補骨脂。脾腎虛寒者須服八味丸,否則多患脾虛中滿之證。其神麴麥芽,雖助戊土以腐熟水穀,麥芽一味。余嘗以治婦人喪子,乳房脹痛欲成癰者,用一二兩炒熟煎服,即消,其破血散氣可知矣。丹溪云:『麥芽消腎。』婦人良方云:『神麴善下胎,』皆剋伐之功多而補益之功少,亦不宜輕用。

## 李梴醫學入門

### ㈠寒熱表裏證治

傷寒無汗,寒熱相搏,而有汗不能週身,惟在頭也,背強者,表不利也,證與風濕相似,滲濕湯主之。帶表,五積交加散,裏寒,理中湯加附子。寒多浮腫,朮附湯妙。陽證自利溏泄,身熱,臍下亦熱,作渴尿赤,後重,泄下黃赤,故曰腸垢。陰證自利,太陰手足溫,少陰厥陰手足厥冷,臍下亦冷,不渴,利下清白,故曰鴨溏。熱因表邪入裏,挾風則所下必暴,寒乃直中陰經。大法熱宜和解,或攻泄,或利,小便寒宜溫中,或固下焦,俱不宜發汗,令胃氣虛而脹滿作。但自利,舊分陽

腎虛色慾所傷[illegible]

安腎丸，金鎖正元丹養氣丹。陰虛者，腎氣丸。

肝虛忿怒所傷，木剋脾土，門戶不束，厥而面青，當歸厚朴湯，或熟料五積散，去麻黃。汗多者，黃芪建中湯。凡瀉脈細皮寒，前後瀉利，飲食不入，是謂五虛，不治。滑瀉久不止，大孔如竹筒，直出無禁，氣陷者，升陽補胃湯，補中益氣湯加白芍，有風者，小白朮湯，挾熱者，訶子散，沒石子丸，或古萸連丸，罌粟殼煎湯下。氣欲脫者，眞人養臟湯，加附子，或四柱散，大斷下丸，古蔻附丸，香茸丸。婦人四製香附丸。又有大腸滑瀉，小便精出者，萬全丸。

交腸瀉者，大小便易位而出，此因氣不循故道，清濁混淆所致，當分利陰陽，使氣順各安其位，胃苓湯，木香勻氣散，腎氣丸。

## (三)總論治法

凡瀉皆兼濕，初宜分理中焦，滲利下焦，久則升提，必滑脫不禁，然後用藥澀之。其間有風勝，兼以解表，寒勝兼以溫中，滑脫澀住，虛弱補益，食積消導，濕則淡滲，陷則升舉，隨證變用，而不拘於次序，與痢大同。且補虛不可純用甘溫，太甘則生濕，清熱亦不可太苦，太苦則傷脾。每兼淡劑利竅爲妙。

抑考難經云：『胃泄，飲食不化，色黃；脾泄，腹脹嘔逆，言瀉也。大腸泄，食已窘迫，色白腸鳴切痛；小腸泄，溲而便膿血，小腹痛；大瘕泄，裏急後重，數至圊而不能便，莖中痛，而溺澀，言痢也。』觀此瀉與痢，亦惟膿血與糞之異。除傷寒三陽三陰傳變自利，雜病濕熱食積之根，皆責腸胃。蓋泄瀉瘧痢同由暑月飲食所致，輕者便作泄瀉，重者停爲瘧痢，痰衝胃脅則爲瘧，積滯腸胃則爲痢。局方分難經五瀉者，不免失之牽強。

# 李中梓醫宗必讀

溫澀，以致變爲痢脹。要知四季脾受風濕，亦名飧瀉，春宜古蒼防湯蒼芎湯，夏宜二香散，秋宜神朮散，冬宜不換金正氣散微汗之。稍久者三白湯麴芎丸，帶血虛者胃風湯。

寒瀉惡寒身痛腹脹切痛雷鳴鳴溏清冷完穀不化，甚則脾敗肢冷，理中倍加茯苓厚朴，治中湯加砂仁或大巳寒丸。又有一種臟冷以熱手按之則緩者四柱散古薑附湯。

暑瀉如水，煩渴尿赤暴瀉。實者，藿苓湯加黃連車前子，或桂苓甘露飲。虛者，六和湯，清暑益氣湯。有潮熱者，柴苓湯升麻葛根湯，日久香連丸黃連阿膠丸來復丹。

食瀉食積痛甚，瀉後痛減，臭如抱壞雞子，噫氣作酸，須先消剋所傷之物。傷冷食者，感應丸平胃散加香附砂仁草果山楂麥芽，傷熱食及酒者，二黃丸加神麯。傷酒晨瀉者，理中加生薑乾葛或香茸丸。熱者，酒蒸黃連丸。傷麪者，人參養胃湯加蘿蔔子。傷水飲者，五苓散溫六丸。

七情瀉，腹常虛痞，欲去不去，去不通泰，藿香正氣散加丁香砂仁良薑，或木香勻氣散，七氣湯，古萸連丸，調其氣而瀉自止。

痰瀉，或瀉不瀉，或多或少，此因痰流肺中，以致大腸不固，二陳湯加白朮神麴。實者海青丸，虛者六君子湯。

火瀉，實火，口渴喜冷，痛一陣瀉一陣，肛門焦痛，其來暴速，稠粘，五苓散去桂加黃連芍藥，或黃芩湯加木通六一散。兼嘔者加薑汁。火性急，米穀不化者，薑汁炒黃連爲丸服。虛火氣虛不能泌別水穀者，衛生湯。陰虛火動不能凝聚者，三白湯斂之。久者升陰丸。

虛瀉，倦無力，脾虛，飲食所傷，有遇飲食即瀉者，四君子湯加木香砂仁蓮肉陳糯米爲末，砂糖湯調服。久者，只加升麻白芍或平胃蒜肚丸。有停蓄飲食數日乃瀉，腹脹者名滾瀉，枳朮丸沒石子丸。煩渴或兼嘔者，錢氏白朮散，參

胃泄，飲食不化，色黃，承氣湯。脾泄，腹脹滿泄注，食卽嘔吐，建中湯；理中湯、大腸泄食已窘迫大便色白，腸鳴切痛，乾薑附子湯。小腸泄溲而便膿血，少腹痛，承氣湯。大瘕泄，裏急後重，數至圊而不能便，莖中痛，承氣湯。

㈢泄證有七

腎泄者，五更溏泄，久而不愈，是腎虛失閉藏之職也，五味子散。亦有食積者，香砂枳朮丸。寒積，理中湯，宜夜飯前進。酒積，葛花解醒湯。

鶩泄者，中寒，糟粕不化，色如鴨糞，澄澈清冷，小便清白，附子理中湯。

飱泄者，水穀不化而完出也。史記名迵風。風邪干胃，木來賊土，清氣在下，升陽除濕湯。

洞泄，一名濡泄，瀉下多水也、胃苓湯。水液去多，甚而轉筋，血傷故筋急也，升陽除濕湯。

痰泄者，痰留於肺，大腸不固，脈必弦滑，以藥探吐，其人神必不瘁，色必不衰，或二陳湯加蒼朮木香。

火泄者，腹痛瀉水，腸鳴，痛一陣，瀉一陣，火也。黃芩芍藥湯。張長沙謂之協熱自利。

直腸泄者，食方入口而卽下，極爲難治，大斷下丸。

㈣脈候

胃脈虛則泄，脈滑，按之虛者，必下利。腎脈小甚爲洞泄，肺脈小甚爲泄泄，脈洪大者逆。下利日十餘行，脈反實者死。腹鳴而滿，四肢清泄，其脈大者十五日死。腹大脹，四末清脫，形泄甚，不及一時死。下則泄瀉，上則吐痰，皆不已，爲上下俱脫死。

㈠治法有九

愚按：內經之論泄瀉，或言風，或言濕，或言熱，或言寒，此明四氣皆能爲泄也。又言清氣在下則生飧泄，此明脾虛下陷之泄也。統而論之，脾土強者，自能勝濕，無濕則不泄，故曰濕多成五泄。若土虛不能制濕，則風寒與熱皆得干之而爲病，治法有九：

一曰淡滲：使濕從小便而去，如農人治澇，導其下流，雖處卑監，不憂巨浸。經曰：『治濕不利小便，非其治也。』又云：『在下者引而竭之』是也。

一曰升提：氣屬於陽，性本上升，胃氣注迫，輒爾下陷，升柴羌葛之類，鼓舞胃氣上騰，則注下自止。又如地上淖澤，風之即乾，故風藥多燥，且濕爲土病，風爲木藥，木可勝土，風亦勝濕，所謂下者舉之是也。

一曰清涼：熱淫所注，暴注下迫，苦寒之劑，用滌燔蒸，猶當溽暑伊鬱之時，而商飆颯然倏動，則炎歊如失矣，所謂熱者清之是也。

一曰疏利：痰凝氣滯，食積水停，皆令人瀉，隨證祛逐，勿使稽留。經曰：『實者瀉之』，又云：『通因通用』是也。

一曰甘緩：瀉利不已，急而下趨，愈趨愈下，泄何由止？甘能緩中，善禁急速，且稼穡作甘，甘爲土味，所謂急者緩之是也。

一曰酸收：瀉下日久，則氣散而不收，無能統攝，注泄何時而已？酸之一味，能助收肅之權，經云：『散者收之』是也。

一曰燥脾：土德無慚，水邪不濫，故瀉皆成於土濕，濕皆本於脾虛，倉廩得職，水穀善分，虛而不培，濕淫轉甚，經云：『虛者補之』是也。

一曰溫腎：腎主二便，封藏之本，然雖屬水，眞陽寓焉。少火生氣，火爲土母，此火一衰，何以運行三焦，熟腐五穀乎？故

# 醫部彙考二百五十四

## 泄瀉門三

### 明張三錫醫學準繩六要

㊀論泄瀉

脾虛不能分別清濁則瀉，或食物過度，飲酒無節，運化不及而然。河間悉指爲濕熱，恐未爲至論也。夏月人多瀉者，濕熱太盛，泉水泛溢，脾土受虧，又餐瓜果肉麪，清濁混淆，甚則爲霍亂也。老年病後瀉久，必足趺眼胞及手作腫，脾敗之象

河間辨別寒熱，黑白分明，可謂確論矣。大都以脈之遲數，口之渴否定寒熱，日之新久，腹中痛否定虛實，猶爲切當。

謹按泄瀉之病，濕火痰虛暑積風冷八者之殊，必以滲濕燥脾爲主，而隨證加減，濕則導之，火則清之，寒則溫之，虛則補之，痰則豁之，暑則驅之，積則消之，風則解之，是其大法也。雖然，八證之明，三虛宜辨，三虛者何？脾虛肝虛腎虛是也。脾虛者，飲食所傷也。肝虛者，忿怒所傷也。腎虛者，色慾所傷也。飲食傷脾，不能運化，色慾傷腎，不能閉藏，忿怒傷肝，木邪尅土，皆令泄瀉。然腎瀉肝瀉，間或有之，惟脾瀉恒多耳。蓋人終日飲食，一或有傷，便致泄瀉。又常論之，泄瀉瘧痢，同乎一源，多由暑月傷脾所致，飲食纔傷，便作泄瀉爲輕。停滯既久，則瘧痢爲重。而瘧與痢又有分別，飲食

十餘斤而愈；治積痰在肺，致其所合大腸之氣不固者，湧出上焦之痰，則肺氣下降，而大腸之虛自復矣；治憂思太過，脾氣結而不能升舉，陷入下焦而成泄瀉者，開其鬱結，補其脾胃，使穀氣升發也；治陰虛而腎不能司禁固之權者，峻補其腎而愈也。凡此之類甚多，因問先生治病何神也？先生無他，圓機活法，內經熟之自得矣。

經曰：『腎主大小便，』又曰：『腎司開闔，』又曰：『腎開竅於二陰，』可見腎不但主小便，而大便之能開能閉者，腎操權也。今腎既虛衰，則命門之火熄，火熄則水獨治，故令人多水瀉不止，其瀉每在五更天將明時，必洞瀉二三次，何也？蓋腎屬水，其位在北，於時爲亥子，五更之時正亥子水旺之秋，故特甚也。惟八味丸以補眞陰，則腎中之水火既濟，而開闔之權得宜。況命門之火旺，火能生土，而脾亦強，故古方有椒附丸，五味子散，皆治腎瀉之神方也。考之薛按云：『脾胃虛寒下陷者，用補中益氣湯加木香肉果補骨脂，若脾氣虛寒不禁者，用六君子湯加炮薑肉桂，若命門火衰脾土虛寒者，用八味丸，若脾腎氣血俱虛者，用十全大補湯吞四神丸，若大便滑利，小便閉塞，或肢體漸腫，喘嗽唾痰，爲脾腎虧損，宜金匱加減腎氣丸。

## 醫門法律 臣喻昌著

### (一)論飧泄

問：『逆秋氣則傷肺，冬爲飧泄，與春傷於風，夏生飧泄有別否？』曰：『傷風而飧泄，以風爲主，風者，東方木也；傷肺而飧泄，以肺爲主，肺者，西方金也。其候各異，安得比而同之？風邪傷人，必入空竅，而空竅惟腸胃爲最，風既居於腸胃，其導引之機，如順風揚帆，不俟脾之運化，食入即出，以故飧已即泄也。不知者以爲脾虛，完穀不化，如長夏洞泄寒中及冬月飧泄之泄，反以補脾剛燥之藥，助風性之勁，有泄無已，每至束手無策，儻知從春令治之，用桂枝領風，

爲痰，充乎胸臆則爲瘧，飲食爲積，膠乎腸胃則爲痢。古云：『無痰不成瘧，無積不成痢，』良有以也。王節齋曰：『瀉本屬濕，多因飲食不節，致傷脾胃而作，須看時令寒熱新久而治。大法滲濕補脾，消導分利爲主。有宜升提下陷之氣者，有用風藥以勝其濕者，又有腸胃虛滑不禁，宜收澀者，不可不知。久瀉不止，加破故紙，肉豆蔻山藥佳。

## 趙獻可醫貫

### (一)論泄瀉

秦越人難經有五泄之分：曰胃泄，曰脾泄，曰大腸泄，曰小腸泄，曰大瘕泄。夫所謂大瘕泄者，即腎泄也，註云：裏急後重，數至圊而不能便，莖中痛。世人不知此證，誤爲滯下治之，禍不旋踵，即今所謂痢疾也。此是腎虛之證，欲去不去，似痢非痢，似虛努而非虛努，蓋痢疾後重爲因邪壓大腸墜下，故大腸不能升舉而重，治以大黃檳榔輩，瀉其所壓之邪而愈。又有久瀉，大腸虛滑，元氣下陷，不能自收而重，乃用粟殼等澀劑以固其脫，升其墜而愈。其虛坐努責，此痢後積已去盡，無便而但虛坐耳，此爲亡血過多，倍用歸芎以和之而愈。惟腎虛後重者，亦數至圊而不能便，必莖中痛，或大便不能得，而小便先行而澀，或欲小便而大便反欲去而痛。獨褚氏精血論中云：『精已耗而復竭之，則大小便道牽痛，愈痛則愈便，愈便則愈痛，須以補中益氣湯，倍升麻，送四神丸，又以八味地黃丸料，加五味吳茱萸，補骨脂肉豆蔻多服乃效。』此等證候以痢藥致損元氣，肢體腫脹而斃者，不可枚舉。腎既主大小便而司開闔，故大小便失職者責之腎。

臟腑瀉利，其證多端，大抵皆因脾胃而作。東垣先生製脾胃論一篇，專以補中益氣湯，升提清氣爲主，其間治脾瀉之證無遺蘊矣，特未及乎腎瀉也。是故以其濕也，利水以分之；以其風也，助風以平之；以其實也下之；以其虛也

擧動輕捷者，此多陽也。虛寒之證，必其脈息無力，形氣少神，言語輕微，擧動疲倦者，此多陰也。故必察其因而於初瀉之時，卽當辨其有餘不足，則治無不愈，而亦不致有誤矣。

㈡分利治法

凡泄瀉之病，多由水穀不分，故以利水爲上策。然利水之法不同，如濕勝無寒而瀉者，宜四苓散，小分淸飲之類主之，但欲分其淸濁也。如濕挾微寒而瀉者，宜五苓散，胃苓湯之類主之，此以微溫而利之也。如濕熱在脾，熱渴喜冷而瀉者，宜大分淸飲，茵陳飲，益元散之類主之，此去其濕熱而利之也。

泄瀉之病，多見小水不利，水穀分則瀉自止，故曰治瀉不利小水，非其治也。然小水不利，其因非一，而有可利者，有不可利者，宜詳辨之。如濕勝作瀉，而小水不利者，以一時水土相亂，倂歸大腸而然；有熱勝作瀉而小水不利者，以火乘陰分，水道閉澀而然；有寒瀉而小水不利者，以小腸之火受傷，氣化無權而然；有脾虛作瀉而小水不利者，以土不制水，淸濁不分而然；有命門火衰作瀉而小水不利者，以眞陰虧損，元精枯涸而然。凡此皆小水不利之候。然惟暴注新病者可利，形氣強壯者可利，酒濕過度，口腹不愼者可利，實熱閉塞者可利，小腹脹滿水道痛急者可利。又若病久者不可利，陰不足者不可利，脈證多寒者不可利，形虛氣弱者不可利，口乾非渴而不喜冷者不可利，蓋虛寒之瀉本非水有餘，實因火不足，本非水不利，實因氣不行。夫病不因水而利則亡陰，瀉以火虛而利復傷氣，倘不察其所病之本，則未有不愈利愈虛，而速其危者矣。

㈢諸瀉論治

泄瀉之暴病者，或爲飲食所傷，或爲時氣所犯，不由於口腹，必各有所因，宜察其所因而治之。如因食生冷寒滯者，宜抑扶煎，和胃飲之屬以溫之；因濕滯者，宜平胃散，胃苓湯或白朮芍藥散以燥之利之；因食滯而脹痛有餘者宜

從肌表而出，一二劑而可愈也。而秋月之傷肺，傷於肺之燥也，與秋傷於燥，冬生欬嗽，同是一病，但在肺則爲欬嗽，在大腸則爲飧泄，所謂肺移熱於大腸，久爲腸澼者，即此病也。但使肺熱不傳於大腸，則飧泄自止。不知者，惟務止泄，以燥益燥，吾目中所見諸大老之誤，歷歷可指也，寃哉！

逆秋氣則太陰不收，肺氣焦滿，冬爲飧泄，蓋肺熱葉焦爲脹滿也。肺傷則腎水失其所生，故當冬令而爲腎虛飧泄。飧泄者，水穀不分而寒泄也。

## 景岳全書　臣張介賓著

### ㈠論證

凡內經有言飧泄者，有言濡泄者，皆泄瀉也。有言腸澼者，即下痢也。然痢之初作，必由於瀉，此瀉之於痢，本爲同類，但瀉淺而痢深，瀉輕而痢重，瀉由水穀不分，出於中焦；痢以脂血傷敗，病在下焦。在中焦者，濕由脾胃而分於小腸，故可澄其源，所以治宜分利。在下焦者，病在肝腎大腸，分利已無所及，故宜調理眞陰，幷助小腸之主，以益氣化之源。此瀉痢之證治有不同，而門類亦當有辨，然病實相關，不可不兼察以爲治也。

泄瀉之本，無不由於脾胃，蓋胃爲水穀之海，而脾主運化，使脾健胃和，則水穀腐熟而化氣化血，以行營衞，若飲食失節，起居不時，以致脾胃受傷，則水反爲濕，穀反爲滯，精華之氣不能輸化，乃致合汚下降，而瀉痢作矣。脾強者，滯去即愈，此強者之宜淸宜利，可逐可攻也。脾弱者，因虛所以易瀉，因瀉所以愈虛，蓋關門不固，則氣隨瀉去，氣去則陽衰，陽衰則寒從中生，固不必外受風寒，始謂之寒也。且陰寒性降，下必及腎，故瀉多必亡陰，謂亡其陰中之陽，所以泄瀉不愈，必自太陰傳於少陰而爲腸澼者，豈非降瀉之甚，而陽氣不升，臟氣不固之病乎？凡脾胃氣虛而有不升

補湯若痢不[illegible]

兒脾泄不止者，止用敦阜糕黏米固腸糕，亦易見效。若脾胃寒濕而溏瀉不止者，蒼朮丸亦佳。若久瀉元氣下陷大腸虛滑不收者，須於補劑中加烏梅五味子粟殼之屬以固之。

大瀉如傾，元氣漸脫者，宜速用四味回陽飲或六味回陽飲主之。凡暴瀉用此，無不即效。若久瀉者，猶恐無及，蓋五奪之中，惟瀉最急，是不可見之不早也。倘藥未及效，仍宜速灸氣海以挽回下焦之陽氣，仍須多服人參膏。

酒泄證，飲酒之人多有之。但酒有陰陽二性，人有陰陽二臟，而人多不能辨。夫酒性本熱，酒質則寒，人但知酒有濕熱，而不知酒有寒濕也。故凡飲酒而生濕熱者，因其性也，以糵汁不滋陰而悍氣生熱也。因酒而生寒濕者，因其質也，以性去質不去，而水留為寒。何以辨之？常見人有陽強氣充而善飲者，每多泄瀉，若一日不瀉，反云熱悶，蓋其隨飲隨瀉，則雖瀉不致傷氣，而得瀉反以去濕。此其先天稟厚，胃氣過人者也，最不易得，亦不多見。此而病者，是為陽證，不過宜清宜利，如四苓散、大分清飲或酒蒸黃連丸之類，去其濕熱而病可愈也。若陽虛之人，則與此大異。蓋脾虛不能勝濕，而濕勝即能生寒，陽氣因寒，所以日敗，胃氣因濕，所以日虛。其證則形容漸羸，飲食漸減，或脈見弦細，或口體常見寒，或臍腹常有隱疼，或眩運常多困倦，或不安於五鼓，或加甚於秋冬，但無熱證可據，而常多飧泄者，則總屬虛寒也。凡若此者，若不速培陽氣，必致漸衰而日以危矣。余於四旬之外，亦嘗病此數年，其勢已窘，因遍求治法，見朱丹溪曰：『因傷於酒，每晨起必瀉者，宜理中湯加葛根，或吞酒蒸黃連丸。』王節齋曰：『飲酒便泄者，此酒積熱瀉也。宜加黃連茵陳乾薑木香之屬。』薛立齋曰：『若酒濕未散，脾氣未虛，宜用此藥分利濕熱。若濕熱已去，中氣被傷，宜用六君調補中氣。』又曰：『酒性大熱，乃無形之物，無形則元氣受傷，當用葛花解醒湯分消其濕。』凡此諸論，若已盡之，然朱王二家之說，則不分寒熱，皆用黃連，是但知酒之有熱，而不知酒之有寒，烏足憑也。惟薛氏之說雖亦云酒性大熱，而所重在脾，誠若善矣。余因效之，初服葛花解醒湯，不效，繼服六君子補中益氣湯，又

大小和中飲之屬以平之。因氣滯而痛瀉之甚者，宜排氣飲或平胃散之屬以調之。因食滯而固結不散，或胃氣之強實者，宜神祐丸，赤金豆，百順丸之屬以行之。

凡初感者，病氣未深，臟氣未敗，但略去其所病之滯，則胃氣自安，不難愈也。

凡脾氣稍弱，陽氣素不強者，一有所傷，未免即致泄瀉，此雖爲初病，便當調理元氣，非強盛偶傷者之比。如因瀉而神氣困倦者，宜養中煎，或溫胃飲，或聖朮煎，或四君子湯，或五君子湯。如微寒兼滯而不虛者，宜佐關煎。若脾虛而胃滯者，宜五味異功散。若脾虛而微寒微滯，宜六味異功煎，或溫胃飲。若因飲食不調，忽而溏瀉，以漸而甚，或見微痛，但所下酸臭而顏色淡黃，便是脾虛胃寒不化之證，即宜用五德丸。再甚者，即宜用胃關煎，切勿疑也。

凡兼眞陰不足而爲泄瀉者，則或多臍下之痛，或於寅卯時爲甚，或食入已久，反多不化而爲嘔惡溏瀉，或瀉不甚臭而多見完穀等證。蓋因丹田不煖，所以尾閭不固，陰中少火，所以中焦易寒，此其咎在下焦，故曰眞陰不足也。本與中焦無涉，故非分利所及，惟胃關煎爲最上一乘。且人之患此者最多，勿謂其爲新病而不可用也，勿謂其爲年少而未宜用也。覺有是證，即宜是藥，劑少功多，攸利非小，但知者見其先，昧者見其後，見之後，恐見之遲矣，所以貴先見也。

腎泄者，即前所謂眞陰不足證也。每於五更初，或天將明時，即洞泄數次，有經月連年弗止者，或暫愈而復作者，或有痛有不痛者，何也？蓋腎爲胃關，開竅於二陰，所以二便之開闔，皆腎臟之所主。今腎中陽氣不足，則命門火衰，而陰寒獨盛，故於子丑五更之後，當陽氣未復，陰氣盛極之時，即洞泄不止也。古方有椒附丸，五味子散，皆治此之良方。若必欲陽生於陰，而腎氣充固，則又惟八味地黃丸爲宜。然余嘗用此，則似猶未盡善，故特製胃關煎，一炁丹，九炁丹，復陽丹之屬，斯得其濟者多也。或五味子丸亦佳。其有未甚者，則如五德丸，四神丸，皆其最宜者。

苓五錢，甘草二錢，山藥車前子各一兩，肉桂三分，水煎服。一劑而瀉減半，再劑而瀉止愈，後用六君子湯調治。此等證因火盛之極，挾水穀之味，一直下行，不及傳道，所以完穀而出也。若認作脾氣之虛，以止塞之，則脾益旺而勢益急矣。我乘其勢而利導之，則水氣分消，火勢自散，所以奏功能神。

大瀉之證，往往用止瀉之藥至數兩者，亦一時權宜之計，而不可執之為經久之法。

大瀉澀之始能止，瀉若過於酸收，則大腸細小矣，下不能出，又返而上，故止瀉之藥止可一時用之，而不可經久用之也。

大瀉方用白朮茯苓各一兩，肉桂五分，澤瀉猪苓各三錢，一劑即止瀉。更有腎經作瀉，五更時痛下七八次者，亦用八味地黃湯一料，煎湯二碗，與服，當日即減大半，二服愈，四服全愈。

大瀉之後，必多亡陰，亡陰既多，則元陽亦脫，若不急為收止，則陰絕陽亡，可立而待，法當用止塞之品。或疑邪未去盡，如何止住，其水萬一邪居中州，則腹心之患，不可不慮。其言則是，其理則非。吾言大瀉者，乃是純下清水，非言下痢也。痢無止法，豈瀉水亦無止法乎？故人患水瀉者，急宜止遏，方用白朮五錢，茯苓二錢，車前子北五味酸棗仁各一錢，吳茱萸五分，水煎服。此方止藥少於補藥，健脾去濕，水性分消，不收而自收也。若純以粟殼之類以澀止之，而不分消其滔天之勢，則阻滯一時，勢必潰決，反生大害矣。

水瀉者，人見其如潮而來，如瀑而下，皆曰宜急止之，以免亡陰之證，用粟殼烏梅之類止之，其論則是，其治則非也。

水瀉雖不比痢疾之斷不可止，然而水瀉之中，亦有不可遽止之病。如腹疼肛重，皆是有火，不比虛寒之瀉也，當用通因通用之法治之。方用人參白芍各三錢，檳榔車前甘草各一錢治之。此方之妙，在車前以滑之，而佐以檳榔之去積，自然有滯皆行。况車前性雖滑，而能分消水穀，則水氣自然分開，第大瀉之後，自然亡陰，又用人參以補氣，則

不效；再服理中八味，俱不效；斯時也，計窮力竭，若無再生之望矣。因潛思熟計，料非峻補命門，終無益也。乃服自製胃關煎右歸丸一炁丹等方，仍絕口不飲，以杜其源，調理年餘，竟得全愈。自後始明性質之理，多得濟人。向使已無確見，執濕熱之說，而妄用黃連乾葛清涼分利之劑，焉望其有今日？即或自用稍遲，則既甚亦難挽矣。矧今人之病此者最多，而是陰是陽，不可不辨。凡陽盛者，脾強胃健而氣不易奪者，故治本無難，而泄亦無慮。陽衰者脾腎既傷，則脫氣最易，故宜防其無及，不可不爲深慮也。若必以酒爲熱，則其爲古法所誤者，誠不少矣。

氣泄說，凡遇怒氣便作泄瀉者，必先以怒時挾食，致傷脾胃，故但有所犯，卽隨觸而發，此肝脾二臟之病也。蓋以肝木尅土，脾氣受傷而然。使脾氣本強，卽有肝邪，未必能入，今既易傷，則脾氣非強可知矣。故治此者，當補脾之虛而順肝之氣，此固大法也。但虛實有微甚，則治療宜分輕重也。如稟壯氣實年少，而因氣泄瀉者，可先用平胃散或胃苓湯。若肝氣未平而作脹滿者，宜解肝煎先順其氣。若脾氣稍弱者，宜二朮煎或黏米固腸糕，或消食導氣飲。若脾稍寒者，宜抑扶煎吳茱萸散或蒼朮丸。若脾弱居多者，宜溫胃飲，聖朮煎，或六味異功煎，此證必須切戒怒氣

風泄證，亦當辨其風寒風熱而治之。熱者，如傷寒外感熱利之屬是也，宜以傷寒門自利條諸法治之。寒者，以風寒在胃，而脾土受傷，如內經所云『春傷於風，夏爲飧泄』之屬是也，宜以前溫胃理中之法治之。

## 石室祕錄　臣陳士鐸著

### (一) 泄瀉治法

脾經之病，如水瀉乃脾氣不溫，用白朮一兩，車前五錢，二味煎湯，服之立效。蓋水瀉者，乃一時水氣侵脾，故傾腹而出，用白朮以利腰臍之氣血，用車前以分消其水勢，白朮車前利腰臍而消水勢是矣。然而白朮亦能健脾，脾健水

海口而下者不急用大劑治之而尚王道之遲遲鮮不敗乃事矣方當用大黃一兩人參二兩黃連車前子各五錢，甘草一錢水煎服。此方之奇全在用大黃，既已火瀉何反助其威？不知火瀉之證乃火留於腸胃之間，若不因勢利導，則火不去而水不流，故必用大黃以利之也。然徒用大黃而不多用人參，有攻無補，反致損傷眞氣矣。至方中又加甘草者，恐大黃過於猛迅，用此緩之也。更用車前者，分消其水勢也。水不入於膀胱，則大腸增勢而添流，今得車前自然引水歸於故道，又何至陸地爲水鄉哉？此又霸治之妙法也。

## 方一

(一)香茸丸 普濟方 治飲酒成泄，骨立不能食，但飲酒卽泄。

嫩鹿茸酥炙，肉蓯蓉煨各一兩。麝香五分另研。右爲末，陳白米飯丸梧子大，每米飲下五十丸。

(二)大承氣湯 仲景下同 治下利，心下堅而脈實者。

大黃四兩酒洗，厚朴半斤炙去皮，芒硝三合，枳實五枚炙。右四味，以水一斗，先煮二物取五升，去滓，內大黃煮取二升，去滓，內芒硝更上火微煎一二沸，分溫再服，得下止服。

(三)小承氣湯 治下利譫語，此有燥屎也。

大黃四兩，厚朴三兩炙，枳實大者三枚炙。右三味；以水四升，煮取一升二合，去滓，分溫二服，得利則止。

(四)梔子豉湯 治下利後更煩，按之心下濡者，爲虛煩也。

梔子十四枚，香豉四合綿裹。右二味以水四升，先煮梔子得二升半，內豉煮取一升半，去滓分二服，溫進一服，得吐則止。

氣足而陰自生。又慮久瀉，自然虧中，又加甘草以和之，雖是通因通用之法，實乃扶正之方也。

大瀉之後雖是火瀉，畢竟宜溫補之，以生其陰，瀉一止，即宜用四物湯加人參炮薑以溫補，而不可謂水瀉忌滑而禁用歸熟也。

陽證之火瀉也，完穀不化，飲食下喉即出，一日或瀉十餘次，或數十次，或晝夜數百次，人以為熱也，然而熱之生生於腎中之水衰不能制火，使胃土關門不守於上下也。論其勢之急迫奔騰，似乎宜治其標，然治其標，不能使火之驟降，必須急補腎中之水，使火有可居之地，而後不致於上騰。方用熟地白芍各三兩，山萸車前甘草茯苓各一兩，肉桂三分，水煎服。此方乃補腎之湯，非止瀉之藥也。然而止瀉之妙，捷如桴鼓，蓋腎水一生，腎火即降，頃刻應驗，非好為奇談而不據實理也。若止作胃虛有火治之，未嘗無功，終不若此之捷。脾約丸亦佳，安能及此方之神哉？

凡人大便溏泄，小便艱澀，乃由氣虛身子羸弱，飲食不進，方用人參一兩，茯苓三錢，白朮五錢，陳皮甘草澤瀉車前子各一錢，水煎服，此乃病欲下行，隨其性而下補之也。方用人參為君者，開其胃氣，胃為腎之關，關門不開，則上之飲食不能入，下之糟粕不能出，妙在用人參以生胃土，而茯苓車前能分消水穀也。且胃之性最喜溫和，不喜過濕，濕則必上壅而嘔，下積而瀉矣。今順土之性而溫補之，則飲食自進，而大小便各安其位矣。此方生胃土以消水穀，誰曰不然？然而不止生胃土也，且能健脾，脾健則胃氣益開，而脾氣益壯。方中最妙用白朮也，白朮上利胃而下健脾，且能祛濕以生腎，有此大功，則大小便得脾腎之氣，而能開能闔，下既通達，又何患飲食之不進乎？吾見其飽餐而無礙也。若服前方而不愈者，兼服八味丸以補土母，蓋八味丸最能實大腸利膀胱也。

大瀉之後，自多亡陰，宜以補陰藥治之。然而以補陰之藥治之，反足增其水勢，法當以溫藥補之，用熟地白朮人參薑二各五兩，山藥山茱萸各四兩，肉桂肉果北五味吳茱萸各一兩，各為末，蜜丸如梧子大，每日晚飯前吞五錢，旬日即[illegible]，此方之妙，不用[illegible]補脾，而[illegible]治勝於急

㈡訶黎勒散　治氣利。

訶黎勒十枚煨　右一味爲散，粥飲和頓服。

㈢黃蘗止洩湯千金方　治下焦虛冷，大小便洞泄不止。

黃蘗，人參，地榆，阿膠各三兩。黃連五兩　茯苓　欅皮各四兩。艾葉一斤。右八味㕮咀，以水一斗，煑取三升，去滓，下膠消分三服。

㈣調中益氣湯東垣十書下同　治夏月飧泄，米穀不化。

黃芪一錢，人參，甘草，蒼朮各五分。柴胡，橘皮，升麻各二分，木香一分或二分。右件剉麻豆大，都作一服，水二大盞，煎至一盞，去柤，帶熱宿食消盡服之，甯心絕思，藥必神效。蓋病在四肢血脈，空腹在旦是也。嗽者，減人參。

㈤升陽除濕防風湯　治前證。

蒼朮泔浸去皮淨四兩，防風二錢，白茯苓，白朮，白芍藥各一錢。右件㕮咀。除蒼朮另作片子，水一椀半，煑至二大盞，內諸藥同煎至一大盞，去柤，稍熱服，空心食前。

㈥又方　治大人小兒風冷乘虛入客腸胃，水穀不化，泄瀉注下，腹脅虛滿，腸鳴㽲痛，及腸胃濕毒，下如豆汁，或下瘀血，日夜無度，並宜服之。

人參，白茯苓，芎藭，當歸，桂，白芍藥，白朮各等分。右爲麤散，每二錢，水一大盞，入粟米數百粒，同煎至七分，去柤，稍熱服，空心食前。小兒量力減之。

㈦扶脾丸　治脾胃虛寒，腹中痛，溏瀉無度，飲食不化。

㈤通脈四逆湯　治下利淸穀，裏寒外熱，汗出而厥者。
附子大者一枚生用，乾薑三兩，強人可四兩　甘草二兩炙。　右三味，以水三升，煮取一升二合，去滓，分溫再服。

㈥黃芩湯　治乾嘔下利。
黃芩，　人參，　乾薑各三兩。　大棗十二枚，　桂枝一兩，　半夏半升。　右六味，以水七升，煮取三升，分溫三服。

㈦養胃丹 中藏經下同　治脾胃不和，全不思食，中脘停寒，嘔逆惡心，臟寒泄痢，腹痛腸鳴，常服溫中養胃散飲思食。
人參三分，　丁香一兩半，　甘草炙，　白豆蔻仁，　半夏麴，各半兩。　乾薑三兩炮，用乾生薑尤佳。　右同爲細末，煉蜜爲丸，每兩作十丸，每服一丸，溫湯化下，空心食前服之，或細嚼湯下亦可。

㈧炙肝散　逐胃中風邪，益脾進食，凡人虛弱，用補藥日久，漸至瘦損，食少倦怠，大便頻數，泄漏，服此無不取效。
白朮，　白芍藥，　白芷，　桔梗，各四兩。　右各生爲細末，用不入水豶豬肝五兩，作小片子或塊子，拌藥十五錢，細切，葱白二寸，鹽一錢，同拌肝令勻，以竹簽子作串，慢火炙香熟，啖之，米飲送下，空心食前各一服。渴勿喫冷水，半月必安。

㈨黃連丸 千金方下同　治上焦冷，下痢，腹內不安，食好注下。
黃連，　烏梅肉，各八兩。　桂心二兩，　乾薑，　附子，　阿膠，各四兩。　櫸皮，　芎藭，　黃蘗，各三兩。　右九味，各爲末，蜜丸如梧子大，飲下二十丸，加至三十丸。

㈩黃連煎　治中焦寒洞泄下利，或因霍亂後，瀉黃白無度，腹中虛痛。

㊂加味五苓湯 治伏暑熱二氣[illegible]

赤茯苓，澤瀉，猪苓去皮，肉桂不見火，白朮各一兩。車前子半兩。右㕮咀，每服四錢，水一盞半，生薑五片，煎至八分，去滓，温服，不拘時候，或進來復丹亦可。

㊃火輪丸 治腸胃虛寒，心腹疼痛，泄瀉不止。

乾薑炮，附子炮去皮臍，肉豆蔻麪裹煨。右等分，爲細末，米糊爲丸如梧桐子大，每服五十丸，空心米飲送下。

㊄白朮附子湯 治腸胃虛濕，腸鳴泄瀉，或多自汗。

白朮二兩。附子炮，茯苓各一兩。右㕮咀，每服四錢，水一盞半，生薑七片，棗子一枚，煎至七分，去滓，温服，不拘時候。

㊅禹餘糧丸 治腸胃虛寒，滑泄不禁。

禹餘糧石煆，赤石脂煆，龍骨，訶子麪裹煨，華茇，乾薑炮，肉豆蔻麵裹煨，附子炮去皮臍。右等分爲細末，酢糊爲丸如梧桐子大，每服七十丸，米飲送下，食前。

㊆加味治中湯 治脾胃不足，飲食不節，過食生冷，腸鳴腹脹，泄瀉注下。

乾薑炮，白朮，青皮，橘紅，縮砂仁，各一兩。人參，甘草炙各半兩。右㕮咀，每服四錢，水一盞半，生薑五片，棗子一枚，煎至七分，去滓，温服，不拘時候，或兼進感應丸，

㊇薑麴丸丹溪下同 止瀉。

隔年陳麥麪作麴，二兩炒，二兩生。茴香五錢，生薑二兩煨，一兩生。右爲末，用前生麯打糊爲丸，每服五七錢，白湯下。

㊈又方 治前證。

大麥蘗炒，神麴炒各四錢。乾薑，藿香，紅豆，各一錢。白朮，茯苓，橘皮，半夏，訶子皮，炙甘草，烏梅肉各二錢。乾生薑　肉桂各五分。右爲細末，荷葉燒飯爲丸如梧子大，每服五十丸，白湯送下，食前。

⑱黃芪補胃湯　治一日大便三四次，溏而不多，有時作泄，腹中鳴，小便黃。

黃芪，柴胡，當歸身，益智，橘皮各三分。升麻六分，炙甘草二錢，紅花少許。右㕮咀，都作一服，水二盞，煎至一盞，去柤稍熱，食前服之。

⑲升陽除濕湯　治自下而上者，引而去之。

蒼朮一錢，柴胡，羌活，防風，升麻，神麴，澤瀉，猪苓，各五分。炙甘草，陳皮留白，麥蘗麴，各三分。

右作一服，水二盞煎至一盞，去柤，空心服之。

⑳沉香温胃丸　治中焦氣弱，脾胃受寒，飲食不美，氣不調和，臟腑積冷，心腹疼痛，大便滑泄，腹中雷鳴，霍亂吐瀉，手足厥逆，便利無度。

附子炮去皮臍，巴戟酒浸去心，乾薑炮，茴香，各一兩。官桂七錢，沉香，甘草炙，當歸，吳茱萸洗炒去苦，人參，白朮，良薑，白芍藥，白茯苓，木香，各五錢。丁香三錢。右爲細末，用好酢打麪糊丸如梧子大，每服五七十丸，飲下，空心食前，日進三服，忌一切生冷物。

㉑薑附赤石脂硃砂丹　治虛寒泄利。

生附子，生乾薑，各半兩。硃砂一兩另研。赤石脂一兩半，水飛。右爲細末，酒糊丸如黑豆大，每服十五丸，至二三十丸，米飲湯下，茯苓煎湯下尤妙。

㉒胃風湯　治腸胃不足，風冷乘之，水穀不化，泄瀉注下，腹中虛滿，及腸胃受濕，下如豆汁，或下瘀血，

破故紙炒四兩，肉豆蔻二兩生　右爲末以大肥棗四十九箇生薑四兩切同煮[illegible]
丸每五十九，鹽湯下。

㊲參苓白朮散　治脾胃虛弱，飲食不進，或致嘔吐泄瀉，及大病後調助脾胃。

白茯苓，山藥，人參　白朮各二斤。扁豆炒，蓮子，砂仁，薏苡仁　桔梗炒黃色各一斤。甘草炙三斤。

右爲末，每服二錢，煎棗湯調下。

㊳對金飲子寶鑑下同　治瀉利。

草豆蔻麪裹煨，平胃散各五錢。五苓散二錢半。　右相合作四服，水一盞半，薑三片，棗二箇，煎一盞，去柤，温服，食前。

㊴加減木香散　治瀉利。

木香，高良薑，升麻，人參，檳榔各二錢半。神麯炒二錢，吳茱萸炮，肉果煨，縮砂仁，乾薑炮，陳皮各五分。　右十一味爲粗末，每服四錢，水一盞半，煎至一盞，去柤，温服，食前宜加白朮。

㊵南白膠香散　治脾胃虛寒，滑腸久瀉，臍腹疼痛無休止。

米殼四兩醋炒，龍骨，南白膠香各三兩。甘草七錢炙，乾薑半兩炮。　右五味爲粗末，每服五錢，水一盞半，煎至一盞，去柤，温服，食前。忌冷物傷胃。

㊶玉粉散　治冷極泄瀉久作，滑腸不禁，不思飲食，宜服神效。

紅豆揀淨，大附子炮去皮臍，乾薑炮各半兩。舶上硫黃另研二錢半。　右四味爲末，入研藥勻，每服二錢，空心半稀半稠粟米飲下。至晚又一服，重者十服必效，輕者三五服安。

㊷附子温中湯　治中寒腹痛自利，水穀不化，脾胃虛弱，不喜飲食，懶言語，困倦嗜臥。

滑石水飛，夏二兩半，秋二兩，春冬一兩二錢半。　肉豆蔻五兩。　右爲末，飯丸或水調服。

㊂清六丸　去三焦濕熱，治泄瀉，多與清化丸同用，並不單用。兼治產後腹痛或自利者，能補脾補血，亦治血痢。

六一散一料，　紅麴炒半兩。　右爲末，飯丸梧子大，每五七十丸白湯下。一方紅麴二兩半。

㊂大已寒丸　治脾胃虛寒泄瀉。

蓽茇，　肉桂各四兩。　乾薑炮，　高良薑各六兩。　右爲末，水煮麪糊丸梧子大，每三十丸，空心米飲吞下。

㊂八味湯　治命門陽虛泄瀉。

吳茱萸湯洗七次，　乾薑炮，各二兩。　陳皮，　木香，　肉桂，　丁香，　人參，　當歸洗焙，各一兩。　右剉每四錢，水一盞煎七分，溫服。

㊂朮附湯　治脾胃虛寒泄瀉。

甘草二兩炙，　白朮四兩，　附子炮一兩半。　右剉每服三錢，薑五片，棗一枚，煎，空心服。

㊃感應丸　治前證。

巴豆七十箇，去皮心膜出油。　乾薑炮一兩。　杏仁百四十箇，湯浸去皮尖研。　木香，　肉豆蔻，　丁香各一兩半。

右前四味爲末，外入百草霜二兩研，與巴豆杏仁七味同和勻，用好蠟六兩鎔化成汁，以重絹濾去柤，更以好酒一升於銀石器內煮蠟數沸，傾出待酒冷，其蠟自浮於上，取蠟稱用。春夏修合，用清油一兩，銚內熬令沫散香熟，次下酒煮蠟四兩，同化成汁，就銚內乘熱拌和前項藥末。秋冬修合，用清油一兩半，同煎煮熟成汁，和勻藥末成劑，分作小錠子，油紙裹旋丸服之，每三十丸，空心薑湯下。

㊾古蔻附丸　治臟寒脾瀉及老人中氣不足，久瀉不止

肉豆蔻二兩，附子一兩半。右爲末，粥丸梧子大，每八十丸，蓮子煎湯下。

㊿衛生湯　治脾胃虛瀉。

人參，白朮，茯苓，陳皮，甘草，山藥，澤瀉，薏苡仁，黃連各等分。右水煎服。

(51)理中湯（其方下同）　治腸胃虛弱，瀝瀝有聲，泄瀉頻併。

人參，白朮，乾薑炒，甘草炒各二錢半。加茯苓，厚朴薑製各一錢。右作一服，水二鍾，生薑三片，棗一枚，煎至一鍾，不拘時服。

(52)調中湯　治腸虛泄瀉，止嘔進食。

藿香葉，縮砂仁，蓬朮炮，乾薑炮，肉桂，茴香炒，草果各一錢。蒼朮，橘紅，麥芽炒，益智仁，神麯炒，桔梗，甘草炙各半錢。右作一服，水二鍾，生薑三片，紅棗二箇，鹽少許，煎至一鍾，不拘時服。

(53)肉豆蔻散　治脾虛腸鳴，泄瀉不食。

肉豆蔻七枚，每一枚剜一竅，納丁香一粒在內，以麪裹煨熟，去麪不用。右碾爲末，分作二服，不拘時，用米飲湯調下。

(54)平胃散　治寒濕泄瀉。

蒼朮三錢炒，厚朴薑汁製，橘紅，各三錢。甘草炙一錢。右作一服，水二鍾，生薑三片，紅棗二枚，煎一鍾，不拘時服。

(55)厚朴丸　治泄瀉不止。

白龍骨，乾薑炮，附子炮去皮臍，厚朴薑製，訶子炮去核，肉豆蔻麵裹煨，陳皮各一兩。右爲細末，酒

乾薑炮，　黑附子炮去皮臍，各七錢。　人參去蘆，　炙甘草，　白芍藥，　白茯苓去皮，　白朮，各五錢。　草豆蔻麵裹煨去皮，　厚朴薑製，　陳皮各三錢。　右十味㕮咀，每服五錢或一兩，水二盞半，生薑五片，煎至一盞三分，去柤溫服，食前。

㊸堅中丸　治脾胃受濕，滑泄注下。

黃連，　黃蘗，　赤茯苓，　澤瀉，　白朮各一兩，　陳皮，　肉豆蔻，　人參，　半夏麴，　官桂，　白芍藥，各半兩。

右十一味為末，湯浸蒸餅，丸如桐子大，每服五七十丸，溫米飲送下，食前。

㊹啓脾丸入門下同　治大人小兒脾積，五更瀉，消瘦，黃脹，定腹痛。常服生肌健脾益胃。

人參，　白朮，　茯苓，　山藥　蓮肉，各一兩。　陳皮，　澤瀉，　山楂，　甘草，各五錢。　右為末，蜜丸彈子大，每一丸，空心米飲化下，或為散服亦好。

㊺平胃蒜肚丸　治脾瀉水瀉便紅下血等證，久痢先行，後以此補之，神效。

豶豬肚一具，去脂膜，以大蒜裝滿，線縫，用冷水熱水各七椀，先將水燒滾，入肚煮至水乾為度，取搗爛。　蒼朮，　陳皮，　厚朴，各五兩。　川椒少許。　右四味同肚再搗，至肚無絲方可為丸，梧子大，每服二錢，白湯下。

㊻調中健脾丸　治脾胃氣虛，早晚溏瀉，及臟寒久瀉亦宜。

白朮，　破故紙，　訶子，　肉果各一兩。　白茯苓，　陳皮，各八錢。　黃連吳萸炒七錢。　木香，　厚朴，　小茴，　砂仁，　山藥，　蓮子，各五錢。　神麴六錢。　右為末，粥丸梧子大，每七十丸，蓮子煎湯下。

㊼大斷下丸　治脾胃虛耗，及臟腑停寒，臍腹疞痛，下利滑數，肌肉消瘦，飲食不入，氣弱，時發虛熱。

龍骨，　附子，　肉豆蔻，　枯礬，　牡蠣，　訶子，　酸石榴皮，各二兩。　細辛七錢半，　高良薑，　乾薑，　赤石脂，各一兩半。　右為末，作糊丸梧子大，每服三十丸，粟米飲下。

㊽訶子散　治瀉痢久不止者

# 醫部彙考二百五十五

## 泄瀉門四

### 方二

（六十）肉豆蔻散　治脾胃虛弱，腹脅脹滿，水穀不消，臟腑滑泄。

肉豆蔻麪裹煨，乾薑炮，厚朴去皮薑製　橘紅，　甘草炙各二兩。　茴香，　肉桂，　訶子皮，　川烏，炮去皮臍，各一兩。　蒼朮米泔浸炒四兩。　右爲細末，每二錢用生薑紅棗煎湯，不拘時調服。

（六一）金鎖正元丹　治腎虛泄瀉，小便頻數，盜汗遺精，一切虛冷之證，並皆治之。

五倍子，　茯苓各四兩。　補骨脂酒浸炒五兩，　龍骨煅，　硃砂另研各一兩半。　肉蓯蓉洗焙，　紫巴戟去心，胡盧巴炒，各八兩。　右爲細末和勻，酒煮糊爲丸如梧桐子大每服五七十丸空心用溫鹽酒送下。

（六二）豆附丸　治臟腑久虛下寒泄瀉不止，腸滑不禁，日夜無度，全不進食，一切虛寒泄瀉困乏。

肉豆蔻麵裹煨　附子炮去皮臍，　訶子麪裹煨　良薑炒　乾薑炮，　赤石脂煅，　陽起石煅，　白礬枯，　龍骨生用各二兩。　白茯苓去皮，　桂心不見火，　細辛洗，各一兩。　右爲細末酒煮麪糊爲丸，如梧桐子大，每服七十丸空心用米飲送下。

煮糊爲丸，如梧桐子大，每服五七十丸，空心米飲下。

㊅補脾丸　治滑泄不禁。

肉豆蔻麪裹煨，　厚朴薑製，　白薑炮，　赤石脂，　白朮黃土炒，各一兩。　神麯炒，　附子炮去皮臍，　麥蘗炒，　蓽茇各五錢。　右爲細末，酢煮糊爲丸，如梧桐子大，每服五十丸，空心用米飲送下。

㊆大藿香散　治一切脾胃虛寒，心腹撮痛，如泄瀉不已，最效。

藿香一兩，　陳皮，　厚朴薑製，　木香，　良薑炒，　青皮麩炒，　肉豆蔻麵裹煨，　麥蘗炒，　神麴炒，　訶子肉煨，　白豆蔻仁，　人參，　甘草炙，各半兩。　白乾薑炮三錢。　右爲細末，每服三錢，空心米飲調服。

㊇四聖丸　治脾泄腎泄。

肉豆蔻生二兩，　破故紙炒四兩，　木香不見火，　茴香炒，各一兩。　右爲細末，生薑煮棗肉爲丸，如梧桐子大，每八九十丸，空心用鹽湯送下。一方去茴香木香，用神麴麥蘗各炒一兩爲丸。

㊈豆附丸　治腸胃虛弱，內受風寒，水穀不化，泄瀉注下。

肉豆蔻麪煨，　附子炮去皮臍，　白茯苓，各四兩。　肉桂，　木香，　乾薑炮，各二兩。　丁香一兩。　右爲細末，薑汁煮麪糊爲丸，如梧桐子大，每服五七十丸，或至一百丸，用生薑湯送下，粥飲亦可。

人參，白朮 乾薑炮，訶子肉 茯苓 木香 藿香去土 甘草炙 [illegible]。
水二鍾煎至一鍾去滓食前通口服。

(十)斂腸丸 治久瀉。

木香，丁香，附子炮去皮臍 砂仁，訶子皮，罌粟殼去瓤頂炒，川薑炮，沒石子，白龍骨，肉豆蔻麪裹煨，赤石脂煅，厚朴薑汁製 禹餘糧醋淬七次各一兩 右爲細末麪糊爲丸如梧桐子大每服七十丸食前用米飲湯送下。

(十一)訶子四柱散 治臟腑虛怯元氣弱，脾胃不快，不進飲食時加洩利，晝夜不息。

附子炮裂去皮臍 白茯苓，人參各一兩。 木香濕紙裹煨，訶子濕紙裹煨取皮，各半兩。 右件㕮咀，每服三錢，水一盞生薑三片，棗一枚煎至六分，食前服。一方加肉豆蔻一方有白朮。眞陽耗散兩耳常鳴，臍腹冷痛頭旋目運，四肢怠倦，脾胃不和，日夜洩利，小便滑數並宜服之。

(十二)華茇丸 治滑泄甚妙。

附子炮去皮臍，華茇，川薑炮，丁香不見火，吳茱萸炒，高良薑，胡椒，各一兩。 山茱萸肉，草豆蔻去皮，各半兩。 右爲細末，棗肉爲丸如梧桐子大，每服五十丸，食前陳米飲下。

(十三)縮砂丸 治大便泄瀉，水穀不化，腹中疼痛不思飲食。

縮砂仁，黃連微炒 附子炮去皮臍，訶子皮 吳茱萸湯洗七次焙，肉豆蔻，各二兩。 乾薑炮， 木香，各半兩。 右爲細末，水煑麪糊爲丸，如梧桐子大，每服五七十丸，食前用米飲送下。

(十四)羊肉扶羸丸 治脾胃不和不進飲食，臟腑虛滑，老人虛人皆可服之。

肉豆蔻煨， 白薑炮 川椒去目並合口炒出汗， 神麴炒 附子炮去皮臍各半兩。 木香一分， 精羊肉一斤

(六三)燒胃丸　治脾胃虛冷，疼痛泄瀉。

乾薑，　厚朴二味同搗炒，　附子炮去皮臍，　茯苓去皮，　陳皮，　桂心不見火，　訶子皮，　甘草炙各等分。　右為細末，酢煮糊為丸如梧桐子大，每服三十丸，食前用米飲湯送下。

(六四)訶黎勒丸　治大腸虛冷，泄瀉不止，腹脅引痛，飲食不化。

訶黎勒麪裹煨，　青皮，　陳皮，　吳萸，　龍骨生，　白茯苓，　細辛洗，　桂心不見火，　蓽茇各一兩。　右為細末，生薑汁煮麪糊為丸，如梧桐子大，每服八九十丸，空心用米湯送下。

(六五)九寶飲子　分利水穀，止泄瀉。

鸎粟殼蜜炙，　赤茯苓，　陳皮，　木通各二錢。　黃芪炙，　厚朴薑製，　青皮各一錢半。　甘草炙，　車前子微炒，各一錢。　右作一服，水二鍾煎至一鍾，食前服。

(六六)實腸散　治泄瀉不止。

蒼朮二錢炒，　訶子炮，　縮砂，　肉豆蔻，　陳皮，　茯苓各一錢半。　木香不見火，　甘草炙，各半錢。　厚朴薑汁製一錢。　右作　服，水二鍾，生薑五片，紅棗三箇，煎一鍾，不拘時服。

(六七)益胃湯　治頭悶，勞動則微痛，不喜飲食，四肢怠惰，燥熱短氣，口乾不知味，腸鳴，大便微溏，黃色，身體昏悶，並皆治之。

當歸梢，　陳皮，　升麻各一錢。　益智仁，　白朮，　人參，　柴胡，　黃芩各九分。　半夏，　黃芪，　甘草，各六分。　蒼朮二錢。　右作一服，水二鍾，生薑三片，煎至一鍾，去滓，食前通口服。

(六八)升陽湯　治一日大便三四次，溏而不多，有時洩瀉，腹中鳴，小便黃。

黃芪三錢，　甘草二錢，　橘皮一錢，　升麻七分，　柴胡，　當歸身，　益智各五分。　紅花少許。　右作一服，水二鍾煎至一鍾，食前溫服。

黃連一兩，　肉豆蔻麪裹煨，　乾薑炮，　白茯苓，　當歸焙，　訶子煨去核　丁香各半兩　木香一分　右爲細末用豬膽汁並麪糊和丸如梧桐子大，每服五十丸，空心用米飲下。

(八二)養臟丸　治腸胃虛寒，泄瀉無度，不進飲食。

生硫黃四兩研粉，　乾薑炮，　附子炮去皮臍，　鹿角霜，　肉豆蔻麪裹煨，　山藥各三兩。　右爲細末，麪糊爲丸如梧桐子大，每服三十丸，漸加至五十丸，用溫米飲下，空心食前服

(八三)黃連烏梅丸　治飲食不節，榮衞不和，風邪侵襲臟腑之間，致腸胃虛弱，泄瀉腸鳴，腹脅膨脹，裏急後重，日夜頻併，不思飲食。

黃連，　阿膠蛤粉炒成珠，　當歸洗淨各二兩。　人參，　龍骨煨，　赤石脂，　乾薑炮，　白茯苓，　烏梅肉焙乾，陳皮去白，　訶子去核，　木香，　肉豆蔻麪裹煨，　罌粟殼蜜炙，各一兩。　右爲細末，酢煑麪糊爲丸，如梧桐子大，每服五十丸，食前米飲送下。如腹痛，當歸煎湯下，下血，地榆煎湯下。

(八四)煨肝散　治臟腑久虛，挾寒滑泄，全不入食，口生白瘡。

川椒去目炒出汗，　茴香炒，　肉豆蔻麪裹煨，　砂仁，　丁香，　木香，各半兩。　附子炮去皮臍，　白朮各一兩，入生薑四兩，用酢煑十數沸焙乾。　右爲細末，每用二錢，用豶豬肝或羊肝二兩，切作片子，批開摻藥末在內，更用好紙三兩重裹，於慢火煨，候肝熟取出細嚼，用溫酒送下，不拘時候。

(八五)換腸丸　治泄瀉不止，及諸下痢之疾。

木香，　訶子皮，　白芍藥，　當歸去蘆炒，　人參，　白茯苓去皮，　白朮土炒，　甘草炒，各一兩半。　御米殼去隔蒂，搥碎微炒，淨秤二兩。　右爲細末，煉蜜和丸，如梧桐子大，每服七十丸，用生白薑絲鹽各少許拌勻，用紙裹水濕，

半，微斷血脈，焙乾取末四兩。右爲細末，煮粟米飯爲丸，如梧桐子大，每服五十丸，食前用米飲送下。

㉕百粒丸　治遠近泄瀉，大腸滑，神效。

紅椒，　胡椒，　附子炮，　丁香，　乾薑炮，　麥糵各等分。　右爲細末，酢煮大蒜爲丸，如梧桐子大，每服百粒，食前，用米飲送下。

㉖麴藭丸　治脾胃中風濕，臟腑滑泄不止。

神麴，　芎藭，　白朮，　附子炮去皮臍各等分。　右爲細末，麪糊爲丸如梧桐子大，每服三五十丸，空心用米飲送下。子常加朮附以製方，治脾濕而泄者，萬無不中。亦治飧泄。

㉗棗肉丸　治脾腎虛寒，或腸鳴泄瀉，腹脅虛脹，或胃膈不快，食不消化。

肉豆蔻二兩，麪裹煨香，去麪不用。　木香一兩，　破故紙四兩炒。　右爲細末，燈心煮棗肉爲丸，如梧桐子大，每服七十丸，空心用生薑湯送下。

㉘香茸丸　治飲酒多，遂成酒泄，骨立不能食，但再飲一二盞，泄作不止。

麝香別研一錢，　嫩鹿茸草火燎去毛酥炙黃，　肉豆蔻各一兩。　右爲細末，用白陳米飯爲丸，如梧桐子大，每服五十丸，空心用米飲下。熱者服酒蒸黃連丸。

㉙胃苓散　治傷暑泄瀉，煩渴引飲，所下如水。

平胃散，　五苓散各二錢。　右用水一盞，棗二枚，生薑三片，同煎至七分，嚼薑棗和滓嚥。服少刻，又服辰砂五苓散亦可。用來復丹亦可。或寒濕水泄，正胃散，理中湯，蘇梅米湯下一方入鹽煎。

㉚棗附丸　治臟腑寒滑泄。

用三大附子一箇，　乾棗半斤。　右同於銀石器中，用水於慢火煮，上留水二指許，水乾旋添湯，煮兩三時取出，切

烏梅，　棗子各十箇並去核，　罌粟殼一箇去蔕隔，　右剉細末，每服二錢，水一盞，煎七分，去滓，不拘時溫服。

(九三)紅豆丸　治臟腑泄瀉，名爲飧泄。

紅豆，　藿香，　糖毬，　蓬朮煨，　鬱金，　橘紅，　半夏湯洗七次，　縮砂仁各一兩半。　高良薑，　蓽茇各二兩。　丁香不見火半兩。　硇砂三錢酢化。　右爲細末，水煮麪糊爲丸如梧桐子大，每服一百丸，用米飲或隨物空心送下。病甚者，日進三服。

(九四)高良薑湯　治腸胃受風，久爲飧泄，下利嘔逆，腹內疞痛。

高良薑，　木香，　檳榔，　赤茯苓，　人參各三分。　肉豆蔻去殼，　吳茱萸湯洗焙炒，　陳皮去白焙，　縮砂去皮，各半兩。　乾薑一分炮。　右㕮咀，每服四錢，水一盞半，煎至八分，不拘時，日三服。

(九五)乾薑丸　治腸胃風冷，飧泄注下，腹痛不止。

乾薑炮，　厚朴去粗皮薑汁炙，　當歸焙各三分。　阿膠炙燥，　龍骨煅各一兩。　右爲細末，煉蜜爲丸如梧桐子大，每服三十丸，空心用棗湯下，日午再服。

(九六)加減木香散　內經曰：『清氣在下，則生飧泄。』又曰：『久風入中，則爲腸風飧泄。』夫脾胃土也，其氣沖和，以化爲事，今清氣下而不升，則風邪久而干胃，是木賊土也。故中和之氣不能化，而令物完出，謂之飧泄。或飲食太過，腸胃所傷，亦致水穀不化，此俗呼水穀痢也。法當下者舉之，而兼消剋，此方主之。

木香，　良薑，　升麻，　檳榔，　人參各七錢半。　肉豆蔻煨，　吳茱萸湯洗，　陳皮留白，　砂仁，　乾薑炮，各半錢。　神麴二錢炒，　右爲細末，每服四錢，水一盞半，煎至一盞，去滓，食前溫服。

文武火煨熟，却用生薑煮粥送下，食前。日進二服。

（八六）又方　療二十種下利，江夏太守用此法療盡愈。

黃連，　黃蘗，　熟艾，　附子炮，　甘草炙各一兩。　烏梅二十枚取肉煮，　乾薑二兩。　右七味搗末，蜜丸如大豆，服十丸，漸至二十丸，日三。忌肥肉生冷。一方無附子甘草黃蘗。一方除甘草附子。

（八七）豬臟丸　治元臟久冷，滑泄不止，飲食不進，漸至危困。

硫黃研，　吳茱萸炒，各二兩。　厚朴一斤，　乾薑炒，　用豬臟一段，洗淨，入硫黃末在內，線縛兩頭，用米醋五升，同入磁瓶內，鹽泥固濟，用炭火一秤煨，候醋乾爲度，先研臟令細，次入藥末一處同研勻，丸如梧子大，每服十丸，空心鹽酒鹽湯送下。

（八八）訶子皮散　治腸胃虛寒，泄瀉，水穀不化，腸腹痛，脫肛，或作膿血，日夜無度。

訶子煨七分，　乾薑炮六分，　粟殼去蒂隔蜜炙，　橘皮各半錢。　右爲細末，分作二服，水二盞，煎至一盞，和滓熱服，空心再服，全愈。

（八九）龍骨散　治水瀉腹痛，不納飲食。

龍骨，　當歸炒，　肉豆蔻麪裹煨，　木香各半兩。　厚朴二兩，去粗皮，薑汁炙。　右爲細末，每服一錢，食前，用粥飲調下。

（九〇）代赭丸　治水瀉腸鳴，臍腹撮痛。

附子炮去皮臍三分，　代赭石煅，　乾薑炮，　龍骨各一兩。　右爲細末，研軟飯和丸，如梧桐子大，每服三十丸，空心用米飲湯送下，日午再服。

肉豆蔻生，粟殼去蒂蓋蜜炙各二兩。乾薑炮，甘草炙，各二兩半。陳米炒十二兩 木香一兩 右爲細末每服二錢，酒一盞生薑二片棗一枚煎至七分不拘時溫服如不飲酒水煎亦得忌酒麪魚腥等物。

(二四)加味三建湯 治洞泄不止。

大川烏，附子，天雄三味並炮鹽水浸去皮臍。木香，肉豆蔻煨，訶子麪裹煨去核各一兩。右剉散，每服三錢，水一盞，生薑十片紅棗二枚鹽梅一箇陳米一撮，煎六分空心熱服。

(二五)張氏建中湯 治脾胃虛弱，冒犯風冷，腹痛腸鳴，泄瀉。經云：『食畢而下謂之洞泄。』手足厥冷面色青白，下部虛寒，中滿氣短，常服寬中健脾養胃育眞。

附子，川烏並炮去皮臍，胡椒 艾酢淬炮，桂心 乾薑炮，良薑炒 蓽茇各等分。右爲細末，酢煮糊和，丸如梧桐子大，每服五十丸，漸加一至百丸，空心食前用米飲吞下。

(二六)豬臟丸 治臟寒泄瀉飲食不進，氣體倦怠。

吳茱萸揀去枝梗不拘多少，水浸透。右用豮豬臟頭一截去脂膜淨洗，將茱萸入臟內，兩頭用線紮定，慢火煮令極爛；用甑蒸熟尤好。二味於臼內搗千下，令極細，丸如梧桐子大，每服五十丸，食前米湯下。

(二七)大腹木香湯 治胃寒腸熱，腹脹泄瀉。

大腹子，製半夏焙，木香各二兩。枳殼麩炒，前胡，白芷，白朮，肉桂，橘紅焙各一兩。延胡索，當歸焙，旋覆花，柴胡，白芍藥，甘草炙各半兩。乾薑炮，人參各三分。右㕮咀，每服三錢，水一盞生薑三片紅棗三枚，煎至六分，去滓，食前稍熱服。

(二八)橘皮湯河間下同 治濕熱內甚，心腹脹滿，水腫，小便不利，大便滑洩。

肉豆蔻去殼煨，(九七)肉豆蔻散　治腸胃受濕，濡泄不止。　訶黎勒煨去核，黃連各三分。炙甘草，　赤茯苓去皮，　乾薑炮，　白朮，各半兩。　厚朴去粗皮薑汁炙一兩。　右爲細末每服二錢，空心米飲調下，日三。

(九八)炙肝散　治飲食生冷內受風寒，泄瀉無度。

川椒四兩，　乾薑炮，　附子炮，　縮砂仁，各半兩。　肉豆蔻二兩，　小茴香四錢炒，　右爲細末，用白羊肝二三兩，或豶豬肝或豬羊腰子批開，放藥末三四錢在內，鹽一錢，葱白二莖，同放肝內，一處用濕紙裹燒香熟，空心食前細嚼，用生薑湯或米湯或酒送下。

(九九)龍骨黃連湯　治大便滑泄，色如鶩溏。

龍骨，　黃連炒，各三分。　當歸切焙，　乾薑炮，　甘草炙，各半兩。　右㕮咀，每服五錢，水一盞半，煎八分，去滓，食前溫服，日再。

(百)木香訶黎勒丸　治洞泄，大腸切痛，腸鳴，食不化。

木香半生半炒，　高良薑炒，　肉豆蔻去殼，　白朮，各一兩。　官桂去粗皮，　蘼蕪炒，各一兩半。　附子炮去皮臍，厚朴去粗皮薑汁炙焦，各二兩。　甘草炙半兩，　乾薑炮一分　訶黎勒煨去核三分。　右爲細末用陳麴末煮糊爲丸，如梧桐子大，每服三十丸，食前生薑鹽湯送下。

(百一)茱萸斷下丸　治臟腑寒，腹痛泄瀉不止，甚效。

吳茱萸二兩半炒，　赤石脂，　川乾薑各半兩。　艾葉炒，　砂仁，　肉豆蔻，　附子炮去皮臍，各一分。　右爲細末，麪糊爲丸，如梧桐子大，每服五七十丸，食前用米飲送下。

㉕白朮湯　治厥陰動爲瀉利者，寸脈沉而遲，手足厥逆，下部脈不至，咽喉不利，或涕唾膿血，瀉利不止者爲難治，宜升麻湯或小續命湯以發之。法曰：謂表邪縮於內，故下利不止，當散表邪於四肢，布於絡脈外無其邪，則臟腑自安矣。

白朮，芍藥各三錢。乾薑半兩，炮，甘草二錢，炙。右剉爲粗末，如前服之，甚則去乾薑，加附子三錢，辛能發也。

㉖茯苓湯　治濕瀉。

白朮一兩，茯苓去皮七錢半。右㕮咀，水煎一兩，食前服。食入而瀉，胃中有宿穀也，當加枳實五錢。酒入而瀉，濕熱也，加黃芩五錢。

㉗蒼朮湯　治瀉利久不止，虛滑，穀不化，用此湯調桃花丸。

蒼朮二兩，防風一兩。右剉爲細末，用水一椀，煎至一大盞，絞滓汁，下桃花丸八十丸，立愈。如小便澀少，以五苓散下桃花丸，或赤白石脂丸，小便利則愈矣。

㉘蒼朮防風湯　治風濕泄瀉。

蒼朮，麻黃去根節各四兩。防風五錢　右爲粗末，每服一兩，生薑七片，水二盞，煎至一盞，去滓溫服。泄止後，服椒朮丸。

㉙椒朮丸

蒼朮二兩，川椒一兩，去目，炒。右爲極細末，酢糊爲丸，如桐子大，每服二十丸或三十丸，食前溫水下。一法惡痢久不愈者，加桂。如小兒病，丸如粟米大。

㉚木香丸　治腸痹，腹疠痛，時發飧洩，氣不消化，小便祕澀。

橘皮，茯苓各一兩。木香一分，滑石六兩，檳榔三錢，猪苓，澤瀉，白朮，官桂，各半兩。甘草二錢。

右爲末，每五錢，水一盞，生薑五片，煎至六分，去滓温服。小便祕，先服十棗湯，二三日後，再服此藥。

㉙桂苓白朮丸　治水腫腹脹泄瀉不能止者，服之利止爲度，隨證調之。

肉桂，乾生薑各一分。茯苓，半夏各一兩。白朮，橘紅去白，澤瀉，各半兩。右爲末，麪糊爲丸，如小豆大，生薑湯下二三十丸，日三服，病在膈上食後，在下食前，在中不計時候。一法更加黃連半兩，黃蘗二兩，水丸取效愈妙。

㉚防風芍藥湯　治泄利飧泄，身熱脈弦，腹痛而渴，及頭痛微汗。

防風，芍藥，黃芩各半兩。右㕮咀，每半兩或一兩，水三盞，煎一盞，濾淸温服。

㉛白朮芍藥湯　治泄瀉腹痛甚者。

白朮，芍藥各一兩。甘草五錢。右剉，每一兩，水二盞，煎至一盞，濾淸温服。

㉜蒼朮芍藥湯　治泄瀉脈弦，頭微痛者。

蒼朮二兩，芍藥一兩，黃芩半兩。右剉，每服一兩，加淡味桂半錢，水一盞半，煎至一盞，温服。

㉝訶子散　治虛滑泄瀉。

訶子去核一兩，半生半熟。木香半兩，黃連，甘草，各三錢。右爲細末，每服二錢，以白朮芍藥湯調下。如止之不已，宜訶子散加厚朴一兩以竭其邪氣。虛滑久不愈者，多傳變爲痢疾，太陰傳少陰是爲鬼邪，先以厚朴枳實湯防其傳變。

㉞漿水散　治暴瀉如水，周身汗出，一身盡冷，脈微而弱，氣少而不能語，其甚者加吐，此謂急病，治之

大熟地八兩，牛膝酒蒸三兩，精滑者不用。山藥炒，枸杞子，山萸肉，菟絲子製，鹿膠敲碎炒珠，龜膠切碎炒珠各四兩。無火者不用。右先將熟地蒸爛杵膏加煉蜜丸桐子大每食前用滾湯或淡鹽湯送下百餘丸。

㉙排氣飲　治氣逆食滯脹痛嘔吐等證。

陳皮，藿香，枳殼各一錢五分。香附，澤瀉，烏藥各二錢　厚朴一錢。木香七分或一錢。水一鍾半，煎七分熱服。

㉚大和中飲　治飲食留滯泄瀉等證。

陳皮一二錢，枳實一錢，砂仁五分　山楂　麥芽，各二錢。厚朴，澤瀉，各一錢半。水一鍾半，煎七八分，食遠溫服。

㉛小和中飲　治胷膈脹悶，泄瀉嘔吐，或婦人胎氣滯滿等證。

陳皮，茯苓，厚朴各一錢五分。山楂肉，扁豆炒，各二錢。甘草五分。水一鍾半，加生薑三五片，煎服。

㉜小分清飲　治小水不利，濕滯嘔吐，腫脹不能受補等證。

茯苓，澤瀉，猪苓，各二三錢。薏苡仁二錢，厚朴，枳殼，各一錢。水一鍾半，煎七分，食前服。

㉝解肝煎　治暴怒傷肝，氣逆脹滿陰滯泄瀉等證。如兼肝火者，宜用化肝煎。

陳皮，半夏，厚朴，茯苓，各一錢半。紫蘇葉，芍藥，各一錢。砂仁七分，水一鍾半加生薑三五片，煎服。

㉞二朮煎　治肝強脾弱，氣泄濕泄等證。

白朮炒二錢或三錢。蒼朮米泔浸炒，二錢，芍藥炒黃二錢，陳皮炒，澤瀉炒，各一錢五分。茯苓，乾薑炒黃各一二錢。厚朴薑汁浸炒，炙甘草，各一錢。木香六七分。水一鍾半煎七分食遠服。

乾薑三分，木香，白朮，官桂，蕪荑，良薑，訶子皮，各一兩。附子炮去皮，厚朴生薑製，肉豆蔻各二兩。甘草半兩。右爲末，神麯糊爲丸，如桐子大，每服二十丸，薑湯下，空心。

㉛豆蔻散　治寒客於脾胃，傷濕而腹痛，滑利不止。

肉豆蔻五箇，甘草炙，厚朴各等分。右爲末，每服二錢，米飲一盞，調下。食前。白湯亦得。

㉜妙應丸　治胃寒腸熱，水穀不化，腹脹痞滿，洩利不已。

川烏頭去尖半兩，梔子仁，乾生薑各一分。右爲末，生薑汁麵糊爲丸，如桐子大，每服五丸，溫酒下，食前，日進二服。

㉝白頭翁湯仲景　治挾熱下利，後重而渴。

白頭翁，黃蘗，秦艽，黃連各一錢。右水煎溫服。

㉞陶氏黃龍湯　治結熱利，心下鞕滿，下利純清水，譫語，發渴，身熱。

大黃二錢，芒硝一錢半，枳實，厚朴各一錢，甘草，人參，當歸各五分。年老氣血虛者，去芒硝，薑三片，棗二枚，桔梗二分，水煎一沸熱服。

㉟桃花散　治少陰下利，膿血腹痛，小便不利，脈沉。

赤石脂五錢，半生半炒。乾薑二錢，糯米一合。水煎去查，入生石脂末一半，調服。

㊱赤石脂丸　治下利小便澀者。

赤石脂，乾薑各一兩，黃連，當歸各二兩。右爲末，蜜丸梧子大，每服三十丸，米飲下。

㊲右歸飲景岳全書　同　此益火之劑也。凡命門之陽衰陰勝，而泄瀉者，宜用此方加減主之。

[illegible]，[illegible]，[illegible]，枸杞子，[illegible]仲薑製去絲各二錢。甘草炙，肉桂各一二錢。

二枚或五味二十粒，武火煎七八分温服

㊷養中煎　治中氣虛寒爲嘔爲泄者。

人參一二三錢，　山藥炒，　白茯苓各二錢。　炙甘草一錢，　扁豆炒二三錢，　乾薑炒黃一二錢。　水二鍾，煎七分，食遠温服。

㊸温胃飲　治中寒泄瀉，不思飲食等證。

人參一二三錢或一兩，　白朮炒一二錢或一兩，　陳皮留白一錢或不用，　乾薑炒焦一二三錢，　炙甘草一錢，　扁豆炒二錢　水二鍾，煎七分，食遠温服。

㊹五君子煎　治脾胃虛寒泄瀉而兼濕者。

人參二三錢，　炙甘草一錢，　乾薑炒黃一二錢，　白朮，　茯苓各二錢。　水一鍾半，煎服，加陳皮一錢，名六味異功煎治同。

㊺胃關煎　治脾腎虛寒作泄，甚至久瀉腹痛不止冷痢等證。

熟地三五錢或一兩，　山藥炒，　扁豆炒各二錢，　炙甘草一二錢，　焦乾薑，　白朮炒，各一二三錢。　吳茱萸製五七分。　水二鍾，煎七分，食遠温服。瀉甚者加肉豆蔻一二錢，麪煨用，或破故紙亦可。滑脫不禁者，加烏梅二箇，或北五味子二十粒。

㊻左關煎　治生冷傷脾，瀉利未久，腎氣未損者，宜用此湯以去寒濕，安脾胃，此胃關煎之佐者也。

厚朴炒，　陳皮炒各一錢。　山藥炒，　扁豆炒，　猪苓，　澤瀉各二錢。　炙甘草七分　乾薑炒，　肉桂各一二錢。　水一鍾半，煎服。如瀉甚不止者，加破故紙或肉豆蔻皆可。

㉟蒼朮丸　治寒濕在脾，泄瀉久不能愈者。

茯苓，白芍炒各四兩。川椒去閉口者炒出汗，炙甘草，小茴香炒，各一兩。厚朴薑汁炒三兩，破故紙酒浸二日曬乾炒香四兩，茅山蒼朮八兩，米泔浸一宿切炒如無即以白朮代之。右爲末，糯米糊爲丸梧子大，每食遠，清湯送下七八十丸。

㊱赤金豆　治諸積泄瀉。

巴霜去皮膜，略去油，一錢半。生附子切炒二錢，輕粉一錢，皂角炒微焦二錢，丁香，木香，天竺黃，各三錢。硃砂二錢爲衣。右爲末，醋浸蒸餅爲丸蘿蔔子大，硃砂爲衣。欲漸去者，每服五七丸，欲驟行者，每服一二十丸，用滾水或煎藥或薑酢茶蜜茴香史君煎湯爲引送下。若利多不止，可飲冷水一二口即止。蓋此藥得熱則行，得冷則止也。

㊲百順丸　治一切陽邪積滯泄瀉。

大黃錦紋者一斤，牙皂角炒微黃一兩六錢。右爲末，用湯浸蒸餅，擣丸菉豆大，每用五分或一錢或二三錢，酌宜用引送下。或用蜜爲丸亦可。

㊳大分清飲　治濕熱下利，黃疸溺血，邪熱畜血，腹痛淋閉等證。

茯苓，澤瀉，木通各二錢。猪苓，梔子或倍之，枳殼，車前子，各一錢。水一鍾半，煎八分，食遠溫服。

㊴茵陳飲　治挾熱泄瀉，熱痢口渴，喜冷小水不利，黃疸濕熱閉澀等證。

茵陳，焦梔，澤瀉，青皮各三錢。甘草一錢，甘菊花二錢。用水三四鍾，煎兩鍾，不時陸續飲之。治熱瀉者，一服可愈。

脈息無力，氣怯神倦者，速宜用此。不得因其虛痞虛脹，而畏用白朮，此中虛實之機貴乎神悟也若痛脹覺甚者，即以此煎送神香散最妙若用治寒濕瀉利嘔吐，尤爲聖藥。

冬朮五六七八錢炒或至一二兩。 乾薑炒， 肉桂，各一二錢。 陳皮酌用或不用。 水一鍾半，煎七分，溫熱服。若治虛寒瀉利，量加人參炙甘草之類。

(三四)黏米固腸糕 治脾胃虛寒，泄瀉久不止者，多服自效。

白糯米滾湯淘洗炒香熟爲粉一兩， 白糖二錢， 炒熟乾薑末二分半。 右拌勻，於饑時用滾水調服一二兩，如有微滯者，加陳皮炒末二分，或砂仁末一分，俱妙。一法用陳老米粉亦妙。

(三五)敦阜糕 治日久瀉利腸滑不固妙方及婦人帶濁最佳。

白麪炒黃二兩 白朮炒黃一兩， 破故紙炒五錢。 右共爲末，臨服時加白糖，隨宜用清滾湯，食前調服如糕法。如胃寒者，每一兩加乾薑炒末五分或一錢，如滑泄不禁者，每兩加粟殼末炒黃一錢若以作丸則宜三味等分用即名敦阜丸。

(四七)抑扶煎 治氣冷陰寒，或暴傷生冷，致成瀉利，凡初起血氣未衰，脾腎未敗，或腹痛或嘔惡，皆宜先用此湯，此胃關煎表裏藥也，宜察虛實用之。其有寒濕傷臟霍亂邪實者，最宜用此。

炙甘草一錢，厚朴 陳皮，烏藥各一錢五分。猪苓 澤瀉各二錢。吳茱萸湯泡炒五七分。乾薑炮一二錢。水一鍾半，煎七分，食遠溫服。寒濕甚者，加蒼朮。

(四八)五德丸 治脾腎虛寒，飧泄鶩溏等證，或暴傷生冷，或受時氣寒濕，或酒濕傷脾，腹痛作泄，或飲食失宜，嘔惡痛泄無火等證。

乾薑炒，補骨脂酒炒各四兩。吳茱萸製，木香，各二兩。北五味二兩，或以肉豆蔻麪煨代之，烏藥亦可。湯浸蒸餅，丸桐子大，每服六七十丸，甚者百餘丸，滾白湯或人參湯或米湯俱可下。腹痛多嘔者，加胡椒二兩，更妙。

(四九)復陽丹 治陰寒嘔吐泄瀉，腹痛寒疝等證。

附子製，乾薑炮 炙甘草，北五味子炒，胡椒，各一兩。白麪二兩炒熟。右爲末，和勻入溫湯，搗丸桐子大，每服一錢，隨證用藥引送下。

(五〇)黃芽丸 治脾胃虛寒，或飲食不化，或時多脹滿泄瀉吞酸嘔吐等證，此藥隨身常用甚妙。

人參二兩，焦乾薑三兩，煉白蜜爲丸芡實大，常嚼服之。

(五一)一炁丹 治脾腎虛寒，不時易瀉，腹痛陽痿怯寒等證。

人參，附子製各等分，煉白蜜丸如菉豆大，每用滾白湯送下三五分或一錢，凡藥餌不便之處，或在途次隨帶此丹最妙。

(五二)九炁丹 治脾腎虛寒，如五德丸之甚者。

# 泄瀉門五

## 單方

洩利，冷熱赤白，腹內熱毒，絞結痛，下血，取乾黃土水煑三五沸，絞去滓，暖服一二升。本草。

暴作瀉利，百草霜末，米飲調下二錢。續千金方。

泄瀉無度，諸藥不效，用鹹砂酢煑炒乾，猪苓生地龍各三錢爲末，葱涎研和，傅臍上，約一寸厚，縛之，待小便多爲度，日二易之。醫學正傳。

水瀉腹鳴如雷有火者，石膏火煆倉米飯和丸梧子大，黃丹爲衣，米飲下二十丸，不二服效，李樓奇方。

久瀉，白石脂乾薑等分，研白沸湯和麪爲稀糊丸梧子大，每米飲下三十丸。斗門方。

大腸寒滑，小便精出，赤石脂乾薑各一兩，胡椒半兩爲末，酢糊丸梧子大，每空心米飲下五七十丸。有人病此熱藥，服至一斗二升不效，或教服此，終四劑而愈。寇氏衍義。

大腸滑冷不止，鍾乳粉一兩，肉豆蔻煨半兩爲末，煑棗肉丸梧子大，每服七十丸，空心米飲下。濟生方。

冷勞腸泄不止，禹餘糧四兩，火煆酢淬，烏頭一箇，冷水浸一夜，去皮臍焙爲末，酢糊丸梧子大，每食前溫水下五丸。

白湯下日二服。

又方。縮砂仁炮附子乾薑厚朴陳橘皮等分爲末飯丸梧子大每服四十丸，米飲下，日二服。藥性論，

腹脹忽泄日夜不止諸藥不效此氣脫也。用益智子仁二兩濃煎飲之立愈。得效方。

久瀉不止，肉豆蔻煨一兩木香二錢半爲末，棗肉和丸，米飲服四五十丸。

又方。肉豆蔻煨一兩，熟附子七錢，爲末糊丸，米飲服四五十丸。

又方。肉豆蔻煨粟殼炙等分爲末，酢糊丸，米飲服四五十丸。百一選方。

老人虛瀉，肉豆蔻三錢，麪裹煨熟去麪炒研，乳香一兩爲末，陳米粉糊丸梧子大，每服五七十丸，米飲下，此乃常州侯教授所傳方。瑞竹堂方。

水瀉久利，破故紙炒一兩，粟殼炙四兩爲末，煉蜜丸彈子大，每服一丸，薑棗同煎服。百一選方。

暴瀉不止，陳艾一把，生薑一塊，水煎服。生生編。

冷勞洩利，漏盧一兩，艾葉炒四兩，爲末，米酢三升，入藥末一半，同熬成膏，入後末，和丸梧子大，每溫水下三十丸。聖濟總錄下同。

驟然水瀉，日夜不止，或冷利白凍欲死，不拘男婦，用五月五日採麻葉陰乾爲末，每服二錢，冷水調下，勿喫熱物，令人悶倒，只喫冷物，小兒半錢。

風寒泄瀉，治風氣行於腸胃，泄瀉，大杴艸爲末，酢糊丸梧子大，每服三十丸，白湯下。

水瀉日久，青州乾棗十箇去核，入莨菪子塡滿，紮定燒存性，每粟米飲服一錢。聖惠方。

老人虛泄不禁，熟附子一兩，赤石脂一兩，爲末，酢糊丸梧子大，米飲下五十丸。楊氏家藏。

聖惠方。

元臟冷泄，腹痛虛極，硫黃一兩，黃蠟化丸梧子大，每五丸新汲水下。一加青鹽二錢，蒸餅和丸，酒下。普濟方。

氣虛暴泄，日夜三四十行，腹痛不止，硫黃二兩，枯礬半兩，研細，水浸蒸餅丸梧子大，每服十五丸至二十丸，溫水鹽湯任下。夏月路行，備急最妙。祕寶方。

下利虛寒，硫黃半兩，蓖麻仁七箇，爲末，塡臍中，以衣隔熱湯熨之，利止乃已。仁存方。

老人冷瀉，須暖元臟，除積冷，溫脾胃，進飲食，硫黃柳木槌研細，半夏湯泡七次，焙研等分，生薑自然汁調，蒸餅和杵百下，丸梧子大，每服十五丸至二十丸，空心溫酒或薑湯下，婦人酢湯下。和劑局方。

老人泄瀉不止，枯白礬一兩，訶藜勒煨七錢半，爲末，米飲服二錢取愈。

冷勞泄利，食少，諸藥不效，白礬三兩，燒羊肝一具，去脂，釅酢三升，煮爛擂泥，和丸梧子大，每服二十丸，米飲下，早夜各一服。普濟方。

冷利厥逆，六脈沉細，人參大附子各一兩半，每服半兩，生薑十片，丁香十五粒，粳米一撮，水二盞，煎七分，空心溫服。經驗方。

脾虛洩瀉，白朮車前子等分，炒爲末，白湯下二三錢。簡便方。

久瀉滑腸，白朮炒，茯苓各一兩，糯米炒二兩，爲末，棗肉拌食，或丸服之。

老人常瀉，白朮二兩，黃土拌蒸，焙乾去土，蒼朮五錢，泔浸炒，茯苓一兩，爲末，米糊丸梧子大，每米湯下七八十丸。簡便方。

脾濕，水瀉注下，困弱無力，水穀不化，腹痛甚者，蒼朮芍藥各一兩，黃芩半兩，淡桂二錢，每一兩，水一盞半，煎一盞，溫

傷寒暴利，以豉一升，薤白一握，水三升，煮薤熟，納豉，更煮色黑，去豉，分爲二服。

寒濕泄瀉，小便淸者，以頭燒酒飲之，卽愈。

泄瀉暴利，大蒜搗貼兩足心，亦可貼臍中。千金方。

濕熱虛瀉，山藥蒼朮等分，飯丸，米飲服。大人小兒皆宜。經驗方。

積熱瀉利，冬瓜葉嫩心，拖麪煎餅食之。海上名方。

新久瀉利，乾木耳一兩，炒，鹿角膠二錢半，炒，爲末，每服三錢，溫酒調下，日二服。御藥院方。

泄利口渴，烏梅煎湯，日飲代茶。扶壽精方。

水利不止，林檎半熟者十枚，水二升，煎一升，並林檎食之。食醫心鏡。

久泄不止，用酸石榴一箇，煨烟盡，出火毒一夜，研末，仍以酸石榴一塊煎湯服，神效無比。

久瀉，陳石榴皮酸者，焙研細末，每二錢，米飲下。患二三年或二三月，百方不效者，用之便止，不可輕忽。

夏月濕瀉，川椒炒取紅，肉豆蔻煨，各一兩，爲末，粳米飯丸梧子大，每米飲服百丸，多寡量人。

飧瀉不化及久利，小椒一兩，炒，蒼朮二兩，土炒，碾末，酢糊丸梧子大，每米飲服五十丸。普濟方。

老小洩瀉，用椒二兩，酢二升，煮酢盡，慢火焙乾，碾末，磁器貯之，每服二錢匕，酒及米飲下。

夏月冷瀉及霍亂，胡椒碾末，飯丸梧子大，每米飲下四十丸。易簡方。

多年脾瀉，老年多此，謂之水土同化，吳茱萸三錢，炮過，入水煎汁，入鹽少許，通口服。

臟寒泄瀉，倦怠減食，吳茱萸湯泡過，炒豬臟半條，去脂洗淨，裝滿紮定，文火煮熟，搗丸梧子大，每服五十丸，米飲下，日二服。普濟方。

冷氣洞泄，生川烏頭一兩，木香半兩，爲末，酢糊丸梧子大，每陳皮湯下二十丸。本事方。

臟寒脾泄，及老人中氣不足，久泄不止，肉豆蔻二兩，煨熟，大附子去皮臍一兩五錢，爲末，粥丸梧子大，每服八十丸，蓮肉煎湯下。

水泄久利，川烏頭二枚，一生用，一以黑豆半合同煮熟，研丸菉豆大，每服五丸，黃連湯下。普濟方

水泄寒利，大艸烏一兩，以一半生研，一半燒灰，酢糊丸菉豆大，每服七丸，井華水下，忌生冷魚肉。十便良方。

凡人每五更即溏泄一二次，經年不止者，名曰腎泄，五味去梗二兩，茱萸湯泡七次五錢，同炒香爲末，每旦陳米飲服二錢。本事方。

水瀉不止，木鼈仁五箇，母丁香五箇，麝香一分，研末，米湯調作膏，納臍中貼之，外以膏藥護住。扶壽精方。

腎虛久洩，骨碎補末入猪腎中，煨熟食之，效。

泄利不固，白麪一斤，炒焦黃，每日空心溫水服一二匙。正要。

久洩食減，糯米一升，水浸一宿，瀝乾，慢火炒熟，磨篩，入懷慶山藥一兩，每日淸晨用半盞，入砂糖二匙，胡椒末少許，以極滾湯調食，其味極佳，大有滋補，久服令人精暖有子，秘方也。經驗方。

脾虛泄利，青粱米半升，神麴一合，日日煮粥食，即愈。養老書。

胃弱久泄，黃米炒爲粉，每用數匙，砂糖拌食。簡便方。

久利不止，罌粟殼酢炙爲末，蜜丸彈子大，每服一丸，水一盞，薑三片，煎八分，溫服。

又方，粟殼十兩去膜，分作三分，一分酢炒，一分蜜炒，一分生用，並爲末，蜜丸芡子大，每服三十丸，米湯下。

[illegible]兩爲細末，每服一錢，米飲下，忌生冷。

老小滑瀉白朮半斤黃土炒過山藥四兩炒爲末飯丸量人大小米湯服或加人參三錢。

老人泄瀉乾糕一兩，薑湯泡化代飲。簡便方。

中寒水瀉，乾薑炮研末，粥飲服二錢，即效。千金方。

寒利青色，乾薑切大豆大，每米飲服六七枚，日三夜一，累用得效。肘後方。

暑月水瀉，五倍子末，飯丸黃豆大，每服二十丸，荷葉煎水下，即時見效。選奇方。

熱瀉，五倍子一兩，枯礬五錢，爲末，糊丸梧子大，每服五十丸，米湯送下。雜興方。

治泄，車前子不拘多少，爲細末，每服二錢，米飲湯調下服之，水穀分，吐瀉止。子和。

脾泄多年老人腎虛，謂之水土同化，用吳茱萸揀淨，不拘多少，白水煮，去滓，盞內入鹽少許，通口服，蓋吳茱萸能暖膀胱，水道既清，大腸自固，餘藥皆熱，不能分解清濁也。

瀉久不效者，老人尤宜服。一名護命方，用大附子一箇，炮去皮臍，以韭菜根研爛，絞取汁和丸如梧子大，曬乾，每服三十丸，米飲湯下。不乾，恐痲八。一方治一切冷瀉，出後頻併，面無顏色，不思飲食，杵爲末，以一錢煮粥一椀，空心服。

久患脾瀉，臟腑虛滑不 飲食，用青州大棗擘破去核，以木香如棗核大，置棗中十數枚，以水一盞煮候棗熟，食前溫嚼嚥，就以煮棗湯送下，甚者不過二劑。

## 鍼灸

素問曰：脾熱病者，熱爭則腰痛不可用俛仰，腹滿泄，兩頷痛，甲乙甚，戊己大汗，氣逆則甲乙死，刺足太陰陽明。

靈樞經曰：脹取三陽，飧泄取三陰。

久瀉，虛利腹痛者，橡子肉豆蔻各一兩，陳米一兩半，以米一分，同二味炒黃爲末，一分生碾爲末，粟米粥丸梧子大，每陳米飲下五十丸，日三服。

中滿洞瀉，厚朴乾薑等分爲末，蜜丸梧子大，每服五十丸，米飲下。鮑氏方。

下利水穀久不瘥者，厚朴二兩，黃連三兩，水三升，煎一升，空心細服。梅師方。

水瀉下利，訶黎勒炮二分，肉豆蔻一分，爲末，米飲，每服二錢。聖惠方。

水穀利下，椶櫚皮燒研，水服方寸匕。近效方。

積滯泄利，腹痛裏急，杏仁去皮尖，巴豆去皮心，各四十九箇，同燒存性，研泥，鎔蠟和丸菉豆大，每服二三丸，煎大黃湯下，間日一服。一加百草霜三錢。宣明方下同。

一切瀉利，脈浮洪者，多日難已，巴豆皮楮葉同燒存性，研化，蠟丸菉豆大，每甘草湯下五丸。

水洩多時，羖羊角一枚，白礬末塡滿，燒存性爲末，每新汲水服二錢。聖惠方。

泄瀉不止，白龍骨白石脂等分爲末，水丸梧子大，紫蘇木瓜湯下，量大人小兒用。心鑑方。

脾泄久痢，五倍子炒半斤，倉米炒一升，白丁香細辛木香各三錢，花椒五錢，爲末，每服一錢，蜜湯下，日二服，忌生冷魚肉。集靈方。

脾虛滑泄，烏骨母雞一隻，治淨，用豆蔻一兩，草果二枚，燒存性，摻入雞腹內，紮定煮熟，空心食之。

水泄不化，日夜不止，白堊煆，乾薑炮，各一兩，楮葉生研二兩，爲末，糊丸菉豆大，每米飲下二十丸。普濟方

泄瀉下痢，赤白，用棗肉搗爛，入黃丹白礬各皂子大，粳米飯一團，和丸彈子大，鐵線穿於燈上，燒過爲末，米飲服之。摘元方。

會陽主腸中有寒泄注腸澼，便

三焦腧小腸腧下窌意舍章門主腸鳴臚脹泄注。

中窌主腹脹飧泄。

大腸腧主腸鳴腹䐜腫，暴泄。

古今醫統曰：百會一穴，在前頂心中央旋毛中，治久泄下陷脫滑者，灸三壯。

脾腧二穴，在十二椎下兩旁各開寸半，治泄瀉，灸三壯。

關元一穴，在臍下三寸，治瀉不止，可灸七壯。

腎腧二穴，在十四椎下兩旁各開一寸半，與臍平，可灸五壯，治洞泄不止。

大腸俞二穴，在十六椎兩旁各寸半，可灸三壯，治腸鳴腹脹暴瀉。

天樞二穴，在俠臍中兩旁各二寸陷中，氣海一穴，在臍下，可灸三壯，治瀉。

醫學綱目曰：治久泄瀉，取天樞二寸半，摘英五分，留十呼，灸百壯。

自利不止，取天樞中樞。

又法。取合谷三里陰陵泉不應，取中脘關元天樞神闕。

泄利不止，小腹絞痛，灸丹田百壯三報穴。

渴飲水多，水穀一時下者，灸大椎三五壯，立已。

泄利不嗜食，灸長谷五十壯三報；穴在脅臍旁相去五寸，一名循元穴。

刺灸飧泄有三法：其一取脾經云：『脾虛則腹滿腸鳴泄食不化，取其經足太陰陽明。』又云：『飧泄取三陰之上補陰陵泉皆久留之，熱行乃止』又云『飧泄取三陰』者是也，三陰者太陰也。

大腸病者，腸中切痛而鳴濯濯，冬日重感於寒即泄，當臍而痛，不能久立，與胃同候，取巨虛上廉。

飧泄取三陰之上，補陰陵泉，皆久留之，熱行乃止。

甲乙經曰：溢飲水道不通，溺黃，小腹痛，裏急腫，洞泄，體痛引骨，京門主之。

痿厥癲疾洞泄，然谷主之。

奔豚，寒氣入小腹，時欲嘔，傷中溺血，小便數，背臍痛，引陰，腹中窘急欲湊，後泄不止，關元主之。

頭痛，食不下，腸鳴臚脹，欲嘔時泄，三焦俞主之。

腹滿臚脹，大便泄，意舍主之。

腹脹腸鳴，氣上衝胷，不能久立，腹中痛濯濯，冬日重感於寒則泄，當臍而痛，腸胃間遊氣切痛，食不化，不嗜食，身腫俠臍急，天樞主之。

腸中寒，脹滿善噫，聞食臭，胃氣不足，腸鳴腹痛泄，食不化，心下脹，三里主之。

腰痛，大便難，飧泄，腰尻中寒，中窌主之。

千金方曰：治四肢不可舉動，多汗洞利，灸大横，隨年壯。穴在俠臍兩邊各二寸五分。

腹疾腰痛，膀胱寒，澼飲注下，灸下極腧，隨年壯。

大都太白，主暴泄，心痛腹脹，心痛尤甚。

陽綱主大便不節，小便赤黃，腸鳴泄注。

屈骨端主小便不利，大便泄數，并灸天樞。

京門然谷陰陵泉，主洞泄不化。

不知也。淳于司馬病法當後九日死。即後九日不死，其家復召臣意，臣意往問之，盡如意診。臣即爲三火齊米汁使服之，七八日病已。所以知之者，診其脈時，切之盡如法，其病順，故不死。

儒門事親曰：趙明之水穀不消，腹作雷鳴，自五月至六月不愈，諸醫以爲脾受大寒，故併與聖散子、豆蔻丸，雖止一二日，藥力盡而復作。諸醫不知藥之非，反責明之不忌口。戴人至而笑曰：『春傷於風，夏必飧泄。』飧泄者，水穀不化而直過下出也。又曰：『水穀不化，熱氣在下，久風入中。』中者，脾胃也。風屬甲乙，脾胃爲戊己，甲乙能剋戊己，腸中有風，故鳴。經曰：『歲木太過，風氣流行，脾土受邪，民病飧泄。』診其兩手脈，皆浮數，爲病在表也，可汗之。直斷曰：『風隨汗出。』以火二盆，暗置牀之下，不令病人見火，恐增其熱，紿之入室，使服涌劑，以麻黃投之，乃閉其戶，從外鎖之，汗出如洗，待一時許，開戶減火一半，須臾汗止，泄亦止。

一講僧顯德明，初聞家遭兵革，心氣不足，又爲寇賊所驚，得臟腑不調，後入京不伏水土，又得心氣，以至危篤，前後三年，八仙丸、鹿茸丸、燒肝散皆服之，不效，乃求藥於戴人。戴人曰：『此洞泄也，以謀慮久不決而成。肝主謀慮，甚則乘脾，久思則脾濕下流。』乃上涌痰半盆，末後有血數點，肝藏血故也。又以舟車丸、濬川散下數行，仍使澡浴出汗，自爾日勝一日，常以胃風湯、白朮散調養之，一月而強食復故矣。

李德卿妻因產後病泄一年餘，四肢瘦乏，諸醫皆斷爲死證。戴人曰：『兩手脈皆微小，乃利病之生脈，況洞泄屬肝經，肝木剋土而成此疾，亦是腸澼。澼者，腸中有積水也。』先以舟車丸四五十粒，又以無憂散三四錢，下四五行。人皆駭之，病羸如此，尚可通耶？然亦未敢諸，且更看之。復與導飲丸以通之，渴則調以五苓散，向晚使人伺之，已起而據牀，前後約三四十行，以胃風湯調之，半月而能行，一月而安健。由此皆服，德卿昆仲亦咸異之。

劉德源病洞泄逾年，食不化，肌瘦力乏，行步傾欹，面色黧黑，舉世治利之藥皆用無效。適戴人至㵐陽，往問之。戴人

其二取腎;腎經云『腎藏志,志有餘,腹脹飧泄,瀉然筋血』者是也。然筋謂然骨,視血絡盛則瀉之。

其三取肝;肝經云『肝足厥陰之脈所生病者,胷滿嘔逆飧泄』是也。視盛虛寒熱陷下施法也。

## 導引

保生祕要曰:水瀉導引法,撮緊穀道,交雙足而立,幷目存神,垂兩拳而直,縮腹聳肩,用意上提,力吸三五,少間督氣上升,瀉利止矣。

運功先用歸元聚氣,次推大腸曲行,瀉火收回,復顧念臍取靜,候瀉定,服氣補之。

止瀉法,先念臍,或以兩手心覆之臍上,甚者將兩眼之神藏之臍中。

歸元聚氣訣。歸元者,父母生人受氣之初,剪斷臍帶一點落根元也。有生之後,情欲雕琢,未免情耗氣散,不能返本,須求安土敦仁之法。蓋土者圭元也,仁者人也,以一點仁心,敦養於土,六根皆歸於元,心有所注,久久凝定,便覺眞種常在,方可用意運行,行之之法,提氣出上,斡旋造化,從左而右,先運臍輪,收而放,放而復收,以還本位,不離這箇念自歸眞矣。

## 醫案

史記倉公傳曰:陽虛候相趙章病,召臣意,衆醫皆以爲寒中,臣意診其脈曰:『迵風。』迵風者,飲食下嗌而輒出不留,法曰五日死,而後十日乃死,病得之酒,所以知趙章之病者,臣意切其脈,脈來滑,是內風氣也。飲食下嗌而輒出不留者,法五日死,皆爲前分界法,後十日乃死,所以過期者,其人嗜粥,故中藏實,中藏實故過期。師言曰:『安穀者

忘其圖。楊嘗曰『治洞泄不已之人，先問其所好之事，好碁者與之碁，好樂者與之笙笛勿輟：』

太康劉倉使病大便少而頻，日七八十次，常於兩股間懸半枚壺盧，如此十餘年。戴人見而笑曰『大便頻而少，欲通而不得通也，何不大下之？此通因通用一服藥之力也。』乃與藥大下三十餘行，頓止。

一男子病泄十餘年，豆蔻阿膠訶子龍骨烏梅枯礬皆用之矣。中脘臍下三里歲歲灸之，皮肉皴槁，神昏足腫，泄如泔水，日夜無度。戴人診其兩手脈沉且微，曰『生也。』病人忽曰『羊肝生可食乎？』戴人應聲曰『羊肝止泄，尤宜服。』病人悅而食一小盞許，以漿粥送之，又食羊肝生一盞許，次日泄幾七分，如此月餘而安。此皆忌口太過之罪也。戴人嘗曰『胃爲水穀之海，不可虛怯，虛怯則百邪皆入矣。或思葷茹，雖與病相反，亦令少食，圖引漿粥，此權變之道也。若專以淡粥責之，則病人不悅而食減，久則病增損命，世俗誤人也。』

維揚府判趙顯之病虛羸，泄瀉褐色，乃洞泄寒中證也。每聞大黃氣味，卽注泄。余診之，兩手脈沉而輭，令灸水分穴一百餘壯，次服桂苓甘露散胃風湯白朮丸等藥，不數月而愈。

痲先生妻當七月間，病臟腑滑泄，以去濕降火之藥治之，少愈。後腹脹及乳痛，狀如吹乳，頭重壯熱，面如渥丹，寒熱往來，嗌乾嘔逆，胷脅痛不能轉側，耳鳴。食不可下，又復瀉。欲瀉其火，臟腑已滑數日矣，欲以溫劑止利，又禁上焦已熱，實不得其法。使人就諸葛寺禮請戴人。戴人未至，因檢劉河間方，惟益元散正對此證，能降火解表，止渴利小溲定利安神，以青黛薄荷末調二升，置之枕右，使作數次服之。夜半徧身出冷汗如洗，元覺足冷如冰，至此足大煖，頭顱輕，肌涼痛減，嘔定利止。及戴人至，余告之已解，戴人曰『益元固宜，此是少陽證也，能使人寒熱徧劇，他經縱有寒熱，亦不至甚：旣熱而有利，不欲再下，何不以黃連解毒湯服之？』乃令診脈，戴人曰『娘子病來，亦常欲痛哭爲快否？』婦曰『欲如此，余亦不知所謂。』戴人曰『少陽相火，凌爍肺金，金受屈制，無所投告，肺主悲，但欲痛哭而

乃出示內經洞泄之說，雖不見疑，然毀其攻劑，夜焚香禱神曰：『某以病久不瘥，欲求治於戴人，戴人以為宜下之，欲不從，戴人名醫也，欲從之，形羸如此，恐不任藥，母已老矣，無人侍養，來日不得已，須服藥，神其相之。』戴人先以舟車丸無憂散下十餘行，殊不困，頗喜，食後以檳榔丸磨化其滯，待數日病已大減。戴人以為去未盡，當再服前藥，德源亦欣然，又下五行。後數日更以苦劑越之，往問其家，彼云已下村中收索去也。忽一日入城，面色極佳，語言壯健，但怪其跛足而立，問何故如此？曰：『足上患一瘤。』戴人曰：『此裏邪出而干外，病瘥之後，凡病皆如此也。』

一婦年三十餘，病滑泄經年，皆云虛中有積，以無憂散五七日一服，至二十服，不效；又服纏積丹、軟金丸諸藥，皆不效。其人服藥愈速，病勢愈甚，食飲日減。人咸謂曰：『此休息痢也，宜灸中脘及左右穴、臍下氣海，及膀胱穴，以三里引之。』每年當冬至日、夏至日灸之，前後至萬餘壯。或者曰：『此病我屢識，蓋大傷飲之故，即日桃花正開，俟其落時，以長棘針刺之，得數十蕚，勿犯人手，以白麵和作餅子，文武火燒令熟，嚼爛，以米飲湯下之。』病人如其言，服之不一二時，瀉如傾，前後瀉六七日，至數百行，昏困無所知覺，惟索冷水，徐徐而飲，至六七日少省。爾後食日進，神日昌，氣血日和，不數年生二子。此人本不知桃花蕚有取積之神效，亦偶得瀉法耳。

昔有人病飧泄不止，腹中雷鳴，泄注水穀不分，小便澀滯，皆曰：脾胃虛寒故耳。豆蔻、烏梅、罌粟殼、乾薑、附子，曾無一效。中脘、臍下灸已數十，躁熱轉甚，小溲涸竭，瘦而無力，飲食減少，命予視之。余謂應象論曰：『熱氣在下，水穀不分，化生飧泄，寒氣在上，則生䐜脹，而氣不散。何也？陰靜而陽動故也。』診其兩手，脈息俱浮大而長，身表微熱，而用桂枝麻黃湯，以薑棗煎大劑，連進三服，汗出終日，至旦而愈。次以胃風湯和平臟腑，調養陰陽，食進病愈。

相臺監酒岳成之病虛滑泄，日夜不止，腸鳴而口瘡，俗呼為心勞口瘡，三年不愈。余以長流水同薑棗煎五苓散五七錢，空心使服之，以治其下，以宜黃連與白茯苓去皮二味各等分為末，以白麪糊為丸，食後溫水下三、五十丸以

分有積痰脹氣致變[illegible]如琥珀，稠黏如膠，泄利遂止，不服他藥。

衛生寶鑑曰：中書左丞相史公，年六旬有七，至元丁卯九月間，因內傷自利數行，覺肢體沉重，不思飲食，嗜臥懶言語，舌不知味，腹中疼痛，頭亦痛而惡心，醫以通聖散作大劑料服之，覆以厚衣，遂大汗出，前證不除而反增劇，易數醫，四月餘不愈。余被召至燕，命余治之。余診視，得六脈沉細而微弦，不欲食，食即嘔吐，中氣不調，滯於升降，口舌乾燥，頭目昏眩，肢體倦怠，足胻冷，臥不欲起。丞相素不飲酒，肢體本瘦，又因內傷自利，又復獲汗，是重竭津液，脾胃愈虛，不能滋榮周身百脈，故使然也。非甘辛大溫之劑，則不能溫養其氣。經云：『脾欲緩，急食甘以緩之』，又『脾不足者，以甘補之』，黃芪人參之甘，補脾緩中，故以為君；『形不足者溫之以辛』，當歸辛溫，和血潤燥，木香辛溫，升降滯氣，生薑益智草豆蔻仁辛甘大熱，以蕩中寒，理其正氣，白朮炙甘草橘皮甘苦溫，乃厚腸胃，麥糵麵寬腸胃而和中，神麴辛溫，導滯消食，而為佐使也。右件㕮咀，一兩水煎服之，嘔吐止，飲食進，越三日，前證悉去。左右侍者曰：『前證雖去，九日不大便如何？』余曰：『丞相年高氣弱，既利且汗，脾胃不足，陽氣虧損，津液不潤也，豈敢以寒涼有毒之劑下之？仲景曰：『大發汗後，小便數，大便堅，不可用承氣湯。』如此雖內結，宜以蜜煎導之。』須臾去燥糞二十餘塊，遂覺腹中空快，上下氣調。又以前藥服之，喜飲食，但有所傷，則以橘皮枳朮丸消導之。至月餘，其病乃得平復。丞相曰：『病既去矣，當服何藥以防其復來？』余曰：『不然，但慎言語，節飲食，不可服藥。夫用藥如用刑，民有罪則刑之，身有疾則藥之，無罪妄刑，是謂虐民，無病妄藥，反傷正氣。軍志有曰：允當則歸，服而舍之可也。』丞相悅而然之。

丁巳，予從軍至開州，夏月有千戶高國用謂予曰：『父親年七十有三，於去歲七月間，因內傷飲食，又值霖雨，瀉利暴下數行，醫以藥止之，不數日，又傷又瀉，止而復傷，傷而復瀉，至十月間，肢體瘦弱，四肢倦怠，飲食減少，腹痛腸鳴，又以李醫治之，處以養臟湯治之，數日瀉止，後添嘔吐，又易以王醫，用丁香藿香人參去白橘皮甘草同為細末，加

為快也。』麻先生曰：『余家諸親，無不敬服，脈初洪數有力，自服益元散後已平。又聞戴人之言，便以當歸芍藥加入解毒湯中服之，大瘥矣。』

東門一男子病瀉利不止，腹鳴如雷，不敢冷坐，坐則下注如傾，諸醫例斷為寒證，乾薑官桂丁香豆蔻之屬枯礬龍骨，皆服之矣何針不燔？何艾不炷？遷延將二十載矣。一日，問於戴人，戴人曰：『兩手寸脈皆滑非寒也。其所以寒者，水也。』以茶調散湧寒水五七升，無憂散泄積水數十行，乃通因通用之法也。次以五苓散淡劑滲泄利之，又以甘露散止渴，不數日而冷食寒飲皆如故。此法王啓元稔言之矣，奈無人用之。

古郾一講僧病泄瀉數年，丁香豆蔻乾薑附子官桂烏梅等燥藥，燔針燒臍焫灸無有闕者，一日，發昏不省，檀那贈紙者盈門，戴人診兩手，脈沉而有力，脈訣云：下利脈微小者生，脈洪浮大者無瘥，』以瓜蔕散湧之，出寒痰數升，又以無憂散泄其虛中之積，及燥糞盈斗。次以白朮調中湯，五苓散，益元散。調理數日，僧已起矣。

殷輔之父年六十餘，暑月病泄瀉，日五六十行，自建雄鎮來請戴人於陳州。其父喜飲，二家人輩爭止之。戴人曰：『夫暑月年老，津液衰少，豈可禁水？但勸之少飲，』比及用藥，先令速歸，以菉豆雞卵十餘枚，同煮卵熟，取出令豆軟下，陳粳米作稀粥，攪令寒，食雞卵以下之，一二頓病減大半。蓋粳米雞卵皆能斷利，然後製抑火流濕之藥，調順而愈。

格致餘論曰：『病之有本，猶草之有根也。去葉不去根，草猶在也。治病猶去草，病在臟而治腑，病在表而攻裏，非惟戕賊胃氣，抑且資助病邪，醫云乎哉！族叔祖年七十，稟甚壯，形甚瘦，夏末患泄利，至深秋百方不應，余視之曰：『病雖久而神不瘁，小便澀少而不赤，兩手脈俱澀而頗弦，自言鬲微悶，食亦減，』因悟曰：『此必多年沉積，僻在腸胃。』詢其平生喜食何物？曰：『我喜物鯉魚，三年無一日缺。』余曰：『積痰在肺，肺為大腸之臟，宜大腸之本不固也：[illegible]少[illegible]次一碗許，自以指探喉中至半時辰吐

痛，四肢逆冷，冷汗自出，口鼻氣亦冷，六脈如蛛絲，時[illegible]，
十片，連鬚葱白九莖，水三升，煮至一升，去查，涼服。至夜半，氣溫身熱，思粥飲，至天明而愈。玉機眞臟論云：『脈細皮寒，氣少，泄利，飲食不入，此謂五虛。漿粥入胃，則虛者活！』信哉！魯齋許先生聞之，嘆曰：『病有輕重，方有大小，治有緩急，僉院之證，非大方從權急治，則不能愈也。至眞要大論云：『補下治下制以急，急則氣味厚。』此之謂也。

眞定總管史侯男十哥，年四十有二，肢體本瘦弱，於至元辛巳，因收秋租，佃人致酒，味酸不欲飲，勉飲三兩盃，少時腹痛，次傳泄瀉無度，日十餘行。越十日，便後見紅紫之類，腸鳴腹痛，求醫治之。曰：諸見血皆以爲熱，用芍藥蘗皮丸治之，不愈；仍不欲食，食則嘔酸，形體愈瘦，面色靑黃不澤，心下痞，惡冷物，口乾，時有煩躁，不得安臥，請予治之，具說其由。診得脈弦細而微遲，手足稍冷，內經云：『結陰者便血一升，再結二升，三結三升。』經云：『邪在五臟，則陰脈不和，陰脈不和則血留之。』結陰之病，陰氣內結，不得外行，無所稟，滲入腸間，故便血也。宜以平胃地榆湯治之，此藥溫中散寒，除濕和胃，服數服，病減大半，仍灸中脘三七壯，及胃募穴，引胃氣上升，滋榮百脈，復灸氣海百餘壯，生發元氣，灸後則進食生肉，又以還少丹服之，則喜飲食，添肌肉。至春，再灸三里二七壯，壯脾溫胃，生發元氣，此穴乃胃之合穴也。改服芳香之劑，戒以愼言語，節飲食，良愈。

征南元帥不鄰吉歹，年七旬，丙辰春，東征南迴，至楚丘，諸路迎迓，多獻酒醴，因而過飲，遂腹痛腸鳴，自利，日夜約五十餘行，咽嗌腫痛，耳前後赤腫，舌本強，涎稠黏，欲吐不能出，以手曳之方出；言語艱難，反側悶亂，夜不得臥。診得脈浮數，按之沉細而弦，即謂中書黏公曰：『仲景言下利清穀，身體疼痛，急當救裏；後身疼痛，清便自調，急當救表。救裏四逆湯，救表桂枝湯。總帥今胃氣不守，下利清穀，腹中疼痛，宜急治之，猶可少待。』公曰：『何謂也？』答曰：『內經云：「癰發於咽嗌，名曰猛疽。」此疾治遲則塞咽，塞咽則氣不通，氣不通則半日死，故宜急治。』於是遂砭刺腫上，紫黑血出，頓時腫勢大消，遂用桔梗甘草連翹鼠黏酒製黃芩升麻防風等分，㕮咀，每服約五錢，水煮濾清，令熱漱

生薑煎,數服而嘔吐止,延至今正月間,飲食不進,扶而後起,又數日,不見大便,乃問醫曰:『父親數日不見大便,何以治之?』醫曰:『老官人年過七旬,氣血衰弱,又况瀉利半載,脾胃又虛,津液耗少,以麻仁丸潤之可也。』衆親商議。一親知曰:『牛山人見證不疑,有果决,遂請治之。』診其脈,問其病證,曰:『此是風結也。』以搜風丸百餘丸服之,利下數行而死。予悔恨不已,敢以為問,予曰:『未嘗親見,將何以言?』高千戶退而去,或者曰:『予親見之,細說其證。』予曰:『人以水穀為本,今年高老人,久瀉,胃中津液耗少,又重瀉之,神將何依?靈樞經云:『形氣不足,病氣不足,此陰陽俱不足也,不可瀉之,瀉之則重不足,重不足則陰陽俱竭,血氣皆盡,五臟空虛,筋骨髓枯,老者絕滅,少者不復矣。』又曰:『上工平氣,中工亂脈,下工絕氣危生。』絕氣危生,其牛山人之謂歟!

眞定鈔庫官李提舉,年踰四旬,體幹魁梧,肌肉豐盛,其僚友師君告之曰:『肥人多風證,君今如此,恐後致中風。搜風丸推陳致新化痰,宜服之。』李從其言,遂合一料,每日服之。至夜下五行,如是半月,覺氣短而促,至一月餘,添怠惰嗜臥,便白膿,小便不禁,足至膝冷,腰背沉痛,飲食無味,仍不欲食,心胸痞滿,時有躁熱,健忘,恍惚不安,凡三易醫,皆無效,請余治之。余曰:『孫眞人曰:「藥勢有所偏助,令人臟氣不平,藥本攻疾,無病不可餌,平人穀入於胃,脈道乃行,水入於經,其血乃成,水去則榮散,穀消則衞亡,榮散衞亡,神無所依。」君本身體康強,五臟安泰,妄以小毒之劑,日下數行,初服一日,且推陳下行,宿積已去,又何推焉?今飲食不生肌膚,水穀不能運化精微,灌溉五臟六腑,週身百脈,神將何依?故氣短而促者,眞氣損也。怠惰嗜臥者,脾氣衰也。小便不禁者,膀胱不藏也。便下膿血者,胃氣下脫也。足胻寒而逆者,陽氣微也。時有躁熱,心下虛痞者,胃氣不能上榮也。恍惚健忘者,神明亂也。金匱要略云:「不當下而強下之,令人開腸洞泄,便溺不禁而死。」前證之來,非天也,君自取之。治雖粗安,促君命期矣。』李聞之,驚恐汗浹於背,起謂余曰:『妄下之過,悔將何及!雖然,君當盡心救其失。』余以為病勢過半,命將難全,固辭而退。至秋[illegible]所謂大惑之人也。衞

者也。難經有云『見肝之病，則知肝當傳之於脾……』各刑已之不勝，當重實其不勝，微瀉其勝』而以黃芪建中湯加芍藥附子主之。且芍藥味酸，瀉其肝木，是微瀉其勝；黃芪甘草甘溫，補其脾土，是重實其不勝；桂附辛熱，瀉其寒水，助陽退陰；飴糖甘溫，補脾之不足，肝苦急，急食甘以緩之；生薑大棗辛甘大溫，生發脾胃升騰之氣，行其榮衞，而緩其急。每一兩依法水煎，再服而愈。

叅政商公時年六旬有二，元有胃氣之證。至元己巳夏上都住時，值六月霖雨大作，連日不止，因公務勞役過度，致飲食失節。每日則臍腹作痛，腸鳴自利，須去一二行，乃少定，不喜飲食，懶於言語，身體困倦，召予治之。予診其脈沉緩而弦。參政以年高氣弱，脾胃素有虛寒之證，加之霖雨及勞役飲食失節，重虛中氣。難經云：『飲食勞倦則傷脾，不足而往，有餘隨之。若歲火不及，寒乃大行，民病騖溏。今脾胃正氣不足，腎水必挾水勢反來侮土，乃薄所不勝，乘所勝也。此疾非甘辛大熱之劑，則不能瀉水補土，雖夏暑之時，有用熱遠熱之戒。』又云『有假者反之』，是從權而治其急也。內經云：『寒淫於內，治以辛熱』，乾薑附子辛甘大熱，以瀉寒水，用以爲君；『脾不足者，以甘補之』，人參白朮甘草陳皮苦甘溫，以補脾土，胃寒則不欲食，以生薑草豆蔻辛溫治客寒犯胃，厚朴辛溫厚腸胃，白茯苓甘草助薑附以導寒濕，白芍藥酸微寒，補金瀉木，以防熱傷肺氣，爲佐也。不數服愈。

醫宗必讀曰：大宗伯董元宰，夏初水泄，完穀不化，曾服胃苓湯及四君子湯不效。予曰：經云：『春傷於風，夏生飧泄』，謂完穀也。用升陽除濕湯加人參二錢，三劑頓止。

大司寇姚岱芝，吐痰泄瀉，見食則惡，面色痿黃，神情困倦，自秋及春，無劑弗投，經久不愈。比予診之，口不能言，亟以補中益氣去當歸，加肉果半夏各二錢，熟附炮薑各一錢，人參四錢，日進二劑，四日而瀉止，但痰不減耳。余曰：『腎虛水泛爲痰，非八味丸不可，應與補中湯並進。』凡四十日，服人參一斤，飲食大進，痰亦不吐，又半月而酬對如常矣。

冷吐，去之嚥之，恐傷脾胃，自利轉甚，再服涎清腫散，語言聲出。後以神應丸辛熱之劑以散中寒，解化宿食而燥脾濕，丸者，取其不即施化，則不犯其上，熱至其病所而後化，乃治主以緩也。不數服，利止痛定。後胷中閉塞，作陣而痛，予思靈樞有云：『上焦如霧，宜五穀味，熏膚充身澤毛，若霧露之溉，是爲氣也。今相公年高氣弱，自利無度，致胃中生發之氣，不能滋養於心肺，故閉塞而痛。經云：『上氣不足，推而揚之，脾不足者，以甘補之。』再以異功散甘辛微溫之劑，溫養脾胃，加升麻人參，上升以順正氣，不數服，而胷中快利而痛止。內經云：『調氣之方，必別陰陽，內者內治，外者外治，微者調之，其次平之，勝者奪之，隨其攸利，萬舉萬全。』又曰：『病有遠近，治有緩急，無越其製度。』又曰：『急則治其標，緩則治其本。』此之謂也。

征南副元帥大忒木兒，年六旬有八，戊午秋征南，予從之，過揚州十里時，仲冬，病自利，完穀不化，臍腹冷疼，足胻寒，以手搔之，不知痛癢，嘗燒石以溫之，亦不得煖。予診之，脈沉細而微。予思之，年高氣弱，深入敵境，軍事煩冗，朝暮形寒，飲食失節，多飲乳酪，履於卑濕，陽不能外固，由是清濕襲虛，病起於下，故胻寒而逆。內經云：『感於寒而受病，微則爲欬，盛則爲泄爲痛。』此寒濕相合而爲病也。法當急退寒濕之邪，峻補其陽，非灸病必不已。先以大艾炷於氣海，灸百壯，補下焦虛陽，次灸三里穴，各三七壯，治胻寒而逆，且援引陽氣下行，又灸三陰交二穴，以散足受寒濕之邪。遂處方云：『寒淫所勝，治以辛溫，濕淫於外，平以苦熱，以苦發之，以附子大辛熱，以助陽退陰，溫經散寒，故以爲君；乾薑官桂大熱辛甘，亦除寒濕，白朮半夏苦辛溫而燥脾濕，故以爲臣；人參草豆蔻炙甘草甘辛大溫，溫中益氣，生薑大辛溫，能散清濕之邪，葱白辛溫，以通上焦陽氣，故以爲佐；又云：『補下治下，制以急，急則氣味厚，故大作劑服之。』不數服，瀉止痛減，足胻漸溫，調其飲食，逾十日平復。明年秋，過襄陽，值霖雨閱旬餘，前證復作，再依前灸添陽輔各三七壯，再以藥投之，數服良愈。

光祿楊立之元氣素虧，飲食難化，泄瀉不已，小便[illegible]

凡泄瀉服分利調補等劑不應者，此肝木鬱於脾土，必用升陽益胃之劑，庶能保生。

太守朱陽山因怒腹痛作泄，或兩脅作脹，或胸乳作痛，或寒熱往來，或小便不利，或飲食不入，嘔吐痰涎，神思不清，此肝木乘脾土，用小柴胡加山梔、炮薑、茯苓、陳皮、製黃連，一劑即愈。

一儒者季夏患泄瀉，腹中作痛，飲食無味，肢體倦怠，余用補中益氣湯、八味地黃丸，月餘而痊。後彼云：『每秋間必患痢，今則無恙，何也？』余曰：『此閉藏之月，不遠幃幕，妄泄真陽而然。前藥善能補真火，火能生土，脾氣生旺而免患也。』

古今醫統曰：滄洲翁治一人病下利，完穀，衆以洞泄中寒，服理中、四逆輩，轉劇。脈兩尺寸俱弦長，右關浮於左關一倍，目外眥如草滋。知肝風傳脾，因成飧泄，非臟寒也。以小續命湯損麻黃加白朮，服三五升，利止。續命非止利之藥，飲不終劑而利止者，以從本治故也。

夫人病飧泄彌年，醫以休息利治之，以苦堅辛燥之劑，弗效。時秋半，脈弦而浮，曰：『夫人之病，蓋病驚風，非飲食勞倦所致也。肝主驚，故虛風自甚，因乘脾而成泄。今金風正隆，至明春則病將益加。法當平木之太過，扶土之不及，而瀉自止。』夫人曰：『儂寓南閩時，平章燕公以銅符密授，因失心懼，由是疾作，公言信然。』以黃牸牛肝，和以攻風健脾之藥，愈。

醫門法律曰：吉長乃室新秋病灑淅惡寒，寒已發熱，漸至欬嗽，然病未甚也。服表散藥不愈，體日尩羸，延至初冬，飲以參朮補劑，轉覺懨懨欲絕，食飲不思，有欬無聲，瀉利不止，危在旦暮。醫者議以人參五錢、附子三錢，加入薑、桂、白朮之屬，作一劑服，以止瀉補虛，而收背水之捷。吉長徬徨無措，延僕診畢，未及交語，前醫自外亟至，見僕在坐，即令疏方。僕飄然而出，蓋以渠見既訛，難與語至理耳。吉長辭去前醫，堅請用藥，僕因謂曰：『是病總由悞藥所致，始先

奇效良方曰：趙從簡通判，甲辰年丁母憂，食素之久，苦瀉不止，日七八行，首尾歲年，每服他藥，不過一二日復作，服茱萸斷下丸而愈，後數年間遇瀉，服之又效。

醫學正傳曰：一人泄瀉，日夜無度，諸藥不效，偶得一方，用針砂地龍猪苓三味共爲細末，生葱搗汁調方寸匕貼臍上小便長而瀉止。

薛己醫按曰：光祿柴黼庵善飲，泄瀉腹脹，吐痰作嘔，口乾，此脾胃之氣虛，先用六君加神麴，痰嘔已止，再用補中益氣加茯苓半夏，瀉脹亦愈。此證若濕熱壅滯者，加葛花解醒湯分消其濕，濕既去而瀉未已，須用六君加神麴實脾土，化酒積。然雖爲酒而作，實因脾土虛弱，不可專主濕熱。

一羽士停食泄瀉，自用四苓黃連枳實麴蘖，益甚。予曰：『此脾腎虛也，當用六君加薑桂送四神丸。』不信，又用沉香化氣丸，一服臥牀不食，欬則糞出，幾至危殆，終踐予言而愈。蓋化氣之劑，峻厲猛烈，無經不傷，無臟不損，豈宜輕服。

秀才卜封君善飲，腹痛便泄，服分利化痰等劑，不應，其脈滑數，皮膚甲錯。余謂此酒毒致腸癰而潰敗也，辭不治，不信，仍服前劑，果便膿而歿。

一儒者小腹急痛，泄瀉清冷，大便欲去不去，予謂此命門火衰而脾土虛寒也，用八味丸月餘而愈。向後飲食失宜，前證仍作，小腹腫墜，此脾氣下陷也，用補中益氣湯而痊。

李蒲汀庚寅冬濕熱泄瀉，因未生子，惑於人言淡滲之劑能瀉腎，而服參芪等藥，後變黃疸，小便不利，腹脹胸痞。予曰：『有是病，必用是藥，須以淡滲疎導其濕熱。』遂用茵陳五苓散，諸證頓退，至辛卯冬生子。

沈大尹每五更即泄，予以爲腎泄，用五味子散數服而愈。後不慎起居，不節飲食，其泄復作，日夜無度，畏寒，飲食且

# 醫部彙考二百五十七

## 霍亂門一

### 黃帝素問

㊀氣交變大論

歲土不及，風迺大行，民病飧泄霍亂。

註土運不及，六己歲也。飧泄霍亂，風木傷土之病。

土鬱之發，民病霍亂。

註感土氣而發。

### 漢張機金匱要略

㊀轉筋

轉筋之爲病，其人脚臂直，脈上下行，微弦，轉筋入腹者，雞屎白散主之。

㊁因食成霍亂

皮毛間灑淅惡寒發熱，肺金爲時令之燥所傷也，用表散已爲非法。至參朮補之，則肺氣閉錮，而欬嗽之聲不揚，胷腹飽脹，不思飮食，肺中之熱，無處可宣，急奔大腸，食入則不待運化而直出，食不入則腸中之垢汚亦隨氣奔而出，是以瀉利無休也。今以潤肺之藥，兼潤其腸，則源流俱清，寒熱欬嗽，泄瀉一齊俱止矣。但取藥四劑，服之必安，不足慮也。方用黃芩地骨皮甘草杏仁阿膠，初進一劑，瀉卽少止。四劑畢而寒熱俱除，再數劑而欬嗽全愈矣。設當日與時輩商之，彼方執參附爲是，能從我乎？

沈若玆乃郞，因痘後食物不節，病瀉，瀉久脾虛，病瘧，遂爾腹痛脹大，三年來服消導藥無筭，腹脹及瀉利總不愈。去歲迎醫服參苓白朮，稍效，醫去仍復如故。病本腹脹，更兼腸澼者，大腸之氣，空洞易走，胃中傳下之物，總不停畜，澼出無度，腥水不臭，十中五死五生之證，今則病勢轉深，又加四逆矣。暮熱朝涼，一逆也；大渴引湯救急，二逆也；氣喘不能仰睡，三逆也；多汗煩躁不甯，四逆也。無病人腹中之氣，運轉收攝，是以身體輕快，大便省約，今爲久瀉，遂至氣散不收，腹之脹，腸之鳴，便出之不自知，皆此故也。氣旣散而不收，又服行氣利水之藥，不愈增其散乎？無病人身中榮衞，兩無偏勝，故陽勝則發熱，陰勝則惡寒，病瘧之時，寒熱交作，猶是陰陽互戰，迨瀉久亡陰，整夜發熱，一綫之陰，爲陽所乘，求其相戰不可得矣。內水虧竭，燎原之火自焚，不得不引外水以濟急。然有形之水，不足以制無形之火，徒增脹瀉，而重傷其陰氣耳。醫不淸其源，以香燥之藥，助火刦陰，如官桂肉豆蔻等類，用之悞矣。夫男子氣海在於臍下，乃元氣之舍，性命之根也。久瀉則眞氣亦散，勢必上干淸道，而不下行，鼻中鼾鼾有聲，不能仰臥，是其徵也。夫此已散之氣，必不能復歸其處，但冀未散之氣，不致盡散則可耳。屢服木香檳榔蘇子腹皮厚朴等降氣之藥，尤悞之悞矣。至於汗出煩躁，則陰氣虛盡，孤陽亦不能久留之兆也。總如歲運有溫熱無寒涼，有生長無收藏，人物其免天札疵癘乎？於此而圖旋轉之功，亦難之難矣。若玆見案，轉托戚友強懇用藥，因以淸燥潤肺爲主，阿膠地黃門冬[illegible]月三日爲藥所苦，得比甘味，稱爲糖也。日爭十餘次，服之半月，藥盡遂大效。身涼氣平，不渴

㊀脈法

右手關上脈陰虛者，足太陰經也。病苦泄注，腹滿氣逆，霍亂嘔吐，黃疸心煩，不得臥。脈伏者霍亂。

## 脈訣

㊀脈法

雜病歌曰：霍亂之候脈微遲，氣少不語大難醫。三部浮洪必救得，古今課定更無疑。

伏脈歌曰：伏爲霍亂吐頻頻，腹痛多緣宿食停，蓄飲老痰成積聚，散寒溫裏莫因循。

## 唐孫思邈千金方

㊀總論

原霍亂之爲病也，皆因飲食，非關鬼神。夫飽食腥膾，復餐乳酪，海陸百品，無所不噉，眠臥冷席，多飲寒漿，胃中諸食，結而不消，陰陽二氣，擁而反戾，陽氣欲升，陰氣欲降，陰陽乖隔，變成吐利，頭痛似破，百節如解，遍體諸筋，皆爲回轉，論證雖小，卒病之中，最爲可畏。雖臨深履危，不足以諭之。養生者宜達其旨趣，庶可免於夭橫矣。

凡霍亂務在溫和將息，若冷卽遍體轉筋。凡此病定一日不食爲佳，乃須三日少少粥食，三日以後可恣意食息，七日勿雜食爲佳，所以養脾氣也。

大凡霍亂皆中食膾酪，及飽食雜物過度，不能自裁，夜臥失覆，不善將息所致，隕命者衆。人生稟命，以五臟爲主，夫

驢馬肉合猪肉食之，成霍亂。

兔肉著乾薑食之，成霍亂

## 傷寒論

### ㊀辨霍亂病脈證治

問曰：『病有霍亂者何？』答曰：『嘔吐而利，是名霍亂。』

問曰：『病發熱頭痛身疼，惡寒吐利者，此屬何病？』答曰：『此名霍亂。霍亂自吐下，又利止復更發熱也。』

傷寒其脈微濇者，本是霍亂，今是傷寒，却四五日至陰經上轉入陰，必利。本嘔下利者，不可治也。似欲大便而反失氣，仍不利者，此屬陽明也。便去鞕，十三日愈，所以然者，經盡故也。

下利後當便鞕，鞕則能食者愈。今更不能食，到後經中頗能食，復過一經能食，過之一日當愈，不愈者不屬陽明也。

霍亂頭痛發熱，身疼痛，熱多欲飲水者，五苓散主之。

寒多不用水者，理中丸主之。

惡寒脈微而復利，利止亡血也。四逆加人參湯主之。

吐利止而身痛不休者，當消息和解其外，宜桂枝湯小和之。

吐利汗出，發熱惡寒，四肢拘急，手足厥冷者，四逆湯主之。

既吐且利，小便復利而大汗出，下利清穀，內寒外熱，脈微欲絕者，四逆湯主之。

吐已下斷，汗出而厥，四肢拘急不解，脈微欲絕者，通脈四逆加猪膽汁湯主之。

吐利發汗，脈平小煩者，以新虛不勝穀氣故也。

[illegible]

者，理中丸。凡覺此證，或先五苓益元桂苓甘露飲，乃吐瀉之聖藥，愼無與粟米粥湯穀入於胃則必死本草曰『粟米味鹹，微寒無毒，主養胃氣，去脾胃中熱而益氣。』霍亂者脾胃極損，不能傳化，加以粟米如人欲斃更以利刀鋸其首，豈有能生者耶？如吐瀉多時，欲住之後，宜微以粥飲，漸漸養之，以遲爲妙。

如吐泄不止，身出冷汗，無脈者，可服泄利門中漿水飲，兼桂枝湯白朮湯，皆可服。痢門中藥，亦可選用。

吐下霍亂三焦爲水穀傳化之道路，熱氣甚則傳化失常，而吐瀉霍亂，火性躁動故也。或云『熱無吐瀉，止是停寒』者，誤也。大法吐瀉煩渴爲熱，不渴爲寒或熱吐瀉始得之。亦有不渴者，若不止則亡液而後必渴。或寒本不渴若亡津液過多，則亦燥而渴也。但寒者脈當沉細而遲，熱者脈當實大而數，或損氣亡液過極，則脈亦不能實數而反弱緩，雖爾亦爲熱矣。

霍亂吐下濕爲留飲痞隔，而傳化失常，故甚則霍亂吐瀉也。

一切吐瀉霍亂通宜五苓散益元散白朮散，吐瀉煩渴，幷中外諸邪所傷，而吐瀉腹滿痛悶者，並皆桂苓甘露飲，淡滲湯。

## 成無己明理論

### ㈠總論

傷寒霍亂，何以明之？上吐而下利，揮霍而撩亂是也。邪在上焦者，但吐而不利，邪在下焦者，但利而不吐，若邪在中焦，胃氣不治，爲邪所傷，使陰陽乖隔，遂上吐而下利，若止嘔吐而利，經止謂之吐利，必也上吐下利，躁擾煩亂，乃謂之霍亂，其與但稱吐利者，有以異也。傷寒吐利者，邪氣所傷，霍亂吐利者，飲食所傷也。其有兼傷寒之邪，內外不和

五臟者，即是五行，內爲五行，外爲五味，五行五味，更宜扶抑，所以春夏秋冬，逆，調理之食啖，不可過度。凡飲食於五臟相剋者，爲病相生者無他，經曰：『春不食辛，夏無食鹹，季夏無食酸，秋無食苦，冬無食甘。』此不必全不食，但愼其太甚耳。諺曰：『百病從口生。』蓋不虛也。四時昏食，不得太飽，皆能生病，從夏至秋分，忌食肥濃，然熱月人自好冷食，更與肥濃，兼食果菜無節極，遂逐冷眠臥，冷水洗浴，五味更相剋賊，雖欲無病，不可得也。所以病苦人自作之，非關運也。書曰：『非天夭人，人自絕命。』此之謂也。

凡諸霍亂，忌與米飲，胃中得米，即吐不止，但與厚朴葛根飲，若冬瓜葉飲，但沾漬咽喉，而不可多與。若服湯時，隨服吐者，候吐定乃與之。診脈絕不通，以桂合葛根爲飲。吐下心煩內熱，汗不出，不轉筋，脈急數者，可與犀角合葛根爲飲。吐下不止，發熱心煩，欲飲水，可少飲米粉汁爲佳。若不吐，與葛根薺苨飲服之。

霍亂吐多者，必轉筋，不渴，卽臍上築，霍亂而臍上築者，爲腎氣動，當先治其築，治中湯主之，去朮加桂心。去朮者，以朮補虛故也。加桂者，恐作賁豚也。霍亂而臍上築，吐多者，若下多者，霍亂而驚悸，霍亂而渴，霍亂而腹中痛嘔，而吐利，嘔而利欲得水者，皆用治中湯主之。

# 金劉完素六書

## ㈠總論

醫之用藥，如將帥之用兵。本草曰：『良醫不能以無藥愈疾，猶良將無兵不足以勝敵也，故用藥如用兵。』轉筋霍亂者，治法同用兵之急，不可緩也。故吐瀉不止者，其本在於中焦，或因渴大飲，或因飲而過量，或饑而飽甚，或濕內甚，故陰陽交而不和，是爲吐瀉。仲景曰：『邪在上焦則吐，邪在下焦則瀉，邪在中焦則既吐且瀉，此爲急病也。』然吐利爲急，十死其一二。如揮霍撩亂而不得吐瀉，此名乾霍亂，必死。法曰：既有其入，必有所出，今有其入而不得其出者，否塞也。故[illegible]

[illegible]水橫流，山崩岸落，石迸沙飛，豈非太陰濕土怒發之象耶？故人病心腹滿脹腸鳴，而爲數便，甚則心痛脅䐜，嘔吐霍亂，厥發則注下，胕腫身重。啓元子云：『已上病證皆脾熱所生也。』乃知巢氏所論，正與素問啓元子相違，故內經治法，病急則治其標，緩則治其本，先可用淡劑流其濕，辛涼以退其風，鹹苦以解其暍，冰水以救其內涸，大忌食粟米粥，飲者立死。偉哉王冰之言脾熱一句，可以爲方！世俗止知取其頭巾而濯之，以飲其水，亦取黑豆皂礬頭垢寒涼，然近似，終不足以制其甚。又有以寒水沃其手足者，大非，四肢已厥，更以寒水沃之，則益厥矣，曷若以寒水沃其心之爲愈也。

夫霍亂吐瀉不止者，可用五苓散益元散，各停冰水調下五七錢。如無冰水，可用新汲水調下。桂苓甘露散，玉露散，清涼飲子，調下五七錢亦可。如無已上諸藥，可服地漿三五盞亦可。地漿者，可於淨地掘一坑，用新汲水一桶於內攪令渾，候澄清，連飲三五盞，立愈。大忌白朮湯，薑桂烏附，種種燥熱之藥，若服之則必死矣。

霍亂吐瀉，水穀不化，陰陽錯亂，可服淡劑，調以冰水，令頓服之，則愈。

凡嘔吐而瀉，病名曰何也？內經熱論云：『此乃轉筋霍亂之證也，何氣使然？此乃邪氣在於中焦，使陰陽二氣，不能升降，其證先心痛則吐，先腹痛則瀉，心腹俱痛，則吐瀉並作；致使揮霍之間，自然撩亂，』此證喜寒冷之物，可用冰水調五苓益元則愈矣。大忌熱物。『轉筋之病，治之奈何？』經曰：『勞者溫之，』溫者溫存之意也。又一法，生薑湯益元散，白朮散，禹攻散，加冰沉冷細細呷之。渴未止者，頻頻飲之。如無冰，新汲水亦得。

## 朱震亨心法

### (一)霍亂證治

者，加之頭痛發熱而吐利也。經曰：『病發熱頭痛，身疼，惡寒吐利者，此屬何病？』答曰：『此名霍亂，自吐下又利，止復更發熱也。』是霍亂兼傷寒者也。霍亂頭痛發熱，熱多欲飲水者，五苓散主之。寒多不用水者，理中丸主之。以其中焦失治，陰陽乖隔，必有偏者。偏陽則多熱，偏陰則多寒。許仁則曰：『病有乾霍亂，有濕霍亂，乾霍亂死者多，濕霍亂死者少。』蓋吐利則所傷之物得以出泄，雖甚則止，於胃中水穀泄盡則止矣。所以死者少。其乾霍亂而死者多，以其上不得吐，下不得利，則所傷之物不得出泄，擁閉正氣，關隔陰陽，煩擾悶亂，躁無所安，喘脹而死。嗚呼！飲食有節，起居有常者，豈得致霍亂耶？飲食自倍，腸胃乃傷，喪身之由，實自致爾。

## 元張從政儒門事親

### ㊀吐瀉死生如反掌說

巢氏，先賢也，固不當非之，然其說有誤者，人命所係，不可不辯也。今之醫者，家置本以爲繩墨，嗚呼！何今之人，信巢氏而不信素問也。此余不得不爲之說。且巢氏論：『霍亂吐瀉，皆由溫涼不調，陰陽清濁二氣相干，致腸胃之間，變而爲霍亂，寒氣客於脾則瀉，寒氣客於胃則吐，亦由飲酒食肉腥膾生冷過度，或因居處坐臥濕地，當風取涼，風之氣，歸於三焦，傳於脾胃，脾胃得冷，水穀不消，皆成霍亂。其名有三：一曰胃反，胃氣虛逆，反吐飲食；二曰霍亂，言其病揮霍之間便致撩亂也；三曰晡食，變逆者也。霍亂者脈必代。』又云：『七月間食蜜，令人暴下霍亂。』此皆巢氏霍亂之論也。予以爲不然。夫醫之治病，猶書生之命題，如秋傷於濕，冬生欬嗽，是獨以濕爲主，此猶書生之獨脚題也。風濕暍三氣合而成霍亂吐瀉轉筋，此猶書生之鼎足題也。風者風木，內應足厥陰肝木；濕者雨化，內應足太陰脾土；暍者火熱，內應手少陰心火，此風濕暍三氣之所生也。內經曰：『土氣之下，木氣乘之。』是肝木乘脾土也。又曰[illegible]少陽所至爲嘔涌，』注云食不下也。『太陰所至爲中滿霍亂吐下，太陰所至爲濡化也。』

霍亂之疾，揮霍變亂，起於倉卒，[illegible]則手足厥逆，冷汗自出，或吐而不瀉，或瀉而不吐，或兼作吐瀉，或吐瀉不透，宜蘇合香丸以通其痞塞，繼進藿香正氣散加木香半錢，仍以蘇合香丸調吞來復丹，若果瀉已甚，則不可用來復丹。瀉而不吐，胷膈痞滿，先以陰陽湯或濃鹽湯頓服，以導其吐。已吐未吐，並藿香正氣散，間進蘇合香丸。吐而不瀉，心腹疞痛，頻欲登圊，苦於不通，藿香正氣散，加枳殼一錢，多下來復丹，欲捷則用生枳殼；若不能見效，逼迫已甚，其勢不容不用神保丸；但神保丸雖能通利，入大腸有功，若隔於上而不能下，轉服轉祕，須用來復丹研末，湯調，吞下養正丹百粒，庶可引前藥到下。吐瀉兼作，心腹纏擾未安者，藿香正氣散，加官桂木香各半錢，不愈則投四順湯。

吐利不止，元氣耗散，病勢危篤，或水粒不入，或口渴喜冷，或惡寒戰掉，手足冷逆，或發熱煩躁，欲去衣被，此蓋內虛陰盛，却不可以其喜冷，欲去衣被為熱，宜理中湯，甚則附子理中湯，不效則四逆湯，並宜放十分冷服。

欲吐不吐，欲瀉不瀉，心腹纏擾，痛不可忍，上下不通，言語不定，如見鬼神，俗謂之乾霍亂。先以濃鹽湯頓服，次調蘇合香丸，吞下來復丹，仍進藿香正氣散，加木香枳殼各半錢。近世俗醫，謂之攪腸沙，人多信之，殊不知即是霍亂，僥倖而愈者，一通之功耳。

霍亂轉筋，理中湯加凍膠剉炒一錢，仍令其繫縛腿脛。若筋入腹即通，身轉筋者不可治。轉筋者，以造麴蓼汁煖熱浸，或用濃鹽湯浸。

霍亂已透，而餘吐餘瀉未止，腹有餘痛，宜一味報秋豆葉煎服，乾者尤佳。

霍亂之後，陽氣已脫，或遺尿而不知，或氣少而不語，或膏汗如珠，或大躁欲入水，或四肢不收，皆不可治。霍亂并諸吐瀉後，胷膈高起，痞塞欲絕，理中湯加枳實半錢，茯苓半錢，名枳實理中湯。吐瀉已愈，而力怯精神未復者，十補飲。

夏天感暑吐瀉如霍亂者，六和湯香薷湯皆是要藥。大吐瀉，復厥逆躁擾，審其因暑得者，止宜香薷飲。

內有所積，外有所感，致成吐瀉，仍用二陳湯加減作吐以提其氣，此非鬼神，皆屬飲食，前人確論，乃陽不升，陰不降，乖隔而成，切莫與穀食，雖米飲一呷，入口即死，必待吐瀉過二三時，直至饑甚，方可與稀粥食之。脈多伏欲絕，或吐瀉不徹，還用吐提起其氣，或用樟木煎湯吐之亦可。大法生薑理中湯最好。不渴者可用，如渴者用五苓散。有吐者，以二陳湯探吐，亦有可下者。

轉筋不住，男子以手挽其陰，女子以手牽其乳近兩邊，此千金妙法也。

轉筋皆屬乎血熱，四物湯加酒芩紅花蒼朮南星煎服。

乾霍亂者最難治，死在須臾，升降不通，當以吐提其氣，極是良法。世多用鹽湯，此係內有物所傷，外有用氣所遏，有用吐者，則兼發散之義。有用溫藥解散者，不可用涼藥，宜二陳湯加解散藥。

霍亂之候，揮霍變亂，起於倉卒，多因夾食傷寒，陰陽乖隔，上吐下利，而躁擾痛悶，是其候也。偏陽則多熱，偏陰則多寒，卒然而來，危甚風燭。其濕霍亂死者少，乾霍亂死者多，蓋以所傷之物，或因吐利而盡泄出則止，故死者少也。夫上不得吐，下不得利，所傷之物，擁閉正氣，關格陰陽，其死者多。或有寒，腹滿而痛，四肢拘急，轉筋下利者，以理中湯加生附子官桂。

中暑霍亂，煩躁大渴，心腹撮痛，四肢冷，冷汗出，腳轉筋，用藿香散。千金云：轉筋者用理中湯，加火煅石膏，若霍亂吐瀉，心腹疞痛，先以鹽湯探吐，後服藿香正氣散，加木香半錢，若頻欲登圊不通者，更加枳殼一錢。人於夏月多食瓜果，多飲冷乘風，以致食留不化，因食成痞，隔絕上下，遂成霍亂，以六和湯倍加藿香煎服，皆要藥也。

## ㈡絞腸沙證治

絞腸沙作痛，以樟木煎湯大吐，或白礬調湯吐之。鹽湯亦可探吐，宜刺委中出血。

霍亂腹痛，心煩知飢不得[illegible]

霍亂轉筋吐瀉不止宜半夏湯爲末。渴者涼水下，不渴者溫水下，無時。如吐瀉不止，身無汗者，可與瀉利門漿水散兼桂枝湯。又可與白朮湯。

霍亂轉筋者用理中湯去朮加附子一枚生用。

霍亂之證，輕則上吐下瀉，兩脚轉筋，甚則徧體轉筋，腹肚疼痛，手足厥冷若欲絕者。倉卒之際，宜於臍中灼艾，及用蓼一把煎湯泡洗，次投以薑附理中湯之類。其脈洪大者易治，脈微臂縮舌卷者不治。

素問『土鬱之發，民病嘔吐霍亂注下，』又『太陰所至爲中滿霍亂吐下，』此濕土霍亂，即仲景五苓散理中丸之類是也。『歲土不及，風乃大行，民病霍亂飧泄，』此土虛風勝霍亂。即羅謙甫桂苓白朮散之類是也。『熱至則身熱霍亂吐下，』此熱霍亂，即活人書香薷散之類是也。

## 王綸明醫雜著

### ㈠霍亂

暑熱之時，外無寒邪，內傷冰水冷物，腹痛泄瀉，或霍亂吐逆，宜縮脾飲，砂仁草果甘草扁豆乾薑烏梅，或理中湯加神麯麥芽縮砂蒼朮，此專治內溫中消食也。若吐瀉脈沉微甚者，不可用涼藥，可用附子大順散，熟附子甘草乾薑杏仁桂，或附子理中湯加芍藥。夏月多食冷物，及過飲茶水，致傷脾胃吐瀉霍亂，故治暑藥多用溫脾消食，治濕利小便。醫者要識此意！若既傷暑熱，復傷生冷，外熱內寒，宜先治其內溫中消食，次治其外清暑補氣，而以理脾爲主。於前陰陽二條內相兼取用，東垣清暑益氣湯已兼此意。其用黃芪升麻人參白朮甘草麥門冬當歸五味黃蘗葛

人於夏月，多食瓜果及飲冷乘風，以致食留不化，因食成痞，隔絕上下，遂成霍亂，六和湯倍藿香煎熟，調蘇合香丸。

## 樓英醫學綱目

### ㈠霍亂

霍亂，證本自胃家，或因寒飲，或因飲水，或傷水毒，或感濕氣，冷熱不調，水火相干，陰陽相搏，轉筋攣痛，經絡亂行，暴作吐瀉，中焦胃氣所主也。察其色脈，隨經標本，此治霍亂吐瀉之法也。

霍亂徧身轉筋，肚痛，四肢厥冷欲絕者，其脈洪大易治；脈微，囊縮舌卷，不治。

吐瀉不止，當渴而反不渴，脈微細而弱者，理中湯。

吐瀉轉筋，身熱脈長，陽明本病也。宜和中四君子湯，平胃散，建中湯，每服一兩，水三盞，薑五片，煎至一盞，去查溫服。

或四君子湯。脈浮自汗者，四君子加桂主之。脈浮無汗者，四君子加麻黃主之。

如吐瀉轉筋，自汗脈浮者，四君子加桂五錢主之。

如吐瀉轉筋，脅下痛，脈弦者，宜木瓜柴胡湯，平胃散加木瓜五錢亦可也。

如吐瀉後，小便不通，胃中實痛者，四君子湯加大黃一兩主之。

如吐瀉轉筋，腹中痛，體重，脈沉而細者，宜四君子湯加芍藥高良薑。四君子湯四味各一兩，芍藥良薑各五錢，同煎服。

如吐瀉霍亂，四肢拘急，脈沉而遲者，此少陰也，宜四君子湯加薑附厚朴。四君子四味各一兩，生薑附子厚朴炮製各三錢，同煎服。

若果因暑熱傷氣而四肢困倦或手足麻木者先用人參益氣湯後用補中益氣湯

## 李梴醫學入門

### ㈠霍亂證治

一種暑霍亂，卽濕霍亂，但此疾夏秋爲甚，縱寒月亦多由伏暑，故名。一種濕霍亂，有聲有物，一種乾霍亂，有聲無物，其標因外感四氣，或日間感熱，夜間受冷，或內素鬱熱，外又感寒，一時陰陽錯亂，然病本因飲食失節，或酥酪酒漿生冷，以致濕熱內甚，中焦脾土失運，當升不升，當降不降，是以上吐下瀉，脈多伏絕。又有挾七情鬱氣，痰涎聚膈痞塞不通者，外感痰喘眩運，亦必由傷飲食爲之根也。

又有本伏暑而成者，蓋伏暑卽冒暑，久而藏伏三焦腸胃之間，熱傷氣而不傷形，旬月莫覺，變出寒熱不定，霍亂吐瀉膨脹，中滿瘧痢，煩渴腹痛下血等證。但暑病多無身痛，間有痛者，或爲澡浴水濕相搏耳。偏陽分則多熱而渴，偏陰分則多寒而不渴。

痰喘二陳湯加味半硫丸。虛煩不眠，旣濟湯，煩渴九君子湯，桂苓甘露飲。大渴大躁大汗遺尿者死，回生散，養正丹救之。

陽明胃與大腸以養宗筋，暴吐暴瀉，津液驟亡，筋失所養，故輕者兩脚轉筋而已，重者遍體轉筋，手足厥冷欲絕者，倉卒之際，宜以鹽塡臍中，灼艾不計壯數，雖已死而胷有煖氣者，立甦。急用茱萸散加小茴甘草，蘇葉煎服，再研生蒜塗脚心，雖昏危入腹者亦效。如血熱轉筋不已，四物湯加黃芩紅花，或蒼朮南星，水藥不入，古椒豆散。轉筋不住男子以手挽其陰，女子以手牽乳近兩邊。如舌卷囊縮，轉筋入腹者，死。

根，是清暑補氣也。蒼朮神麯陳皮澤瀉青皮，是治內補脾也。

註 按前證又當分別中暑中暍，脈虛脈沉，無汗有汗，發熱不熱，作渴不渴，或瀉不瀉，飲寒飲熱，辨其陰陽虛實，不可泛投寒涼之劑。蓋爲夏月伏陰在內，古人用附子大順散之類，溫補陽氣，厥有旨哉！何今之老弱至夏月患食少體倦，發熱作渴，或吐瀉腹痛頭痛諸證，反服香薷飲，復傷元氣，無不招引暑證，以致不起。至若清暑益氣湯內，用猪苓澤瀉之類，必審其果有濕熱壅滯，方可用之，否則虧損其陰，而傷其目矣，用當審察。

若夏秋暑熱，因過用冷物茶水傷其內，又過取涼風傷其外，以致惡寒發熱，胸膈飽悶，飲食不進，或兼嘔吐泄瀉，此內外俱傷寒冷也。人參乾薑炒至紫色，厚朴薑水炒陳皮羌活枳實白茯苓各一錢，白朮一錢五分，甘草炙五分，薑水煎，食前溫服。

註 按前證宜用此方。如未應，宜用藿香正氣散。若內外已解，寒熱未退，或飲食不進，宜用六君子。保命集云：「霍亂屬陽明證，宜用和中平胃建中湯輩，或四君子湯。脈浮自汗，四君子加桂枝主之。脈浮無汗，四君子加麻黃。吐利轉筋，脅下痛，脈弦者，木尅土也，用平胃散加木瓜，或建中加柴胡木瓜。吐利轉筋，腹痛體重，脈沉而細，四君子加白芍藥良薑。吐利四肢拘急，脈沉而遲，屬少陰，四君子加薑附厚朴。吐利四肢厥冷，脈微緩，屬厥陰，建中加歸附。吐利頭痛而身熱，熱多欲飲水者，五苓散。寒多不欲水者，理中丸主之。」元戎云：「太陰證霍亂者，理中加橘紅。吐下腹痛，手足逆冷，理中加熟附子。吐利後轉筋者，理中加火煆石膏一兩。」

若夏暑在途中常服，以壯元氣，清熱驅暑，服之免中暑霍亂泄瀉痢疾等證。方用人參一錢二分，白朮一錢五分，五味子十粒杵碎，麥門冬去心，白芍藥炒白茯苓各一錢，知母炒陳皮香薷各七分，黃芩炒三分，甘草炙五分，薑水煎，食前溫服。

乾霍亂者，氣痞於中，欲吐不得吐，欲泄不得泄，所傷之物壅閉正氣，關格陰陽，煩躁喘脹者必死，急以鹽湯一盞，入童便薑汁頓服，探吐令透，未吐再服。外用鹽炒吳茱萸熨臍下，即以理中湯加陳皮調之，或藿香正氣散加官桂倍枳殼茯苓木瓜呑蘇合香丸。如發熱頭腹痛者桂枝加大黃湯。

## 李中梓醫宗必讀

### ㈠總論治法

按霍亂者，揮霍變亂，起於倉卒，心腹大痛，嘔吐瀉利，憎寒壯熱，頭痛眩運，先心痛則先吐，先腹痛則先瀉，心腹俱痛，吐瀉並作，甚者轉筋入腹則斃。陰陽反戾，清濁相干，陰陽痞膈，上下奔迫，須遵內經分濕熱風暑虛實而爲施治。乾霍亂者，心腹脹滿攪痛，欲吐不吐，欲瀉不瀉，躁亂昏憒，俗名攪腸沙，此繇脾土鬱極，不得發越，以致火熱內擾，不可過於攻，過攻則脾愈虛，不可過於熱，過熱則火愈熾，不可過於寒，過寒則火必捍格，須反佐以治，然後鬱可開，火可散，古方用鹽熬湯調以童便，不獨降火兼能行血，極爲穩妥。霍亂多起於夏秋之間，皆外受暑熱，內傷飲食所致，縱冬月患之，亦由夏月伏暑也。轉筋者，兼風木，建中加木瓜柴胡湯。厥冷脣青，兼寒氣，建中加附子乾薑湯。身熱煩渴，氣粗，兼暑熱，桂苓白朮散，或香薷散。體重骨節煩疼，兼濕化，除濕湯。風暑合病，石膏理中湯。暑濕相搏，二香散。多食寒冷，六和湯倍藿香煎熟，調蘇合香丸。情志鬱結，七氣湯。轉筋逆冷，吳茱萸湯，或通脈四逆湯。邪在上者宜吐，雖已自吐利，仍當吐之，以提其氣，用極鹹鹽湯三椀，熱飲一椀，指探令吐，不吐再服一椀，吐訖仍飲一椀，三吐乃止，此法極良。吐利不止，元氣耗散，病勢危篤，或口渴喜冷，或發熱煩躁，欲去衣被，此陰盛格陽，不可以其喜冷欲去衣被爲熱，理中湯甚者附子理中湯。不效，四逆湯。並宜冰冷與服。霍亂已透，餘吐餘瀉未止，腹有餘痛，宜一味報秋豆葉煎

絞腸沙腹痛不可忍，或連心痛展轉在地，手足亦有冷者，乃腸絞縮在腹，須臾能死，急用熱湯調鹽一兩，灌入即安。或再用陳艾陳樟木陳壁土各等分，水煎，連進三四服，仍刺血。陰沙腹痛而手足冷，看其身上有紅點，以油燈心點火燎之即愈。陽沙腹痛而手足煖，以針刺其十指背近爪甲半分許，即揩爪甲而指背皮肉揩處血出即安。仍先自兩臂捋下其惡血，令聚指頭血出爲好。

霍亂乃濕熱兼風木爲害，治宜散風寒，利濕降火，故四時通用藿香正氣散，爲散風寒濕之要藥。寒月厥冷脈沉不渴者，五積散，理中湯，古薑附湯。暑月煩渴者，黃連香薷飲，冷服，俱宜合五苓散以分上下，或更合益元散降火尤妙。此皆分利法也。又當引清氣上升，使濁氣自然下降，吐瀉未徹者，宜用二陳湯加芎芷蒼朮防風探吐以提其氣。如吐湧不止，宜所服藥中加木瓜檳榔以降其氣。又有可下者，俱不可純用涼藥。挾七情者七氣湯，古參萸湯，傷飲食者紅丸子，保和丸，俱薑湯送下。通用四君子湯，有汗加桂枝，無汗加麻黃。吐利轉筋，腹痛體重，脈沉細，加白芍良薑。四肢拘急，脈沉遲，屬少陰，加薑附厚朴。吐利轉筋，脅痛脈弦者，木剋土也，平胃散加木瓜，或小建中湯加柴胡木瓜。四肢厥冷，脈微緩，屬厥陰者，小建中湯加當歸附子。

三焦爲水穀道路，邪在上焦，吐而不利，邪在下焦，利而不吐，邪在中焦，上吐下利，病因飲食不節，清濁相干，陰陽乖隔，輕者止曰吐利，重者揮霍撩亂，乃曰霍亂，外證必發熱惡寒，頭疼身痛，本傷寒病也，因邪入脾胃，故發爲吐利。然中焦爲寒熱之半，邪偏高居陽分者，則多熱而渴，五苓散分利之。邪偏下居陰分者，則多寒不渴，理中湯分利之。風寒濕勝者，藿香正氣散，除濕湯，五積散主之。暑勝大渴者，二香黃連散，益元散，柴苓散選用。傷食甚者平胃散，治中湯主之。轉筋者，氣不和也，俱加木瓜，或單用雞屎白略炒爲末，溫湯化下方寸匕。凡霍亂多責於熱，故夏秋爲盛，或熱伏於內，手足如冰，六脈沉伏，食即嘔逆，此火氣上奔而然，不可誤爲陰證。若吐利小便亦自利，而大汗出，下利清

㊀病分冒暑避暑

深居廣廈，納風涼，餐生冷，遏抑其陽而病暑者，一切治暑清涼之方，卽不得徑情直施。如無汗，仍須透表以宣其陽，如吐利急須和解以安其中。甚者少用溫藥以從治之。故冒暑之霍亂吐瀉以治暑爲主，避暑之霍亂吐瀉以和中溫中爲主，不可不辨也。

## 景岳全書 臣張介賓著

㊀論證

霍亂一證，以其上吐下瀉，反覆不甯而揮霍撩亂，故曰霍亂，此寒邪傷臟之病也。有外受風寒，寒氣入臟而病者，有不愼口腹，內傷食飲而病者，有傷飢失飽，飢時胃氣已傷，過飽食不能化而病者，有水土氣令寒濕傷脾而病者，有旱潦暴雨，清濁相混，誤中沙氣陰毒而病者，總之皆寒濕傷脾之證。邪在脾胃，則中焦不能容受，故從上而出則爲吐，從下而出則爲瀉。且凡邪之易受者，必其脾氣本柔，而既吐既瀉，則脾氣更虛。故凡治霍亂者，必宜以和胃健脾爲主。健者培補之謂，因邪氣已去，而胃氣受傷，故非培補不可。和者調和之謂，以胃氣雖傷，而邪猶未盡，故非察其邪正而酌爲調和不可。若寒少滯多，則但以溫平之劑調之。若滯因於寒，則非溫熱之劑不能。而諸家有言爲火者，謂霍亂之病，多在夏秋之間，豈得謂之傷寒乎？！謬亦甚矣。夫夏秋之交，正多臟寒之病，蓋一以盛暑將殺，新涼初起，天人易氣，寒之由也。一以酷暑當令，生冷不節，疾病因時，寒之動也。人以夏秋之外熱易見，而臟腑之內寒難見，故但知用熱遠熱，而不知用寒遠寒，見之淺陋如此，所以多誤也。

轉筋霍亂證，以其足腹之筋拘攣急痛，甚至牽縮陰丸，痛迫小腹，最爲急候，此足陽明厥陰氣血俱傷之候也。觀河

服，乾者尤佳。保命集云：「有從標而得者，有從本而得者，有從標本而得者，六經之變，治各不同，細察色脈，知犯何經，隨經標本活法施治，此大法也。」

## 王肯堂證治準繩

### (一)總論證治

靈樞有足太陰之別名曰公孫，去本節後一寸，別走陽明，其別者入絡腸胃，厥氣上逆則霍亂，實則腸中切痛，虛則蠱脹，取之所別有清氣在陰，濁氣在陽，營氣順脈，衞氣逆行，清濁相干，亂於腸胃則爲霍亂，取之足太陰陽明，不下，則取之三里。巢氏因此一條乃云：「霍亂者由陰陽清濁二氣相干，亂於腸胃間，因遇飲食而變，發則心腹絞痛，挾風而實者，身發熱頭痛體疼，虛者，但心腹痛而已。亦有因飲酒食肉腥膾生冷過度，居處不節，或露臥濕地，或當風取涼，風冷之氣，歸於三焦，傳於脾胃，水穀不化，皆成霍亂。」自巢氏之說行，後世守之以爲法，無復知內經諸條者矣。至劉河間乃云：「吐下霍亂，三焦爲水穀傳化之道路，熱氣甚則傳化失常，而吐瀉霍亂，火性躁動故也。世俗止謂是停食者誤也。轉筋者，亦是脾胃土衰，肝木自甚，熱氣燥爍於筋，則筋攣而痛，亦非寒也。」張戴人則以：「風濕暍三氣，合而爲邪，蓋脾濕土，爲風木所剋，鬱則熱乃發，發則心火炎上，故嘔吐，嘔吐者，暍也。脾濕下注，故注泄，注泄者，濕也。風急甚，故筋轉，筋轉者，風也。」可謂善推病情者乎！王海藏亦謂風濕熱外至，生冷物內加，內外合病者，此條殆似之矣。凡治病當從內經，隨宜施治，安可執一端而已哉？然則此病當以何爲要？曰：脾胃之濕爲本，諸邪感動者，爲病之由，然其間脾胃有虛邪，有實邪，有陰陽相干之邪，孰微孰甚，皆宜消息處治。至若明理論謂：「傷寒吐利者，由邪氣所傷，霍亂吐利者，由飲食所傷，其有兼傷寒之邪，內外不和者，加之頭痛發熱而吐利者，是霍亂傷寒也。」

宜六君子湯或溫胃飲主之。若但虛無滯者，宜理中湯或五君子煎主之。若虛而無寒者，止用四君子湯或五味異功散亦可。若虛在陰分，水中無火，因瀉而嘔惡不已，胃腹膨膨者，必用理陰煎或去當歸加人參主之。若吐利四肢拘急，脈沉而遲，此脾腎證也，宜四君子加薑附厚朴或理陰煎主之。

凡霍亂後身熱不退，脈數無汗者，宜酌其虛實，於前治法中加柴胡主之。寒邪甚者，宜用麻黃。吐利，脈浮自汗者，宜四君子加桂枝主之。吐利頭痛，身熱而渴者，宜五苓散。吐利因於過食，或瓜果生冷，以致食留不化，遂成痞隔霍亂者，宜大小和中飲或六和湯主之。若生冷寒勝者，宜加炮薑肉桂吳茱萸之類。

元戎曰：太陰證霍亂者，理中加橘紅，名治中湯。若吐下心腹作痛，手足逆冷，理中去白朮加熟附子，名四順湯。若吐利後轉筋者，理中加火煆石膏一兩。

轉筋腹痛者，因胃氣暴傷，以致陽明厥陰血燥筋攣而然，法當養血溫經，乃為正治。若邪滯未清者，或先宜和胃飲，加肉桂木瓜主之。若氣虛者，宜四君子湯加當歸肉桂厚朴木瓜之類。陰虛少血者，宜理陰煎，加肉桂木瓜主之。又治轉筋法，男子以手挽其陰，女子以手揪乳近兩邊，此千金法也。

霍亂之後多有煩渴者，此以吐利亡津，腎水乾涸，故渴欲飲水，但宜溫煖調脾，以止吐瀉，脾氣得和，渴將自止。或以獨參湯徐徐與之，最妙法也。其有本以陽臟，而因瀉亡陰，或見火盛喜冷，內熱脈洪者，宜益元散或竹葉石膏湯之類，甘涼以濟之，亦無不可。

㈢調攝宜素

夏秋新涼之交，或疾風暴雨，或乍寒乍煖之時，此皆陰陽相駁之際。善養生者，最於此時宜慎，凡外而衣被，內而口腹，宜增則增，宜節則節，略為加意，則却疾亦自不難。其或少有不調，而為微寒所侵，則霍亂吐瀉，攪腸腹痛瘧痢之

問曰：『轉筋經云反戾也，熱氣燥鑠於筋則攣瘛而痛，火主燔鑠燥動故也。或以為寒客於筋者，誤也。蓋寒雖主於收引，然止為厥逆禁固屈伸不便，安得為轉筋也？所謂轉者動也，陽動陰靜，熱證明矣。』丹溪亦曰：『轉筋屬血熱，』余謂此二子之言，總屬一偏之見，不可從也。試以內經質之，不有曰：『經筋之病，寒則反折筋急，熱則筋弛縱不收。』此轉筋者，謂非反折筋急之病者乎？而何以謂之熱也？夫所謂轉者，以其堅強急痛，有如扭轉之狀，是謂轉筋。今西北方以轉字作去聲者，即其義也。而河間曰轉者動也，則不為強矣。且凡患轉筋者，必於大吐大瀉之後乃有此證，未聞於吐瀉之前，而先見轉筋者也。若轉於吐瀉之前，而謂之火，猶可云因火而病也；既轉於吐瀉之後，則上下皆已火去，豈因吐瀉反生火耶？又何以吐瀉之前火不轉耶？河間其何以解之？蓋陽明為五臟六腑之海，主潤宗筋，此證以陽明血氣驟損，筋急而然，本非火也。觀無擇陳氏曰：『轉筋者，以陽明養宗筋，屬胃與大腸，今暴吐下，津液頓亡，外感四氣，內傷七情，攻閉諸脈，枯削於筋，宗筋失養，必至攣縮，甚則卵縮舌卷，為難治。』此說始為切當。若從河間而作火治，能無誤乎？余故曰不可從也。

乾霍亂證，最為危候，其證則上欲吐而不能出，下欲瀉而不能行，胸腹攪痛，脹急悶亂，此必內有飲食停阻，外有寒邪閉遏，蓋邪淺者易於行動，故即見吐利，邪深者陰陽格拒，氣道不通，故為此證。若不速治，多致暴死。宜先用鹽湯探而吐之，一以去其滯隔，一以通其清氣，但使清氣得升，然後濁氣得降，從瀉而出，斯不致害。藥以溫中散滯破氣等劑，庶乎胃氣可舒，而邪隨以散，宜排氣飲加減主之，或神香散，或局方七氣湯亦可酌用。

㈡治法

霍亂初起，當陰陽擾亂，邪正不分之時，惟宜以薑鹽淡湯徐徐與之，令其徐飲徐吐，或以二陳湯探吐之，則吐中自有發散之意。必俟滯濁大出，胃氣稍定，乃察其有無泄瀉，有無脹滿，有無嘔惡，以辨邪正虛實，然後隨其證而調理[illegible]霍亂之後，胃氣未清，邪氣未爭之時，凡一切食飲之類，當使稍遲，切不可急與粥湯以致[illegible]

法當從治之，方名轉治湯，白朮茯苓各三錢，芍藥五錢，藿香天花粉各一錢，紫[illegible]，
粒，水煎冷服，下喉即納，霍亂即定矣。此方之妙，妙在芍藥爲君，而佐之白朮茯苓，則肝氣自平，不來下尅脾土，則霍亂自定，況又有解暑之藥乎。尤妙在用肉桂藿香溫熱之藥，順暑熱之氣，引邪下行，而暗解紛紜，此實有鬼神不測之機，而用之刀圭之內也。

霍亂腹痛，欲吐不能，欲瀉不得，四肢厥逆，身青囊縮，必死之證也。然而其人一刻不亡，豈可聽之而不救乎？此證乃下虛寒而上感暑熱之氣，陰陽拂亂，上下不接，最危最急之候，法當用陰陽水吐之，若不應，急以救亂湯治之。人參五錢，香薷吳茱萸茯苓白朮木瓜各三錢，附子五分，藿香一錢，水煎服，下喉而氣即回矣。此治乾霍亂之神方也。若濕霍亂，又不可用此方，用白朮青蒿茯苓各五錢，香薷陳皮各一錢，砂仁三粒，一劑即回春矣。

腹痛之最急者，絞腸沙也。世人懼用官料藥，殊不知藥能去病，何畏官料哉？吾有一方最妙，不用官料之藥，而功力十倍勝之。方用馬糞一兩，炒黑，入黃土一撮，微炒，用黃酒乘熱服五錢，一劑即痛去如失。蓋馬糞最善止痛，而治腹痛尤神，用黃土者，因馬糞過行之迅速，得土而少遲，且黃土與脾土同性，相親引之入於病處，使馬糞易於奏功也。況又有黃酒佐之，則無微不達，非吐則瀉，氣一通而痛輒定矣。

類，頃刻可至。此其所忽者微，而所害者大也。且膏粱與藜藿不同，薄弱與強壯迥異，矧強者猶不可恃強，而弱者顧可以忘弱耶？此自珍者之不可忽也。

㈣分別三因

陳無擇曰：霍亂者，心腹卒痛，嘔吐下利，憎寒壯熱，頭痛眩運，先心痛則先吐，先腹痛則先瀉，心腹俱痛則吐利並作，甚至轉筋入腹，霍亂惡證無越於斯。蓋陰陽反戾，清濁相干，陽氣暴升，陰氣頓墜，陰陽痞隔，上下奔迫，治之惟宜溫煖，更詳別三因以調之：外因中風則惡風有汗，傷寒則惡寒無汗，冒濕則重著，傷暑則熱煩；內因九氣所致，鬱聚痰涎，痞隔不通，遂致滿悶，隨其勝復，必作吐利，不內外因，或諸飽食膾炙，恣飲乳酪冰脯寒漿旨酒，胃既䐜脹，脾臟停凝，內鬱必發，遂成吐利，當從不內外因也。

## 石室祕籙 臣陳士鐸著

㈠霍亂治法

霍亂之證，一時而來，少頃卽定，切不可與之食，當令忍飢一日，以陳皮香薷木瓜各一錢，白朮二錢，山楂五粒，藿香甘草各五分，白芍茯苓各三錢，治之則痛不再發。蓋霍亂乃暑之熱氣也，暑熱得食復聚而不可解，所以必使之餓，則暑邪盡散，名爲定亂湯。

夏令火熱鑠石流金，人有一時感犯暑邪，上吐下瀉，立刻死者，最可懼之證，切勿輕用香薷飲，亦莫妄用白虎湯，我有一方，名曰解熱消暑散，青蒿茯苓各一兩，乾葛香薷陳皮各一錢，白朮三錢，白扁豆二錢，治之卽安。此方妙在用青蒿茯苓爲君，青蒿最能解暑而去熱，一物而兩用之，引其暑熱盡從膀胱而出，而乾葛香薷之類，不過佐青蒿以

# 醫部彙考二百五十八

## 霍亂門二

### 方

㊀四逆湯仲景　治霍亂吐瀉陰證，脈沉身痛者。

甘草炙二兩，　附子一枚生用去皮臍破八片。　乾薑一兩。　右三味㕮咀，以水三升，煮取一升二合，去滓分溫再服。強人可用大附子一枚，乾薑三兩，涼服。

㊁四順湯千金方　治霍亂轉筋，內冷汗出嘔啘者。

附子一兩，　人參，　乾薑，　甘草各三兩。　右四味㕮咀，以水六升，煮取二升，分三服，一方無人參。

㊂當歸四逆加吳萸生薑湯仲景下同　治霍亂多寒，手足厥冷，脈絕。

生薑一兩，　當歸，　芍藥，　細辛，　桂心各三兩。　通草，　甘草各二兩。　吳萸二升，　大棗二十五枚。　右九味，㕮咀，以水六升，酒六升，合煮取五升，分五服。舊方用棗三十枚，今以霍亂病法多痞，故除之。如退棗入葛根二兩佳。霍亂四逆加半夏一合，附子小者一枚，惡寒乃與大附子。

㊃通脈四逆湯　治吐利已斷，汗出而厥，四肢拘急不解，脈微欲絕。

天南星湯泡洗七徧切焙乾秤　良薑各四兩　縮砂仁二兩　右爲細末生薑自然汁煮麪糊丸如梧桐子大每服十五丸或二十丸搗生薑浸湯下，不計時服。

㊀沉香溫胃丸 東垣十書　治中焦氣弱，脾胃受寒，飲食不美，氣不調和吐瀉等證。

附子炮去皮臍，　巴戟酒浸去心，　乾薑炮　茴香各一兩。　官桂七錢，　沉香，　甘草炙，　當歸，　吳茰洗炒去苦，　人參，　白朮，　白芍藥，　良薑，　白茯苓去皮，　木香各五錢。　丁香三錢。　右爲細末用好酢打麪糊爲丸如梧桐子大，每服五七十丸熱米飲送下空心食前日進三服。忌一切生冷物。

㊁沉香溫脾湯 衞生寶鑑　治脾胃虛冷心腹疼痛嘔吐惡心腹脅脹滿，不思飲食，四肢倦怠，或泄瀉如神。

沉香，　木香，　丁香，　附子炮去皮臍，　官桂，　人參，　縮砂仁，　川薑炮，　白豆蔻，　甘草炙，　白朮各等分。　右十一味爲末，每服三錢，水一盞薑五片，棗一箇煎至七分，去滓熱服，空心食前。作粗末亦可。

㊂理中湯 仲景

人參，　乾薑，　白朮各三錢。　甘草炙一錢。　水二鍾，煎一鍾，不拘時服。爲丸即名理中丸。　若爲寒濕氣所中者，加附子一錢名附子理中湯。　若霍亂吐瀉者，加橘紅青皮各一錢半名治中湯。　若乾霍亂心腹作痛先以鹽湯少許頻服，候吐出令透，即進此藥。　若嘔吐者，於治中湯內，加丁香皮半夏各一錢，生薑十片煎。　若泄瀉者加橘紅茯苓各一錢名補中湯。　若溏瀉不已者，於補中湯內加附子二錢。不喜飲食，水穀不化者，再加砂仁二錢。　若霍亂嘔吐心腹作痛手足厥冷，於本方內去白朮加熟附子名四順湯。　若傷寒結胷先加桔梗枳殼等分不愈者，及諸吐利後胷痞欲絕，心胷高起急痛手不可近者，加枳實白茯苓各一錢名枳實理中湯。　若渴者再於枳實理中湯內加苦蔞根一錢。　若霍亂後轉筋者理中湯內加火煆石膏一錢。　若臍上築者腎氣動也去朮加官桂一

大附子一枚，甘草一兩半，乾薑三兩，強者四兩。右三味吹咀，以水三升，煮取一升二合，分二服，脈出卽愈。若面色赤者，加葱白九莖。腹中痛者，去葱白加芍藥二兩。嘔逆加生薑三兩。咽痛去芍藥加桔梗一兩。利止脈不出者，去桔梗，加人參二兩，皆與方相應，乃服之。

㊄竹葉湯　治霍亂吐利，已服理中四順等湯，熱不解者。

竹葉一握，小麥一升，生薑十藥，甘草　人參，附子，芍藥各一兩。橘皮，當歸，桂心各二兩。白朮三兩。右十一味，吹咀，以水一斗半，先煮竹葉小麥，取八升，去滓下藥，煮取三升，分三服。上氣者，加吳茱萸半升，卽瘥。理中四順湯，皆大熱。若有熱，宜竹葉湯。

㊅附子粳米湯　治霍亂四逆，吐少嘔多者。

附子一枚，粳米五合，半夏半升，大棗十枚，乾薑，甘草，各一兩。右六味，吹咀，以水八升，煮取米熟，去滓，分三服。

㊆杜若圓千金方下同　治霍亂，人將遠行預備方。

杜若，藿香，白朮　橘皮，吳茱萸，乾薑，人參，厚朴，木香，鷄舌香，瞿麥，桂心，薊荷，女萎，茴香。右十五味等分爲末，蜜丸如梧子大，酒下二十丸。

㊇又方　治霍亂永不令發。

虎掌，薇御各二兩。枳實，附子，人參，檳榔，乾薑，各三兩。厚朴六兩，皂莢三寸，白朮五兩。右十味爲末，蜜丸如梧子大，每酒下二十丸，日三。

㊈大柴胡湯仲景　治傷寒汗出不解，心下痞鞕吐利者。

柴胡半斤，黃芩，芍藥各三兩。生薑五兩切，半夏半升洗，枳實四枚炙，大棗十二枚擘。右七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓再煎，溫服一升，日三服[illegible]

⑱建中加附子當歸湯　治前證

桂枝一兩，芍藥二兩，甘草半兩，膠錫半斤，附子炮，當歸各三錢。生薑一兩半，大棗六枚，同前法煎，

⑲止渴湯　治霍亂煩渴。

人參，麥門冬，茯苓，桔梗，栝蔞根，葛根，澤瀉，甘草炙各五錢。右爲細末每服二錢不拘時蜜湯調下。

⑳厚朴湯　治乾霍亂。

厚朴去皮生薑汁塗炙令香，枳殼去瓤麩炒，高良薑，檳榔，朴硝各七錢半。大黃炒二兩，右搗篩，每服三錢，水一盞半煎一盞溫服。

㉑冬葵子湯　治乾霍亂大小便不通，手足俱熱，悶亂。

冬葵子，滑石研，香薷各二兩。木瓜去瓤一枚。右搗篩，每服五錢，水二鍾，煎一鍾，溫服，日四五服。

㉒人參散　治脾胃虛寒，霍亂吐瀉，心煩腹痛，飲食不入。

人參，厚朴薑汁製，橘紅各一錢。當歸，乾薑炮，甘草炙各五分。右用棗水煎服。

㉓人參白朮散　治脾胃虛弱，吐瀉作渴不食。

白朮炒，白茯苓，人參，甘草炒，木香，藿香各五分。乾葛一錢。右用水煎服，吐甚加生薑汁頻飲之。

㉔木瓜煎　治吐瀉轉筋悶亂。

吳茱萸湯泡七次，生薑各二錢半。木瓜一兩半。每服二三錢，水煎服。

㉕回生散　治霍亂吐瀉過多，但一點胃氣存者，服之回生。

藿香，陳皮各五錢。右剉作一貼水煎溫服。

錢半。腎惡燥，去朮，恐作奔豚，故加官桂。若悸多者，加茯苓一錢。若渴欲飲水者，加白朮半錢。若寒者，加乾薑半錢。若腹滿者，去白朮加附子一錢。若飲酒多及啖炙煿熱食，發爲鼻衄，加川芎一錢。若傷胃吐血，以此藥能理中脘，分利陰陽，安定血脈，只用本方。

㊃二香散良方　治暑濕相搏，霍亂轉筋，煩渴悶亂。

大腹皮，甘草各半錢。藿香　白朮，厚朴，陳皮，茯苓，半夏，紫蘇，桔梗，白芷，香薷，黃連，扁豆各一錢。水二鍾，薑五片，葱白三根，煎至一鍾，不拘時服。

㊄香薷散活人書　治陰陽不順，清濁相干，氣鬱中焦，名爲霍亂，此皆飽食多飲，復睡冷薦，外邪內積，結而不散，陰陽二氣，壅而不反，陽氣欲降，陰氣欲升，陰陽交錯，變成吐利，百脈混亂，榮衛俱虛，冷搏筋轉，皆宜服此。

厚朴去皮，薑汁炒，黃連去鬚，薑汁炒，各二兩。香薷四兩，甘草半兩。右爲末，每服四錢，水煎，不犯鐵器，慢火煎之。兼治不時吐利，霍亂腹撮痛，大渴煩躁，四肢逆冷，冷汗自出，兩脚轉筋，痛不可忍者，須井中沉令極冷，頓服之乃效。

㊅吳茱萸湯良方下同　一名百沸湯，治霍亂吐瀉，因飲冷冒寒，或忍饑，或大怒，或乘舟車，傷動胃氣，令人上吐下瀉，頭旋眼運，手脚轉筋，四肢逆冷，用藥遲慢，須臾不救。

吳茱萸，木瓜，食鹽各半兩。右同炒令焦，先用磁瓶盛水三升，煮令百沸，入藥煎至二升已下，傾一盞，冷熱隨病人服之。卒無前藥，用枯白礬爲末，每服一大錢，沸湯調服。更無前藥，用鹽一撮，酢一盞，同煎至八分，溫服。鹽梅鹹酸等物，皆可服。

㊆建中加木瓜柴胡湯　治前證。

棗二枚煎六分去柤溫服不拘時。

㉞藿香正氣散　治四時不正之氣，一切氣逆之證，並能調治。

藿香二錢，　紫蘇一錢五分，　陳皮，　厚朴薑製，　半夏薑製，　白朮炒，　茯苓，　大腹皮，　桔梗，　白芷，　甘草炙各一錢。右剉一劑生薑三片棗二枚水煎熱服。　霍亂轉筋加木瓜，　腹痛加炒白芍藥，寒痛加桂。冷甚加乾薑。　飲食不化，加香附砂仁。水穀不消，加神麴麥芽。　心下痞滿，加桔梗枳殼枳實。　肉食不化，加山樝濕麴。停積加蘿蔔子。　中暑冒風，加香薷白扁豆。　時氣憎寒發熱，加柴胡乾葛。　口乾加麥門冬。　小便不利合五苓散。暑濕相搏，霍亂轉筋煩渴悶亂，合黃連香薷飲。心腹絞痛加木香。　若頻欲登圊不通利者，加檳榔枳殼。

㉟丁香散頁方下同　治霍亂吐利不止。

丁香，　桂心，　白朮各半兩。　訶黎勒煨去核，　厚朴薑汁製，　附子炮去皮臍，　良薑各三分。　陳橘皮湯浸去白焙　木瓜乾者，各一兩。　右爲細末每服二錢，不拘時，粥飲調下。

㊱乾薑湯　治霍亂吐利，心腹疼痛，氣逆，手足冷。

乾薑炮，　桂心，　附子炮去皮臍，　草豆蔻去皮，　木香，　高良薑炒，　肉豆蔻去殼麪煨，　乾木瓜，　甘草炙，各五錢。　右㕮咀每服三錢，水一盞煎至十分，去滓，不拘時溫服。

㊲香薷丸　治冷熱不調霍亂吐瀉。

香薷一兩五錢，　白扁豆炒，　零陵香，　藿香，　木香各一兩。　丁香皮二兩，　益智仁一分。　右爲細末，用麪糊和丸如梧桐子大，每服二十丸，食前用溫紫蘇湯下。

㊳四君子湯

人參，　白朮，　茯苓，　黃芪各一兩。　右剉如麻豆大，每服一兩，水三盞，生薑五片，煎至一盞，去滓，不拘時服。如吐

㉖丁香散　治霍亂嘔吐不止。

丁香五分，藿香，枇杷葉拭去毛各一錢。右咀，水一鍾半，薑一片，煎六分，熱服。

㉗椒豆散入門　一名胡椒湯，治霍亂吐瀉後，煩渴不能服藥，或水藥不入口者。

胡椒，菉豆各四十九粒。右研爲末，新汲水調下，或水煎服。一方用胡椒七粒，菉豆二十一粒爲末，木瓜湯調下。

㉘加減薷苓湯醫鑑　治霍亂熱渴。

花粉二錢，赤茯苓一錢，猪苓，澤瀉，香薷，乾葛各七分。黃連，白朮，甘草各五分。右剉作一貼，入薑三片，水煎服。

㉙參胡三白湯回春　治霍亂後，煩熱口乾脈數，或頭身痛。

柴胡，白朮，白茯苓，白芍藥，當歸，陳皮，麥門冬，梔子仁，甘草各八分。人參五分，五味子十粒。

右剉作一貼，入棗二枚，烏梅一枚，燈心一團煎服。

㉚旣濟湯丹溪　治霍亂後虛煩不得眠。

麥門冬二錢，人參，竹葉，半夏，附子炮，甘草炙各一錢。右剉作一貼，入薑五片，粳米百粒，水煎服。

㉛木瓜湯入門　治霍亂吐瀉轉筋擾悶。

木瓜，吳茰各二錢。茴香二分半，甘草二分，生薑，紫蘇各少許。右水煎，入鹽一撮，溫服。

㉜半夏湯河間　治霍亂轉筋，吐瀉不止。

半夏麯，白茯苓，白朮各半兩。甘草炙，淡桂二錢半。右爲細末，渴者涼水調下，不渴者溫水調下，不拘時候服。

㉝十華散衞生寶鑑下同　治霍亂吐利神效。

四錢，用水一中盞，紅棗三枚，煎至六分，去滓，不拘時熱服。

㊼吳茱萸湯　治霍亂多寒，手足厥冷，脈絕。

吳茱萸半升，洗焙，　當歸切焙，　桂心去粗皮，　芍藥各三分。　木通，　細辛，　甘草炙，各五錢。　右剉如麻豆大，每服五錢匕，用水二盞，入生薑一棗大，切碎，紅棗二枚，煎至一盞，去滓，不拘時溫服。如氣痞去棗，加葛根五錢。一方無木通，有木香。

㊽附子散　治霍亂腹滿，虛鳴氣逆，手足俱冷。

附子炮裂，去皮臍，　草豆蔻，　陳皮湯浸去白，　高良薑剉，　桂心，各五錢。　甘草炙，一分。　右㕮咀，每服三錢，用水一中盞，入生薑半分，煎至六分，去滓，不拘時熱服。

㊾回陽散　治吐瀉不止，或筋轉，四肢發厥，虛風不省人事，服此藥，四肢漸煖，神識便省。

天南星不拘多少。　右爲末，每服三錢，入生薑五錢，紅棗三枚，同煎至八分，溫服，未省再服。

㊿胡椒湯　治霍亂煩悶欲死。

胡椒三十粒，　陳皮，　高良薑，　桂心各五錢。　麥門冬去心焙，　木瓜乾者，各一兩。　右搗篩，每服三錢，水一中盞，煎六分，去滓，不拘時溫服。

(五一)活命散　治男子婦人小兒，上吐下瀉，霍亂不止，面色青黑，命欲臨死者，宜服此藥。

防風，　羌活，　獨活，　乾薑，　細辛各一兩。　草豆蔻，　肉豆蔻，　川芎各五錢。　吳茱萸，　乾木瓜各一兩。　官桂去粗皮，半分。　右爲細末，每服三錢，濃煎木瓜湯，空心調，連滓服。

(五二)抵聖散　治霍亂宿食不消，心腹㽲痛。

瀉轉筋，頭痛自汗，脈虛者，加桂五錢。按四君子湯一方，諸方書皆無黃芪，而用甘草減半，即頁方亦然。獨霍亂門無甘草而用黃芪，蓋避甘草之滿中也。

㊴四君子加芍藥高良薑湯

四君子湯各一兩，芍藥，良薑各五錢。同前法煎服。

㊵四君子加薑附厚朴湯　治吐瀉霍亂，四肢拘急，脈沉而遲者。

四君子湯各一兩，生薑，附子炮，厚朴薑製各二錢。同前法煎服。

㊶丁香散　治霍亂不止。

丁香，肉豆蔻，木香各等分。右爲細末每服二錢，用白粥飲調熱服，不拘時。

㊷正胃湯　治霍亂吐利不止

枇杷葉拭去毛炙，厚朴去粗皮薑汁製，橘紅，桂心去粗皮，各五錢。右爲粗末，每服二錢匕，水一盞，入生薑三片，煎至六分，去滓，不拘時熱服。

㊸良薑飲　治霍亂神效。

良薑，藿香，陳皮各一兩。甘草炙三分。右㕮咀，每服三錢，水一盞，煎至七分，不拘時服。

㊹訶黎勒散　治霍亂嘔吐，脾胃虛冷，氣隔不思飲食。

訶黎勒皮三分，桂心，澤瀉，赤芍，乾薑炮，人參各五錢。白朮炒，陳皮湯浸去白焙，厚朴薑汁炙令香熟，各一兩。甘草炙微赤一分。右㕮咀，每服四錢，水一中盞，生薑半分，煎至六分，去滓，不拘時溫服。

㊺正氣丹　治下虛陰陽錯逆，霍亂吐利，粥食不下。

附子炮裂

丹砂半分，附子炮裂去皮臍一分，雄黃三豆許。右別研細末用巴豆七粒去皮心出油後入丹砂附子雄黃末同研令勻，煉蜜和丸如麻子大每服三丸不拘時米飲下。若下利未止，加三丸至五丸與少冷粥食之卽定。

(五九)白豆蔻丸　治霍亂後，脾胃尚虛，穀氣未實，津液內燥，令人煩躁睡臥不安。

白豆蔻仁，橘紅，草豆蔻仁，厚朴薑汁炙，官桂，乾木瓜，白朮炒，半夏湯泡七次，人參各二兩。高良薑炒，縮砂仁，神麴炒，麥蘖炒，白茯苓，乾薑炮，木香，甘草炙，桃仁去皮尖雙仁炒各四兩。右爲細末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服三十丸至四十丸，空心用米飲送下。

(六〇)人參散　治霍亂吐利，汗出心煩。

人參去蘆，麥門冬去心，茯神各三兩。白朮，黃芪，乾薑炮，桂心，甘草炙，各五錢。右搗篩，每服四錢，用水一中盞，生薑半分，煎至六分，去滓，頻頻溫服。

(六一)竹瀝飲　治霍亂狂悶，煩渴，吐瀉無度，氣欲絕者。

竹瀝一合，粳米一合，炒，以水二盞同研去滓取汁。右二味和勻頓服之。

(六二)木香湯　治霍亂煩躁，懊憹，不得安臥。

木香，木瓜，紫蘇，各一兩。草豆蔻仁一兩五錢。右搗篩，每服三錢匕，水一盞，入黑豆半合許，生薑三片，煎至八分，去滓溫服，日二。

(六三)藿香散　治霍亂逆滿，開胃口。

藿香葉一兩焙，訶黎勒煨十枚，糯米三百粒，石蓮心二百箇，或以白豆蔻代。甘草炙一分，人參，丁香，各十兩。右爲細末，每服一錢，用和皮煨薑一塊，棗二枚去核，煎湯調下。早晚食前服。

白朮二兩，良薑五錢，白茯苓，吳萸湯炮焙，人參，木香，枳殼麩炒，草豆蔻仁，橘紅焙，甘草炙各一兩，厚朴去粗皮薑汁塗炙四兩。右爲細末，每服二錢匕，不拘時，用沸湯調服。

(五三)木香散　治霍亂下利，氣脹，飲食不消。

木香，丁香，白朮炒，山樝子，人參，橘紅，桂心去粗皮，石菖蒲，吳茱萸湯泡炒，良薑，草豆蔻去皮，白豆蔻仁，肉豆蔻去殼煨，甘草炙各等分。右爲細末，每服二錢匕，不拘時，木瓜煎湯調下。

(五四)白豆蔻丸　治霍亂及脾胃氣虛，腹脹妨悶，不思飲食。

白豆蔻去皮，訶黎勒去核，人參去蘆各三分。乾薑炮，甘草炙微赤，桂心，各五錢。白朮，橘紅，厚朴去粗皮，生薑汁塗令黃香熟，各一兩。右爲細末，煉蜜和搗三二百杵，丸如梧桐子大，每服二十丸，不拘時，生薑棗湯送下，日進四五服。

(五五)吳茱萸餅　治霍亂昏塞不利。

吳茱萸湯泡焙炒，厚朴去粗皮薑汁製，橘紅，人參，良薑，胡椒，各一分。藿香，木瓜，各一兩。右爲細末，用生薑汁半斤，和藥捻作餅子，曝乾，臨用時炙燥，再碾爲細末，每服二錢匕，水一盞，煎至七分，溫服。

(五六)十香丸　治霍亂中惡，不識人，心痛腹脹，不思飲食。

丁香，蘇合香，白檀香，香附炒去毛，沉香，安息香研，木香，薰陸香研，麝香研，良薑，龍腦研，白朮剉炒，丹砂研，各五錢。華茇炒，訶黎勒煨取皮，犀角屑，厚朴薑汁製，各一兩。右除別研藥外，碾爲細末，入別研藥同研令勻，煉蜜和丸，如梧桐子大，每服五丸，不拘時，用溫酒送下，老少加減服。甚者溫酒研下，日四五服，以瘥爲度，此藥以磁盒貯之。

(五七)北支易　治中惡霍亂，心痛胷脅疞痛喘急。

半夏製二錢，附子炮，乾薑，炙甘草，桂心各[illegible]

(十二)薑附湯活人書　治霍亂吐瀉轉筋，手足厥冷，多汗。

乾薑炮，附子製各二錢。　右作一服，水一鍾半，煎七分熱服。

(十三)苓朮二陳煎景岳全書下同　治痰飲、水氣停蓄，心下嘔吐吞酸等證。

猪苓，澤瀉，茯苓各一錢五分。　陳皮一錢，　半夏二三錢，　白朮，　乾薑炒黃各一二錢。　炙甘草八分。　水一鍾半，煎服。

(十四)和胃飲　治寒濕傷脾，霍亂吐瀉，及痰飲水氣，胃脘不淸，嘔惡脹滿腹痛等證，此卽平胃散之變方也。凡嘔吐等證，多有胃氣虛者，一聞蒼朮之氣，亦能動嘔，故以乾薑代之。

陳皮，　厚朴各一錢五分。　乾薑炮一二錢，　炙甘草一錢，　水一鍾半，煎七分溫服。　此方凡藿香木香丁香茯苓半夏扁豆砂仁澤瀉之類，皆可隨宜增用之。若胸腹有滯而兼時氣寒熱者，加柴胡。

(十五)排氣飲　治霍亂氣逆，食滯脹痛等證。

陳皮，　藿香，　枳殼各一錢五分。　香附，　澤瀉，　烏藥各二錢。　木香七分或一錢。　厚朴一錢，　水一鍾半，煎七分，熱服。

(十六)養中煎　治中氣虛寒，爲嘔爲泄者。

人參一二三錢，　山藥炒，　白茯苓各二錢。　扁豆炒二三錢，　炙甘草一錢，　乾薑炒黃一二錢。　水二鍾，煎七分，食遠溫服。

(十七)大和中飲　治飲食留滯，霍亂等證。

陳皮一二錢，　枳實一錢，　砂仁五分，　山楂，　麥芽各二錢。　厚朴，　澤瀉各一錢五分。　水一鍾半，煎七八分，

(六四)薤白湯 治霍亂乾嘔不止。

薤白切細一握，生薑切細五錢，陳皮去白三錢。右用水二大盞煎至七分，去滓，分溫二服。

(六五)橘皮湯 治霍亂嘔噦不止。

橘紅，甘草炙，各一兩。枇杷葉去毛炙黃二兩。右搗篩，每服三錢匕，水一盞，生薑三片，煎至七分，去滓溫服。如人行五七里，再服。

(六六)附子湯 治霍亂轉筋淋足。

附子一枚去皮臍，生椒綿裹，生薑切各一兩。葱半斤切。右以水一斗，煎三兩沸，入磁盆中，濾去滓，以鹽漿解之，冷熱得所，淋洗立瘥。

(六七)六和半夏湯河間 治霍亂吐瀉。

白朮，甘草，縮砂仁，杏仁去皮尖，人參，半夏製各五分。赤茯苓，藿香，扁豆薑汁炒，木瓜各一錢。香薷，厚朴薑製各二錢。右作一服，薑三片，棗一枚，水二盞煎一盞，溫服。

(六八)藿苓湯選要 治外感風寒內傷飲食霍亂轉筋嘔吐泄瀉。

肉桂三分，藿香，白朮，豬苓，澤瀉，厚朴，白茯苓各一錢，紫蘇，大腹皮，白芷，桔梗，半夏製，陳皮，各八分。甘草炙五分。右作一服，水二盞，薑五片，煎八分，食遠服。

(六九)玉露散集成 治夏月傷暑霍亂吐瀉。

石膏，寒水石，生甘草各等分。右爲末，每服二錢，白湯調下。

(七〇)通脈四逆湯濟生方 治霍亂多寒，肉冷脈絕。

[illegible]霍亂及嘔吐不能飲食及藥[illegible]，[illegible]。

痢瘧及宿食[illegible]，[illegible]，下焦主出，三焦通利，陰陽調和，升降周流，則臟腑暢達，一失其道，二氣淆亂，濁陰不降，清陽不升，故發爲霍亂嘔吐之病。飲此湯輒定者，分陰陽使得其平也。

霍亂吐下，用鍋底煤半錢，竈額上墨半錢，百沸湯一盞，急攪數千下，以椀覆之，通口服一二口，立止。經驗方。

乾霍亂病，心腹脹痛，蘆蓬茸一把，水煎濃汁，頓服二升。小品方。

霍亂吐利，屋上倒掛塵，滾湯泡，澄清服，即止。易簡方。

霍亂轉筋，用青銅錢四十九枚，木瓜一兩，烏梅炒五枚，水二椀，煎八分，溫服。聖濟錄。

霍亂轉筋，腎堂及臍下疰痛，銅熨器炙熱，隔衣熨其臍腹腎堂。大明。

霍亂轉筋，身冷心下微溫者，硃砂研二兩，蠟三兩，和丸，著火籠中熏之，周圍厚覆，勿令烟洩，兼牀下著火，令腹微煖，良久當汗出而甦。外臺祕要。

暴得吐逆不止，生滑石末二錢，溫水服，仍以細麪半琖押定。寇氏衍義。

霍亂煩滿，氣逆腹脹，手足厥冷，不灰木、陽起石煆、阿魏半兩，巴豆去心、杏仁去皮各二十五箇，爲末，粟飯丸櫻桃大，穿一孔，每服一丸，燈上燒烟盡，研末，薑湯下，以利爲度。聖濟總錄。

乾霍亂病，千年石灰，沙糖水調服二錢，或淡醋湯亦可，名落盞湯。摘元方。

乾霍亂病，上不得吐，下不得瀉，用鹽一大匙，熬令黃，童子小便一升，合和溫服，少頃吐下即愈。

霍亂腹痛，炮鹽一包，熨其心腹，令氣透，又以一包熨其背。救急方下同。

霍亂轉筋，欲死氣絕，腹有暖氣者，以鹽填臍中，灸之上七壯，即甦。

冷熱霍亂，分利陰陽，元精石、半夏各一兩，硫黃三錢，爲末，麪糊丸梧桐子大，每服三十丸。指南方。

食遠溫服。

(七八)小和中飲　治霍亂胸膈脹悶。

陳皮，茯苓，厚朴各一錢五分。山楂肉　扁豆各二錢。甘草五分。水一鍾半，加生薑三五片，煎服。

(七九)五君子煎　治脾胃虛寒，嘔吐泄瀉而兼濕者。

人參二三錢，白朮，茯苓各二錢。炙草一錢，乾薑炒黃一二錢。水一鍾半，煎服。

(八〇)神香散　治霍亂胸膈胃脘逆氣難解，疼痛，嘔噦脹滿，痰飲膈噎，諸藥不效者，惟此最妙。

丁香，白豆蔻，或砂仁亦可。二味等分為末，清湯調下五七分，甚者一日一錢，日數服不拘。

(八一)理陰煎　此理中湯之變方也。通治眞陰虛弱，脹滿嘔噦，痰飲惡心，吐瀉腹痛，婦人經遲血滯等證。

熟地三五錢或一二兩，當歸二三錢或五七錢　乾薑炒黃色一二三錢，炙甘草一二錢。水二鍾，煎七分熱服，或加肉桂一二錢。

(八二)溫胃飲　治中寒嘔吐，吞酸泄瀉，不思飲食，及婦人臟寒嘔惡，胎氣不安等證。

人參一二三錢或一兩，白朮炒一二錢或一兩，陳皮一錢或不用　扁豆炒二錢　炙甘草一錢，乾薑炒焦一二三錢，當歸一二錢，滑泄者勿用　水二鍾，煎七分，食遠溫服。

## 單方

霍亂吐瀉，勿食熱物，飲冷水一盞，新汲水更佳。仍以水一盆，漬兩足，立止。救急良方。

霍亂及中暍卒死者，飲地漿一升妙。乾霍亂病不吐不利，脹痛欲死，地漿三五盞服卽愈。大忌米湯。地漿者，掘黃土

又方，蘆葉五錢，糯米二錢半，竹茹一錢，水煎入薑汁蜜各半合，煎兩沸，時時呷之。

霍亂煩渴，蓼子一兩，香薷二兩，每二錢水煎服。

肝虛轉筋，吐瀉，赤蓼莖葉切二合，水一盞，酒三合，煎至四合，分二服。

霍亂轉筋，蓼葉一升，水三升，煮取汁二升，入香豉一升，更煮一升半，分三服。藥性論

霍亂吐利，扁竹入豉汁中，下五味，煮羹食。食醫心鑑

熱霍亂，大黃、人參各半兩，水二盞，煎一盞，熱服可安。得效方

霍亂腹脹，半夏、桂等分，爲末，水服方寸匕。肘后方

霍亂吐利，山豆根末，橘皮湯下一錢。聖惠方下同

霍亂吐利，防己、白芷等分，爲末，新汲水服二錢。

霍亂脹痛，生菖蒲剉四兩，水和搗汁，分溫四服。

霍亂心煩，蘆根炙一兩半，水萍焙，人參，枇杷葉炙各一兩，每服五錢，入薤白四寸，水煎溫服。

霍亂煩渴不止，糯米三合，水五升，蜜一合，研汁分服，或煮汁服。産乳方

霍亂吐瀉，煩渴欲絕，用粳米二合，研粉，入水二盞，研汁，和淡竹瀝一合，頓服。普濟方

霍亂煩躁，黃粱米粉半升，水升半，和絞如白粉，頓服。外臺祕要

霍亂大渴不止，多飲則殺人，黃粱米五升，水一斗，煮清三升，稍稍飲之。肘后方

霍亂脹痛，大豆生研，水服方寸匕。普濟方

霍亂吐利，菉豆粉、白糖各二兩，新汲水調服。生生編

霍亂吐利，豌豆三合，香薷三兩，爲末，水三盞，煎一盞，分二服。聖惠方

二氣丹，治伏暑傷冷，二氣交錯，中脘痞結，或泄或嘔，或霍亂厥逆，硫黃硝石等分研末，石器炒成沙，再研，糯米糊丸梧桐子大，每服四十九，新井水下。

霍亂吐瀉，硫黃一兩，胡椒五錢，爲末，黃蠟一兩，化丸皂子大，每涼水下一丸。聖濟總錄。

霍亂吐瀉，枯白礬末一錢，百沸湯調下。華佗危病方。

霍亂嘔惡，人參二兩，水一琖半，煎汁一琖，入雞子白一枚，再煎，溫服。一加丁香。衞生家寶方。

霍亂煩悶，人參五錢，桂心五分，水二盞，煎服。聖惠方

霍亂吐瀉，煩躁不止，人參二兩，橘皮三兩，生薑一兩，水六升，煮三升，分三服。聖濟總錄下同。

霍亂轉筋，腹痛，木香末一錢，木瓜汁一盞，熱酒調服。

霍亂吐利，高良薑火炙令焦香，每用五兩，以酒一升，煮三四沸，頓服。亦治腹痛中惡，名冰壺散。

霍亂腹痛，高良薑一兩，剉，以水三大盞，煎二盞半，去查，入粳米一合，煮粥食之，便止。聖惠方。

霍亂嘔甚不止，用高良薑生剉二錢，大棗一枚，水煎冷服，立定，名冰壺湯。普濟方。

霍亂煩渴，草豆蔻、黃連各一錢半，烏豆五十粒，生薑三片，水煎服之。聖濟總錄。

霍亂吐利，肉豆蔻爲末，薑湯服一錢。普濟方。

霍亂吐瀉垂死者，服之回生，藿香葉、陳皮各半兩，水二盞，煎一盞，溫服。百一選方。

霍亂脹滿，未得吐下，用生紫蘇搗汁飲之，佳。乾蘇煮汁亦可。肘后方。

霍亂困篤，雞蘇三兩，水二升，煮一升，分三服。聖惠方。

霍亂吐下不止，以艾一把，水三升，煮一升，頓服。外臺祕要。

[illegible]千金方。

又方用陳橘皮末二錢湯點服，不省者灌之，仍燒磚沃醋布裹磚安心下熨之便活。聖濟總錄。

乾霍亂病，心腹脹痛不吐不利煩悶欲死用檳榔末五錢童子小便半琖水一琖煎服。聖濟總錄。

霍亂吐利，用胡椒三十粒以飲吞之。千金方。

又方。用胡椒四十九粒菉豆一百四十九粒研勻，木瓜湯服一錢，一方以新汲水服亦效。直指方。

霍亂乾嘔不止，吳茱萸泡炒乾薑炮等分，水煎服之。聖濟總錄下同。

霍亂煩悶，茶末一錢煎水調乾薑末一錢服之卽安。

霍亂煩渴，藕汁一鍾，薑汁半鍾，和勻飲。

霍亂吐利生藕擣汁服。聖惠方。

乾霍亂病，不吐不下，丁香十四枚研末，以沸湯一升和之頓服。不瘥更作之。千金方。

霍亂及乾霍亂須吐者，以樟木屑煎濃汁吐之，甚良。本草。

又方。用厚朴薑汁炙研末，新汲水服二錢，如神。聖惠方。

中惡霍亂海桐皮煮汁服之。聖濟總錄。

霍亂煩悶槐葉桑葉各一錢，炙甘草二分，水煎服之。聖惠方。

霍亂轉筋，皂角末吹豆許入鼻取嚏卽安。梅師方。

風痰霍亂，食不消，大便濇，訶黎勒三枚，取皮爲末，和酒頓服三五次，妙。外臺祕要。

伏暑霍亂傷冷，吐利煩渴，名水浸丹，巴豆二十五箇去皮心及油，黃丹炒研一兩二錢半，化黃蠟和丸菉豆大，每服五七丸，水浸少頃，別以新汲水送下。局方。

乾霍亂病，心腹脹痛不吐不利欲死，巴豆一枚，去皮心，熱水研服，得吐利卽定也。

又方。扁豆香薷各一升，水六升，煮二升，分服。千金方。

霍亂轉筋，白扁豆爲末，醋和服。普濟方。

霍亂吐利，鹽醋煎服，甚良。如宜方。

霍亂煩脹，未得吐下，以好苦酒三升飲之。千金方。

霍亂乾嘔不止者，取薤一虎口，以水三升，煮取一半，頓服，不過三作卽已。韋宙獨行方。

霍亂脹滿不得吐下，名乾霍亂，小蒜一升，水三升，煮一升，頓服。肘后方。

霍亂轉筋入腹殺人，以小蒜鹽各一兩，搗傅臍中，灸七壯，立止。聖濟總錄。

乾濕霍亂轉筋，用大蒜搗塗足心，立愈。永類鈐方

霍亂吐瀉，芥子搗細，水和，傅臍上。聖濟總錄。

霍亂脹痛，蕪菁子水煮汁飲之。集簡方。

霍亂欲死，生薑五兩，牛兒屎一升，水四升，煎二升，分再服卽止。梅師方。

霍亂轉筋入腹欲死，生薑三兩搗，酒一升，煮沸，分三服，仍以薑搗貼痛處。外臺祕要。

霍亂腹脹不得吐下，用生薑一斤，水七升，煮二升，分二服。肘后方。

霍亂轉筋，柏葉搗爛，裹脚上，及煎汁淋之。聖惠方。

霍亂吐利，鹽梅煎湯，細細飲之。如宜方。

霍亂腹痛，桃葉三斤切，秋冬用枝，水五升，煮一升，分二服。外臺祕要。

霍亂吐利，梨枝葉煮汁飲。聖惠方

霍亂腹痛，木瓜五錢，桑葉三片，棗一枚，水煎服。聖惠方。

霍亂吐下不止，四肢逆冷，用黃牛屎半升，水二升，煮三沸，服半升。

又方用烏牛屎絞汁一合，以百日兒乳汁一合，和温服。聖惠方。

霍亂吐利不止，用烏牛齝草一團，人參生薑各三兩，甘漿水一升半，煮汁五合服。鬼遺方。

霍亂困篤，童女月經衣和血燒灰，酒服方寸匕，百方不瘥用之。千金方。

霍亂，用黃牛犢子臍屎一升，和酒三升，煮汁服。肘后方。

攪腸沙痛欲死者，用馬糞研汁飲之立愈。經驗方。

霍亂轉筋，筋粗大如桃李，攣搐不可忍，取秫藭葉濃煎湯飲之。種杏。

霍亂煩渴，粟米泔飲數升立瘥。又治轉筋入腹。蘇恭。

絞腸沙痛，蕎麥麪炒焦，熱水衝服。本草。

霍亂煩悶嘔吐，腹空轉筋，恐入腹，宜多服山巖泉水，名曰洗腸，勿令腹空，空則更服。人皆懼此，然嘗試有效。但身冷力弱者，防致臟寒，當以意消息之。藏器。

霍亂煩悶，向陽壁土煮汁服。聖濟總錄。

攪腸沙痛，陰陽腹痛，手足冷，但身上有紅點，以燈草蘸油點火焠於點上。濟急方。

絞腸沙痛，馬蘭根葉細嚼嚥汁，立安。壽域神方。

霍亂成痢，劉寄奴草煎汁飲。聖濟總錄。

霍亂吐下，萹豆葉絞汁和酢少許，温服。開寶。

吐利後轉筋，扁豆葉一把，生搗，入少酢絞汁服，立瘥。蘇恭。

霍亂，扁豆藤、蘆蘀、人參、倉米等分煎服。時珍下同。

霍亂轉筋入腹，桑葉一握，煎飲一二服，立定。聖惠方。

霍亂腹痛吐下，桑葉搗汁一盞服。冬月乾者煎汁服。

霍亂轉筋，心腹脹滿，未得吐下，梔子二七枚，燒研，熱酒服之，立愈。肘后方。

霍亂轉筋入腹，無可奈何者，以酢煮青布搨之，冷則易。千金方。

霍亂轉筋腹痛，以苦酒煮絮裹之。聖惠方。

霍亂吐利，偸本人頭縉，以百沸湯泡汁，服一呷，勿令知之。集元方。

霍亂轉筋，故麻鞋底燒赤，投酒中煮，取汁服。藏器下同

霍亂吐下不止，取舊鞋底洗淨，煮汁服。

吐瀉不止，四肢逆冷，不省人事，南星爲末，每三錢入大棗三枚同煎服，四肢漸煖，神識便省，神妙。

乾霍亂，鹽湯一椀入皂角末少許調服，探吐卽效。

霍亂煩渴，烏梅水漬和蜜飲之，妙。

林檎青色者，治霍亂吐瀉甚妙，煮取汁飲，或嚼食之。

霍亂吐瀉出路在家應急方，用路旁破草鞋去兩頭，洗三四次，水煎湯一盌，滚服之，卽愈。事海文山。

霍亂轉筋入腹痛，敗木梳一枚，燒灰，酒服，永瘥。千金方。

霍亂轉筋垂死者，敗蒲席一握，切，漿水一盞，煮汁溫服。聖惠方。

霍亂轉筋入腹痛，車轂中脂塗足心。千金方。

霍亂吐利，蠟一彈丸，熱酒一升化服，卽止。肘后方。

乾霍亂病，脹滿煩躁，亂髮一團燒灰，鹽湯二升和服，取吐。十便良方。

永不發。

## 鍼灸

素問曰：霍亂刺少陰俞旁五，足陽明及上旁三。

靈樞曰：足太陰之別，名曰公孫，去本節之後一寸，別走陽明，其別者入絡腸胃，厥氣上逆則霍亂，實則腸中切痛，虛則鼓脹，取之所別也。

清氣在陰，濁氣在陽，榮氣順脈，衛氣逆行，清濁相干，亂於胷中，是謂大悗，故氣亂於腸胃，則爲霍亂，取之足太陰陽明，不下者取之三里。

甲乙經曰：霍亂泄出不知，先取太谿，後取太倉之源。

霍亂，巨缺關衝支溝解谿主之。

霍亂泄利，期門主之。

厥逆霍亂，府舍主之。

霍亂逆氣，魚際太白主之。

霍亂遺尿失氣，三里主之。

霍亂頸痹不仁，承筋主之。

霍亂轉筋，金門僕參承山承筋主之。

千金方曰：凡霍亂灸之雖未能立瘥，終無死憂，不可逆灸。或但先下後吐，當隨病狀灸之。

霍亂煩躁，坐臥不安，葱白二十莖，大棗二十枚，水三升，煎二升，分服。

霍亂吐瀉不止，轉筋腹痛，取棠梨枝葉一握，同木瓜二兩，煎汁細呷之。聖惠方下同。

霍亂轉筋，木瓜一兩，酒一升，煎服。不飲酒者，煎湯服，仍煎湯浸青布裹其足。

霍亂煩躁氣急，以木瓜核每嚼七粒，溫水嚥之。

霍亂轉筋，櫨子又名木桃，煮汁飲，功與木瓜相近。孟詵。

又方，取木梨煮汁服。

霍亂轉筋，以煖物裹脚，後以柏木片煮湯淋之。經驗方。

霍亂，杉木煎湯服。大明。

霍亂，用釣樟木磨服。蕭炳。

攪腸沙痛，用母猪生兒時拋下糞，日乾為末，以白湯調服。

又方，童子小便服之即止。聖惠方下同。

中惡霍亂，麝香一錢，酢半盞，調服。

霍亂吐利，兔骨煮汁服，立止。外臺祕要。

霍亂轉筋入腹，編薦索燒，研酒服二指撮。藏器。

乾霍亂不吐不利，煩脹欲死，或轉筋入腹，取屠兒几垢一鷄子大，溫酒調服，得吐即愈。

霍亂吐利，取尿桶舊板煎水服。山村宜之。如宜方。

霍亂吐瀉，取蜣螂轉丸，燒存性，酒調服。藏器。

[illegible]，不問虛實冷熱，用水銀硫黃等分，研不見星，每服一字至半錢，生薑湯調下。錢氏

手膕中出血，謂之打寒，蓋寒隨血去，亦即紅汗之類也。故凡病受寒霍亂者，亦宜以此法治之。今東南人有刮沙之法，以治心腹急痛，蓋使寒隨血聚，則邪達於外，而臟氣始安，此亦出血之意也。

轉筋十指拘攣，不能屈伸，灸足外踝骨尖上七壯。

霍亂危急將死，用鹽填臍中，灸二七壯，立愈。

## 醫案

千金方曰：武德中有德行尼名淨明，患霍亂已久，或一月一發，或一月再發，發即至死，時在朝太醫蔣許甘巢之徒，亦不能識，余以霍亂治之，處虎掌一方，得愈，永不再發，故疏而記之。

衛生寶鑑曰：提學侍其公年七十九歲，六月中暑毒，霍亂吐利，昏冒終日，不省人事，時夜方半，請予治之。診其脈，洪大而有力，一息七八至，頭熱如火，足寒如冰，半身不遂，牙關緊急。予思內經五亂篇中云：清氣在陰，濁氣在陽，營氣順脈，衛氣逆行，亂於胷中，是謂大悗，霍亂之名，自此而生。蓋因年高氣弱，不任暑氣，陽不維陰則瀉，陰不維陽則吐，陰陽不相維，則既吐且瀉矣。前賢見寒多以理中丸，熱多以五苓散，爲定法治之。今暑氣極盛，陽明得時，況因動而得之，中暍明矣。非甘辛大寒之劑，則不能瀉其暑熱，墮浮溜之火而安神明也。遂以甘露散甘辛大寒，瀉熱補氣，加白茯苓以分陰陽，約重一兩，冰水調灌，漸漸省事，而諸證悉去。後慎言語，節飲食三日，以參朮調中湯之劑，增減服之，理正氣，逾十日後，方平復。

戊午春，攻襄陽回，住夏曹州界，有蒙古百戶昔良海，因食酒肉，飲湩乳，得霍亂吐瀉，從朝至午，精神昏憒，以困急來求。予視之，脈得浮數，按之無力，所傷之物已出矣。即以新汲水半椀，調桂苓白朮散，徐徐服之，稍安。又於牆陰掘一地穴，約二尺許，貯以新汲水，在內攪動，待一時澄清，名曰地漿，用清者一觴，再調服之，漸漸氣調，吐利遂止，至夜方

霍亂陰陵泉主之。

東垣十書曰：靈樞五亂篇言『氣亂於腸胃，取足太陰陽明，不下，取足三里。』蓋因足太陰虛者，於募穴導引之於血中。有一說腑輸去腑病也。胃虛而致太陰無所稟者，於足陽明胃之募穴中導引之。如氣逆上而霍亂者，取三里，氣下乃止，不下復始。

醫學正傳曰：霍亂吐瀉不止，垂死，灸天樞氣海中脘四穴，立愈。天樞二穴，在臍旁各開二寸，氣海一穴，在臍下半寸，中脘一穴，在臍上四寸。

醫學綱目曰：霍亂以竹杖兩手反抱，拄於脊骨，就杖兒上下各點一穴，如先吐先灸上穴，先瀉先灸下穴，各三百壯，百發百中。

霍亂吐瀉，取中脘天樞三里委中。

又法，取上脘三里。

吐利上下俱出，臟痹膿血，頭重臂痛，取太白地機風府各五分，長強尺澤各一寸。

霍亂手足厥冷，灸三陰交七壯。

霍亂病人面正臥，兩手著身，以繩橫亙兩肘尖頭，依繩下挾脊，兩邊相去各一寸，灸三七壯，無不驗。

霍亂已死，但有煖氣者，灸承筋七壯，立甦。取穴法，以繩從足拇指圍至後跟一匝，捻斷，等折一半為度，以此度從足跟貼地，量上至腨度極頭處，是穴。

霍亂轉筋，灸承山二十七壯，神效。

霍亂轉筋在兩臂及胸堂中者，筋拘不及動搖，亶中中府巨闕胃脘尺澤太陰，灸七壯。

[illegible]一指厚，熨斗盛火熨之。如無熨斗，以鏇子盛湯盪之，亦

眠，翌日微躁渴，却以錢氏白朮散時時服之，良愈。

薛己醫按曰：儀部李北川仲夏患腹痛吐泄，兩手足捫之則熱，按之則冷，其脈輕診則浮大，重診則微細。余曰：『此陰寒之證也。』急服附子理中湯。不應，仍服至四劑而愈。

上舍徐氏則夏月入房，及食冰果麪食而患腹痛，此陰寒證也。急用附子理中湯，以回陽而愈。有同患此者，不信，別用二陳枳實黃連香薷飲之類而死。

進士劉華甫夏月食生冷果品，患前證，余用附子理中湯一鍾，頓安。

通俗